

Aula 00

*Conhecimentos Específicos p/ Prefeitura
de Diadema-SP (Técnico em
Enfermagem) - Pós-Edital*

Autor:

**Ligia Carneiro Fernandes,
Rodrigo Rennó**

25 de Fevereiro de 2020

1 – Fundamentos de enfermagem	2
1.1 HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	2
1.2 AVALIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA	9
1.3 TEMPERATURA CORPORAL	18
1.4 FREQUÊNCIA CARDÍACA.....	24
1.5 FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA	29
1.6 PRESSÃO ARTERIAL.....	34
1.7 OXIMETRIA DE PULSO	42
1.8 AEROSSOLTERAPIA	44
1.9 OXIGENIOTERAPIA.....	46
1.10 CATETERIZAÇÃO VESICAL	53
1.11 SONDAGEM NASOGÁSTRICA.....	60
1.12 SONDAGEM NASOENTERAL	63
1.13 ASPIRAÇÃO DE VIAS AÉREAS.....	67
1.13 AVALIAÇÃO DA DOR.....	71
1.15 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS.....	74
1.16 CURATIVO.....	97
1.17 POSIÇÕES CIRÚRGICAS.....	106
1.18 CÁLCULO DE MEDICAMENTOS.....	112
1.19 BANHO.....	122
1.20 RETIRADA DE PONTO	126



1 – FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM

1.1 HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

Durante a assistência prestada aos pacientes, as mãos constituem a principal via de transmissão de microrganismos (direta ou indiretamente) já que a pele abriga diversos microrganismos, seja da microbiota normal, seja por contaminação adquirida.



Em outras palavras, as mãos possuem a microbiota:

Residente: constituída por microrganismos de baixa virulência, tais como estafilococos e é mais difícil de ser removida pela higienização simples das mãos, visto que coloniza as camadas mais internas da pele.

Transitória: constituída, principalmente, por bactérias Gram-negativas (como enterobactérias), bactérias não fermentadoras (como *Pseudomonas aeruginosa*), fungos e vírus. É possível sua remoção através do uso de solução antisséptica, ou ainda, pela higienização com água e sabão.

USO DE ÁGUA E SABÃO

- mãos estiverem visivelmente sujas
- início do turno de trabalho
- após ir ao banheiro
- antes e depois das refeições / preparo de alimentos
- antes de preparo e manipulação de medicamentos.
- nas demais situações descritas a seguir, na qual há, por opção, o uso de preparação alcoólica.

USO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA

- quando as mãos não estiverem visivelmente sujas,
- antes e após o contato com o paciente (Ex. exame físico)
- antes e após procedimentos assistenciais ou manipulação de dispositivos invasivos (Ex. administração de medicamentos, curativos)
- antes e após calçar luvas
- após risco de exposição a fluidos corporais
- após mudança de sítio corporal (Ex. troca de fralda e, após realização de punção venosa)

USO DE ANTISÉPTICOS (detergentes misturados com antissépticos):



- higienização antisséptica das mãos: nos casos de precaução de contato recomendados para pacientes portadores de microrganismos multirresistentes ou casos de surtos.
- degermação da pele: antes de qualquer procedimento cirúrgico, no pré-operatório e antes da realização de determinados procedimentos invasivos, tais como inserção de cateter intravascular central, drenagens de cavidades, instalação de diálise, etc.

Observações:

Manter as unhas naturais, limpas e curtas.

Não usar unhas postiças quando entrar em contato direto com os pacientes.

Evitar utilizar anéis, pulseiras e outros adornos quando assistir ao paciente.

Aplicar creme hidratante nas mãos, diariamente, para evitar ressecamento na pele.



Espectro antimicrobiano e características de agentes antissépticos utilizados para higienização das mãos:



Grupo	Bactérias Gram-positivas	Bactérias Gram-negativas	Micobactéria	Fungos	Vírus	Velocidade de ação	Comentários
Álcoois	+++	+++	+++	+++	+++	Rápida	Concentração ótima: 70%; não apresenta efeito residual.
Clorexidina (2% ou 4%)	+++	++	+	+	+++	Intermediária	Apresenta efeito residual; raras reações alérgicas.
Compostos de iodo	+++	+++	+++	++	+++	Intermediária	Causa queimaduras na pele; irritantes quando usados na higienização anti-séptica das mãos.
Iodóforos	+++	+++	+	++	++	Intermediária	Irritação de pele menor que a de compostos de iodo; apresenta efeito residual; aceitabilidade variável.
Triclosan	+++	++	+	-	+++	Intermediária	Aceitabilidade variável para as mãos.

+++ excelente
 ++ bom
 + regular
 - nenhuma atividade antimicrobiana ou insuficiente.

http://www.anvisa.gov.br/hotsite/higienizacao_maos/insumos.htm

PROCEDIMENTOS

(Conforme documento: HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE Agência Nacional de Vigilância Sanitária)

HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DAS MÃOS Duração do procedimento: 40 a 60 segundos **(ISSO CAI!)**

Objetiva remover os microrganismos que colonizam as camadas superficiais da pele, assim como o suor, a oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade propícia à permanência e à proliferação de microrganismos.

1. Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se à pia.
2. Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabão líquido para cobrir todas as superfícies das mãos (seguir a quantidade recomendada pelo fabricante).
3. Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si.



4. Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa.
5. Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais.
6. Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa.
7. Esfregar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, utilizando-se movimento circular e vice-versa.
8. Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa.
9. Esfregar o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, utilizando movimento circular e vice-versa.
10. Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabão. Evitar contato direto das mãos ensaboadas com a torneira.
11. Secar as mãos com papel-toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos. Desprezar o papel-toalha na lixeira para resíduos comuns.

HIGIENIZAÇÃO ANTI-SÉPTICA DAS MÃOS

Objetiva promover a remoção de sujidades e de microrganismos, reduzindo a carga microbiana das mãos, com auxílio de um antisséptico.

Duração do procedimento: 40 a 60 segundos.

A técnica de higienização antisséptica é igual àquela utilizada para higienização simples das mãos, substituindo-se o sabão por um antisséptico.

FRICÇÃO ANTI-SÉPTICA DAS MÃOS (COM PREPARAÇÕES ALCOÓLICAS)

Duração do Procedimento: 20 a 30 segundos.

1. Aplicar na palma da mão quantidade suficiente do produto para cobrir todas as superfícies das mãos (seguir a quantidade recomendada pelo fabricante).
2. Friccionar as palmas das mãos entre si.
3. Executar os passos da higienização simples das mãos dos passos de 4 a 9.
4. Friccionar até secar.
5. Não utilizar papel- toalha.



ANTI-SEPSIA CIRÚRGICA OU PREPARO PRÉ-OPERATÓRIO DAS MÃOS

Duração do Procedimento: de 3 a 5 minutos para a primeira cirurgia e de 2 a 3 minutos para as cirurgias subsequentes (sempre seguir o tempo de duração recomendado pelo fabricante).

1. Abrir a torneira, molhar as mãos, antebraços e cotovelos.
2. Recolher, com as mãos em concha, o antisséptico e espalhar nas mãos, antebraço e cotovelo. No caso de escova impregnada com antisséptico, pressione a parte da esponja contra a pele e espalhe por todas as partes.
3. Limpar sob as unhas com as cerdas da escova 3. ou com limpador de unhas.
4. Friccionar as mãos, observando espaços interdigitais e antebraço por no mínimo 3 a 5 minutos, mantendo 4. as mãos acima dos cotovelos.
5. Enxaguar as mãos em água corrente, no sentido das mãos para cotovelos, retirando todo resíduo do produto. Fechar a torneira com o cotovelo, joelho ou pés, se a torneira não possuir fotosensor.
6. Enxugar as mãos em toalhas ou compressas estéreis, com movimentos compressivos, iniciando pelas mãos e seguindo pelo antebraço e cotovelo, atentando para utilizar as diferentes dobras da toalha/compressa para regiões distintas.

Ano: 2017

Banca: CESPE

Órgão: TRE/BA

Antes de verificar os sinais vitais de um paciente, o técnico de enfermagem deve tomar precauções a fim de reduzir a carga de microrganismos nas próprias mãos, realizando um procedimento simples, que consiste em aplicar uma preparação alcoólica na pele e que é denominado:

- a) antissepsia cirúrgica das mãos.
- b) fricção antisséptica das mãos.
- c) higienização antisséptica das mãos.
- d) higienização cirúrgica das mãos.
- e) fricção simples das mãos.

Resposta

O uso do álcool gel a 70% poderá ser utilizado para a fricção antisséptica das mãos como forma de substituir a higienização com água e sabão quando as mãos não estiverem visivelmente sujas, dentre outras indicações.

Alternativa: B



Ano: 2012

Banca: CESPE

Órgão: TJ-RO

Acerca da higienização das mãos, assinale a opção correta.

- a) As mãos colonizam uma microbiota residente e outra transitória, ambas passíveis de remoção mecânica, com a higienização das mãos com água e sabão.
- b) A higienização simples das mãos deve ter duração mínima de dois minutos e tem como finalidade remover microrganismos.
- c) A fricção antisséptica com uso de preparações alcoólicas tem como finalidade reduzir a carga microbiana das mãos. Nesse procedimento, as mãos devem secar livremente, sem utilização de papel toalha.
- d) A técnica de higienização antisséptica é igual à utilizada para higienização simples das mãos, divergindo apenas em relação ao tempo, que deve ser maior na higienização simples.
- e) Apesar de se referir apenas à higienização simples das mãos, o termo lavagem das mãos foi substituído por higienização das mãos, sendo esta a medida individual mais simples e mais barata para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde mesmo sem o uso de antissépticos.

Resposta

- a) ERRADA. A flora residente é mais difícil de ser removida pela higienização simples das mãos.
- b) ERRADA. Deve durar, em média, 40 a 60 segundos e objetiva remover os microrganismos que colonizam as camadas superficiais da pele, assim como o suor, a oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade propícia à permanência e à proliferação de microrganismos.
- c) CERTA.
- d) ERRADA. O tempo é o mesmo. A diferente é que se utilizará uma solução antisséptica (geralmente degermante) para a realização do procedimento.
- e) ERRADA. O termo higienização das mãos vai além da higienização simples, mas inclui a higienização simples, a higienização com antissépticos, fricção antisséptica e a antisepsia cirúrgica das mãos.

Alternativa: C.

Ano: 2014

Banca: UNIRIO

Órgão: UNIRIO

Na lavagem das mãos, deve ser garantido



- a) o uso de água filtrada ou destilada.
- b) a aplicação de sabão glicerinado.
- c) a remoção de esmalte antes da lavagem.
- d) o enxágue com água corrente no sentido dos dedos para os punhos.
- e) a utilização de toalhas esterilizadas.

Resposta

No momento do enxágue, este deve se dar dos dedos para os punhos, considerando o raciocínio “do mais limpo para o mais sujo”.

Alternativa: D.

Ano: 2015

Banca: INSTITUTO AOCP

Órgão: EBSERH

Sobre a lavagem das mãos, é correto afirmar que

- a) o uso de luvas substitui integralmente o processo de lavagem das mãos, podendo ser utilizado o mesmo par de luvas para cada três pacientes.
- b) as enfermarias destinadas ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas estão dispensadas de conter lavatório em seu interior, se houver disponibilidade de luvas.
- c) os trabalhadores com feridas em membros superiores são dispensados da necessidade de avaliação médica para liberação para o trabalho.
- d) no lavatório exclusivo para higiene das mãos, deve conter água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual.
- e) sua prática pode ser substituída em todas as situações pela fricção de álcool gel 70% nas mãos durante 5s.

Resposta

- a) ERRADA. O uso de luvas JAMAIS substitui a higienização das mãos
- b) ERRADA. Idem a anterior. Sempre que houver paciente (acamado ou não), examinado, manipulado, tocado, medicado ou tratado, é obrigatória a provisão de recursos para a higienização das mãos (por meio de lavatórios ou pias) para uso da equipe de assistência. Nos locais de manuseio de insumos, amostras, medicamentos, alimentos, também é obrigatória a instalação de lavatórios / pias.
- c) ERRADA. Tais trabalhadores só retornarão ao serviço após avaliação médica.
- d) CERTA.
- e) ERRADA. A fricção com álcool gel poderá se dar quando não houver sujidade aparente. Além disso, situações como chagada e saída do plantão, bem como pós uso do sanitário, a higienização das mãos deve ser realizada com água e sabão.



Alternativa: D.

Ano: 2012

Banca: FCC

Órgão: TRF - 2ª REGIÃO

Ao esvaziar o coletor de urina de sistema fechado, o técnico de enfermagem percebeu que a luva de procedimento estava furada, ocasionando contato direto com a pele íntegra da mão e a urina do paciente, com diagnóstico de hipertensão arterial. Após a retirada das luvas, essa situação requer, como procedimento mínimo,

- a) fricção antisséptica das mãos com gel alcoólico.
- b) degermação da pele das mãos com iodo povidine.
- c) lavagem das mãos com clorexidine degermante.
- d) higienização das mãos com água e sabão.
- e) degermação da pele das mãos com gel alcoólico.

Resposta

O contato com a urina requer higienização das mãos com água e sabão. Não deverá ser substituído por álcool gel por ter sujidade aparente.

Veja que a degermação não fere nenhuma técnica asséptica, no entanto, está sendo cobrado “procedimento mínimo”.

Alternativa: D.



1.2 AVALIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA

A Escala de Glasgow é um instrumento de avaliação do nível de consciência que utiliza 3 critérios intitulados por Abertura ocular, Resposta verbal e Melhor resposta motora. Gera-se uma pontuação de 3 a 15.

A orientação mais atual consiste na aplicação da escala, segundo os seguintes critérios:





Vale lembrar que há situações impeditivas da aplicação da escala, tais como:

Fatores Pré-Existentes

- Linguagem ou diferenças culturais
- Défice intelectual ou neurológico
- Perda auditiva ou impedimento de fala

Efeitos do tratamento atual

- Intubação ou traqueostomia,
- Sedação

Efeitos de outras lesões ou lesões

- Fratura orbital/craniana
- Disfasia ou hemiplegia
- Dano na medula espinhal

Com relação aos locais de estimulação, seguem abaixo:



Vamos à escala:

Caso determinado item não possa ser avaliado, a pontuação será NT (Não Testável), o que é novidade em relação ao uso da escala anterior.



ABERTURA OCULAR

NOVA ESCALA				ESCALA ANTIGA	
Critério	Verificado	Classificação	Pontuação	Classificação	Pontuação
Olhos abertos previamente à estimulação		Espontânea	4	Espontânea	4
Abertura ocular após ordem em tom de voz normal ou em voz alta		Ao som	3	A voz	3
Abertura ocular após estimulação das extremidades dos dedos		A pressão	2	A dor	2
Ausência persistente de abertura ocular, sem fatores de interferência		Ausente	1	Nenhuma	1
Olhos fechados devido a fator local		Não testável	NT		

Note que, em comparação com a tabela anteriormente utilizada, esta, mais atual, não utiliza o termo “dor”, mas diz respeito a “pressão”, como em “após estimulação da extremidade dos dedos”.

Outra alteração diz respeito ao termo “voz” que foi substituído por “som”.

RESPOSTA VERBAL

NOVA ESCALA				ESCALA ANTIGA	
Critério	Verificado	Classificação	Pontuação	Classificação	Pontuação
Resposta adequada relativamente ao nome, local e data		Orientada	5	Orientada	4
Resposta não orientada, mas comunicação coerente		Confusa	4	Confusa	3



Palavras isoladas inteligíveis		Palavras	3	Palavras inapropriadas	2
Apenas gemidos		Sons	2	Palavras incompreensíveis	1
Ausência de resposta audível, sem fatores de interferência		Não testável	1	Nenhuma	
Fator que interfere com a comunicação			NT		

A mudança neste bloco foi a alteração do termo “palavras inadequadas” por “palavras”, bem como do termo “palavras incompreensíveis” por “sons”.

MELHOR RESPOSTA MOTORA

NOVA ESCALA				ESCALA ANTIGA	
Critério	Verificado	Classificação	Pontuação	Classificação	Pontuação
Cumprimento de ordens com 2 ações		A ordens	6	Obedece a comandos	6
Elevação da mão acima do nível da clavícula ao estímulo na cabeça ou pescoço		Localizada	5	Localiza dor	5
Flexão rápida do membro superior ao nível do cotovelo, padrão predominante não anormal		Flexão normal	4	Movimento de retirada	4
Flexão de membro superior ao nível do cotovelo, padrão predominante claramente anormal		Flexão anormal	3	Decorticação	3
Extensão do membro superior ao nível do cotovelo		Extensão	2	Descerebração	2



Ausência de movimentos dos membros superiores/inferiores, sem fatores de interferências		Ausente	1	Nenhuma	1
Fator que limita resposta motora		Não testável	NT		

Na primeira linha, no termo “2 ações” diz respeito à solicitação de movimentação das mãos e das pernas. Outro ponto diz respeito à flexão anormal, anteriormente chamada de decorticação, que se refere a uma flexão menos efetiva. Já o termo “extensão” substituiu o termo “descerebração”.

Veja as características referente à classificação de “normal” ou “anormal” quanto à flexão:



INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados devem ser escritos com a pontuação relativa a cada grupo avaliado. Explicando melhor:

- Abertura Ocular: representado pela letra “O” com pontuação de 0 a 4.
- Resposta Verbal: representado pela letra “V” com pontuação de 0 a 5.
- Melhor Resposta Motora: representado pela letra “M” com pontuação de 0 a 6.

Assim sendo, o resultado obtido (p. ex. 9) será escrito da seguinte forma: O3V3M3=9, ou seja, a avaliação da abertura ocular recebeu pontuação 3, a avaliação da resposta verbal recebeu pontuação 3 e a avaliação da melhor resposta motora recebeu pontuação 3.

Pontuação total: de 3 a 15

3 = Coma profundo; (85% de probabilidade de morte; estado vegetativo)



4 = Coma profundo;

7 = Coma intermediário;

11 = Coma superficial;

15 = Normalidade.

Classificação do Trauma cranioencefálico (ATLS, 2005)

3-8 = Grave; (necessidade de intubação imediata)

9-13 = Moderado;

14-15 = Leve.

Além disso, o resultado é melhor avaliado quando em gráfico, pois descreve o histórico da evolução ou mal prognóstico.

ABERTURA OCULAR	Classificação	Pontuação			
	Espontânea	4	.		
	Ao som	3		.	.
	A pressão	2			
	Ausente	1			
	Não testável	NT			

RESPOSTA VERBAL	Orientada	4			
	Confusa	3	.		
	Palavras	2			



	Sons	1		.	.
	Não testável	NT			
MELHOR RESPOSTA MOTORA	A ordens	6			
	Localizada	5			
	Flexão normal	4			
	Flexão anormal	3	.		
	Extensão	2		.	.
	Ausente	1			
	Não testável	NT			

Ano: 2017

Banca: CS-UFG

Órgão: UFG

Em pacientes gravemente enfermos é usada uma escala neurológica que permite avaliar o nível de consciência de uma pessoa que tenha sofrido um traumatismo cranioencefálico. Essa avaliação que indica o nível de consciência, de acordo com as respostas de abertura ocular, verbal e motora, é chamada de escala de coma:

- a) Braden
- b) Glasgow.
- c) Babinski.
- d) Cincinnati.

Resposta

É a escala de Glasgow que o enunciado se refere. Trata-se de uma escala neurológica com o objetivo de registrar o nível de consciência de uma pessoa, para avaliação



inicial e contínua após um traumatismo craniano.

Alternativa: B.

Ano: 2013

Banca: IBFC

Órgão: EBSERH

A _____ é uma escala neurológica que tem o objetivo de registrar o nível de consciência de uma pessoa. São avaliados três parâmetros: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correspondente correta.

- a) Escala Richter.
- b) Escala de coma de Glasgow
- c) Escala de Braden.
- d) Escala Likert.

Resposta

A descrição dos parâmetros corresponde à Escala de coma de Glasgow.

Alternativa: B

Ano: 2013

Banca: IBFC

Órgão: MPE-SP

Paciente diagnosticado com morte cerebral, apresenta a seguinte pontuação na escala de Glasgow:

- a) Quinze
- b) Zero
- c) Dez
- d) Cinco.
- e) Três

Resposta

Ao ler morte cerebral, pense na pior condição possível que corresponde à pontuação 3. Veja que como é extremo, nem é necessário pensar nos parâmetros da escala, apenas na pontuação do pior cenário.

Alternativa: E.



Ano: 2015

Banca: FCC

Órgão: TRT - 3ª Região (MG)

Na escala de coma de Glasgow, as melhores respostas motoras com padrão de decorticação, descerebração e retirada inespecífica, têm as seguintes pontuações, respectivamente,

a) 2, 3 e 4.

b) 3, 2 e 4.

c) 4, 3 e 2.

d) 3, 4 e 2.

e) 2, 4 e 3.

Resposta

Ainda que os termos mudaram, veja a tabela:

MELHOR RESPOSTA MOTORA

NOVA ESCALA				ESCALA ANTIGA	
Critério	Verificado	Classificação	Pontuação	Classificação	Pontuação
Cumprimento de ordens com 2 ações		A ordens	6	Obedece a comandos	6
Elevação da mão acima do nível da clavícula ao estímulo na cabeça ou pescoço		Localizada	5	Localiza dor	5
Flexão rápida do membro superior ao nível do cotovelo, padrão predominante não anormal		Flexão normal	4	Movimento de retirada	4
Flexão de membro superior ao nível do cotovelo, padrão predominante claramente anormal		Flexão anormal	3	Decorticação	3
Extensão do membro superior ao nível do cotovelo		Extensão	2	Descerebração	2
Ausência de movimentos dos membros superiores/inferiores, sem fatores de		Ausente	1	Nenhuma	1



interferências					
Fator que limita resposta motora		Não testável	NT		

Vale a pena decorar o seguinte: **Decorticação equivale à flexão anormal e tem pontuação 3; descerebração equivale à extensão e tem pontuação 2.** Só com essas, já dava para acertar a questão.

Alternativa: B

Ano: 2016

Banca: IBFC

Órgão: EBSEH

Em relação à gravidade, utiliza-se a Escala de Coma de Glasgow para se avaliar uma pessoa com TCE (trauma cranioencefálico). Assinale a alternativa que contemple o escore considerado grave no TCE.

- a) Escore acima de 18.
- b) Escore de 9 a 12.
- c) Escore 13 a 15.
- d) Escore 15 a 18.
- e) Escore abaixo de 8.

Resposta

Lembrando: em relação a Trauma cranioencefálico:

3 a 8: grave

9 a 13: moderado

14 a 15: leve

Alternativa: E

1.3 TEMPERATURA CORPORAL

Regulada pelo **HIPOTÁLAMO**, se refere a diferença de calor que o corpo produz e a que é perdido para o ambiente.



O hipotálamo anterior controla a perda de calor e o hipotálamo posterior controla a produção de calor. Quando as células nervosas do hipotálamo se aquecem além da temperatura ideal, impulsos são enviados para reduzir a temperatura corpórea. Os mecanismos de perda de calor incluem sudorese, vasodilatação e inibição da produção de calor.

Já se houver percepção do hipotálamo que o corpo está com temperatura abaixo da ideal, inicia-se processos de conservação de calor, tais como vasoconstrição, contração muscular voluntária e tremores.

Os valores considerados normais de temperatura axilar variam de 36 a 38°C, no entanto, o valor da temperatura pode se alterar:

- De acordo com o local em que foi mensurada: oral, retal, axilar, membrana timpânica, artéria temporal, esofágica, artéria pulmonar ou bexiga.
- Em resposta fisiológica ao exercício, ritmo circadiano, ambiente, estresse, níveis hormonais.
- Em resposta a fator patológico: infecções diversas.

HIPERTERMIA

A FEBRE, considerada um deslocamento de ajuste do ponto superior hipotalâmico, é a temperatura ACIMA DE 38°C (>37,5°C se refere a subfebril) e ocorre da incapacidade dos mecanismos de perda de calor de acompanhar o ritmo de uma produção excessiva de calor, resultando no aumento anormal da temperatura corporal. Pirógenos, tais como bactérias e vírus elevam a temperatura corporal por desencadearem resposta do sistema imune. Durante episódios de febre, ocorre leucocitose e os níveis férricos plasmáticos diminuem, suprimindo o crescimento de microrganismos.

Importante mencionar que a hipertermia maligna se trata de uma alteração genética de produção de calor descontrolada que ocorrem quando as pessoas susceptíveis recebem certas substâncias anestésicas.

Já a INSOLAÇÃO decorre da depressão da função hipotalâmica por aumento da temperatura ambiental, causando temperatura corporal igual ou superior a 40°C, cujos sintomas são tontura, confusão, delírio, sede excessiva, náuseas, câibras, distúrbios visuais, aumento da frequência cardíaca e redução da pressão arterial, pele quente e seca.

HIPOTERMIA

Perda de calor durante exposição prolongada ao frio sobrepuja a capacidade do organismo de produzir calor, causando hipotermia. Pode ser não intencional ou intencional, quando se deseja, por exemplo,



reduzir a demanda metabólica e necessidade de oxigênio do organismo, durante determinados procedimentos cirúrgicos.

Clarificação da Hipotermia:

Leve: 32- 34°C

Moderada: 28 - 32°C

Grave (ou profunda): < 32°C

A exposição do corpo a baixas temperaturas pode ocasionar formação de cristais de gelos intracelulares com consequentes danos circulatórios e teciduais, cujos locais mais afetados são: lóbulo da orelha, ponta do nariz, ponta dos dedos das mãos e dos pés.

Características dos principais locais de aferição da temperatura:

Oral

Vantagens: método não invasivo.

Desvantagens: dificuldade na utilização em crianças jovens, TOT, incerteza quanto hipotermia.

Axilar

Vantagens: facilidade de uso, método não invasivo.

Desvantagens: não reflete a temperatura central, questionável exatidão em clientes com hipotermia, facilidade do deslocamento durante a medida.

Membrana timpânica

Vantagens: método não invasivo, rapidez, facilidade de uso, proximidade com o hipotálamo, indica hipotermia, exatidão de medida com ou sem otite média. É o método que melhor reflete a temperatura do sangue que banha o hipotálamo

Desvantagens: técnica inadequada pode afetar a medida, fratura maxilofacial, base de crânio e otorragia, influência da temperatura ambiente e da presença de cerúmen.

Retal

Vantagens: medida da temperatura visceral reflete proximidade da temperatura central



Desvantagens: causa desconforto físico e emocional, inexatidão por presença de fezes no reto, risco de lesão da mucosa, contraindicado em clientes com trauma retal ou alguma doença local.

Ano: 2017

Banca: CONSULPLAN

Órgão: TRE/RJ

Os sinais vitais são indicadores do estado de saúde do paciente, permitindo identificar suas necessidades básicas de maneira rápida e eficiente, sendo a base para a solução de seus problemas clínicos. Sobre a temperatura corporal, é INCORRETO afirmar que:

- a) Como procedimento de rotina, a aferição retal é contraindicada em recém-nascidos.
- b) O local onde é aferida não é um fator que interfere na temperatura obtida do paciente.
- c) Os recém-nascidos podem sofrer drásticas variações de temperatura de acordo com o ambiente.
- d) É a diferença entre a quantidade de calor produzido pelo corpo e a quantidade de calor perdido para o meio externo.

Resposta

Vimos que o local onde a temperatura é aferida é um fator que interfere na temperatura obtida do paciente, tal como na boca, axila ou retal.

Alternativa: B.

Ano: 2017

Banca: UFES

Órgão: UFES

A verificação dos sinais vitais são uma forma rápida e eficiente de monitorar as condições de um paciente ou de identificar seus problemas e de avaliar sua resposta à intervenção. Sobre os sinais vitais, analise as afirmativas abaixo:

- I. A febre é um mecanismo de defesa corporal normal.
- II. A avaliação respiratória inclui aferição para determinar a eficácia da ventilação, da perfusão e da difusão da oxigenação.
- III. Diversas variáveis hemodinâmicas contribuem para determinar a pressão arterial.
- IV. Alterações em um sinal vital não influenciam as características de outros sinais vitais.

Está CORRETO o que se afirma em:



- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I, II e III, apenas.
- d) II e IV, apenas.
- e) I e IV, apenas.

Resposta

I. CORRETA

II. CORRETA

III. CORRETA

IV. Alterações em um sinal vital INFLUENCIAM as características de outros sinais vitais. Ex. durante um exercício físico, a frequência cardíaca e a respiratória são elevadas concomitantemente.

Alternativa: C.

Ano: 2015

Banca: INSTITUTO AOCP

Órgão: EBSEH

Qual anestésico pode desencadear Hipertermia maligna?

- a) Óxido Nitroso
- b) Fentanil
- c) Succinilcolina
- d) Tomidato
- e) Midazolam

Resposta

Trata-se de uma síndrome genética com mutações nos canais de cálcio da musculatura esquelética com liberação aumentada de cálcio no músculo. Pode ser desencadeada pela exposição à alguns anestésicos, por exemplo, succinilcolina.

Alternativa: C.

Ano: 2010

Banca: CESGRANRIO

Órgão: Petrobras

O registro remittente para a alteração da temperatura de um trabalhador com queixas de mal-estar após 12 horas em atividade em seu posto de trabalho significa

- a) hipertermia que oscila, porém não retorna ao normal.
- b) hipertermia com poucas oscilações.



- c) hipotermia subclínica.
- d) hipotermia subnormal.
- e) estado subfebril.

Ano: 2015

Banca: INSTITUTO AOCP

Órgão: EBSERH

A temperatura que mais, aproximadamente, reflete a temperatura cerebral durante a hipotermia é a

- a) retal.
- b) visceral.
- c) axilar
- d) timpânica.
- e) esofágica.

Resposta

O método timpânico é o que reflete melhor a temperatura do sangue que banha o hipotálamo.

Alternativa: D.

Ano: 2016

Banca: FAURGS

Órgão: HCPA

Assinale a alternativa que apresenta algumas das manifestações clínicas da hipotermia.

- a) Hipotonia, taquipneia e sudorese.
- b) Vasoconstrição, letargia e alcalose.
- c) Sucção débil, sudorese e apneia.
- d) Hipertonia, tremores e taquicardia.
- e) Apneia, queda de saturação de O₂ e hipotonia.

Resposta

Associe a hipotermia com a dificuldade respiratória e consequente queda de saturação.

Alternativa: E.



1.4 FREQUÊNCIA CARDÍACA

O pulso é uma delimitação palpável da corrente sanguínea na artéria periférica. Fatores mecânicos, neurais e químicos regulam a força de contração ventricular e o seu volume de ejeção.

No entanto, quando tais fatores não vêm acompanhados da alteração do volume de ejeção, uma alteração na frequência cardíaca resultará em uma alteração de débito cardíaco e, conseqüentemente, alteração na pressão arterial.

Características do pulso:

FREQUÊNCIA:

Há diversos fatores que podem elevar a frequência do pulso tais como exercício, temperatura (febre e calor), emoções (ansiedade), dor, fármacos (epinefrina), hemorragia (estimulação simpática), mudanças posturais (em pé), doenças pulmonares (DPOC).

Estando o paciente isentos das condições acima, os valores normais para um adulto variam de 60 a 100 batimentos por minuto (bpm). Logo, taquicardia e bradicardia são alterações na frequência cardíaca cujos valores se apresentam acima de 100 e abaixo de 60bpm respectivamente.

IDADE	FC
BEBÊ	120 - 160
PRÉ ESCOLAR	80 - 110
ADOLESCENTE	60 - 90
ADULTO	60 - 100

POTTER, P.A.; PERRY, A.G. Fundamentos de Enfermagem. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2013.



RITMO

Os batimentos costumam apresentar intervalos rítmicos e regulares a cada pulso. Um intervalo interrompido por um batimento precoce ou tardio indica um ritmo anormal ou disritmia e interfere diretamente no débito cardíaco. Assim, o pulso poderá também ser classificado em rítmico ou arrítmico.

FORÇA

A força reflete o volume de sangue ejetado a cada parede arterial a cada contração cardíaca. Pode ser classificado em forte e cheio ou fraco e filiforme.

A técnica consiste em localizar o pulso e pressioná-lo levemente com 2 ou 3 dedos durante 60 segundos, visto que o valor final será em batimentos por minuto.

Obs: Não se deve utilizar o dedo polegar para a verificação do pulso.

Locais de verificação do pulso:

LOCAL	LOCALIZAÇÃO	CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO
Temporal	Acima do osso temporal da cabeça, acima e lateral ao olho	Local facilmente acessível usado para crianças
Carótida	Ao longo da extremidade medial do músculo esternocleidomastóideo no pescoço	Local facilmente acessível usado durante o choque fisiológico ou na parada cardíaca quando outros locais não são palpáveis
Apical	Quarto a quinto espaço intercostal na linha clavicular média esquerda	Local usado para ausculta a fim de obter a pulsação apical
Braquial	Sulco entre os músculos bíceps e tríceps na fossa antecubital	Local usado para avaliar a circulação abaixo do braço e auscultar a pressão arterial
Radial	No pulso do antebraço, na lateral radial ou no lado do polegar	Local comumente usado para avaliar o pulso periférico e o estado da circulação para a mão
Ulnar	No lado ulnar do pulso do antebraço	Local usado para avaliar o estado da circulação para a mão; também utilizado para realizar o teste de Allen
Femoral	Abaixo do ligamento inguinal, a meio caminho entre a sínfise púbica e a espinha íliaca anterossuperior	Local usado para avaliar o pulso durante o choque fisiológico ou na parada cardíaca quando outros locais não são palpáveis; usado para avaliar o estado da circulação para a perna
Poplíteo	Atrás do joelho na fossa poplíteia	Local usado para avaliar o estado da circulação para a perna inferior
Tibial posterior	Lado interno do tornozelo, abaixo do maléolo medial	Local usado para avaliar o estado da circulação para o pé
Artéria dorsal do pé	Ao longo da parte de cima do pé, entre a extensão dos tendões do dedo maior	Local usado para avaliar o estado da circulação para o pé

POTTER, P.A.; PERRY, A.G. Fundamentos de Enfermagem. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2013.

Ano: 2017

Banca: INSTITUTO AOCP

Órgão: EBSERH

Ao verificar o pulso de um adulto de 55 anos, o técnico de enfermagem observou que a frequência da pulsação estava aumentada, caracterizando

a) taquisfigmia.

b) pulso filiforme.



- c) normocardia.
- d) ritmo sinusal.
- e) arritmia.

Resposta

Frequência aumentada corresponde a taquicardia ou taquisfigmia (frequência aumentada e pulso fino).

Alternativa: A.

Ano: 2015

Banca: INSTITUTO AOCP

Órgão: EBSERH

Ao observar os sinais vitais de um paciente, o técnico de enfermagem verificou uma frequência cardíaca de 120 bat/min e pulso fino, que pode ser sinônimo de

- a) normolaxia.
- b) arritmia.
- c) felioformia.
- d) bradilaxia.
- e) taquisfigmia.

Resposta

Essa banca gosta deste termo!

O paciente está taquicárdico (taquicardia) e com o pulso filiforme = taquisfigmia.

Alternativa: E

Ano: 2017

Banca: FEPESE

Órgão: SES/SC

Assinale a alternativa correta em relação à avaliação dos sinais vitais:

- a) Bradicardia são os batimentos cardíacos acima do normal.
- b) Taquicardia são os batimentos cardíacos abaixo do normal.
- c) O pulso é um dos sinais vitais que pode nos dar informações sobre o funcionamento do aparelho circulatório.
- d) Os valores considerados normais de pulsação de um adulto são de 90 a 120 bpm.
- e) Aspectos como dor, medo, exercício físico e temperatura corporal elevada não devem ser considerados pois não alteram a frequência do pulso.

Resposta



- a) ERRADA. TAQUICARDIA são os batimentos cardíacos acima do normal.
- b) ERRADA. BRADICARDIA são os batimentos cardíacos abaixo do normal.
- c) CERTA
- d) ERRADA. 120 bpm é padrão taquicárdico.
- e) ERRADA. Aspectos como dor, medo, exercício físico e temperatura corporal elevada PODEM ALTERAR a frequência do pulso.

Alternativa: C.

Ano: 2014

Banca: INSTITUTO AOCP

Órgão: UFC

Rochinha, 75 anos, cor branca, viúvo, tem 4 filhos, analfabeto e aposentado, de religião católica. Procurou o serviço de emergência devido às dores generalizadas, câibras e mal estar. Fumou durante os últimos 15 anos de sua vida, além de beber 1 dose de cachaça todos os dias antes do almoço e jantar. Apresenta-se com quadro clínico de: bradisfigmia, taquipneia e hipertermia, que significam

- a) pulso fino e taquicárdico, diminuição da frequência respiratória e temperatura acima do valor normal.
- b) pulso com frequência normal, ausência de movimentos respiratórios e temperatura abaixo do valor normal.
- c) pulso fino e bradicárdico, aumento da frequência respiratória e temperatura acima do valor normal.
- d) pulso fino e taquicárdico, aumento da frequência respiratória e temperatura acima do valor normal.
- e) pulso fino e bradicárdico, redução na frequência respiratória e temperatura acima do valor normal.

Resposta

Tanta história no início da questão para saber apenas o seguinte:

Bradisfigmia: pulso fino e bradicárdico

Taquipneia: aumento da frequência respiratória

Hipertermia: temperatura acima do valor normal

Alternativa: C.



Ano: 2014

Banca: INSTITUTO AOCP

Órgão: UFMT

Bradisfigmia, pirexia, hemianópsia são termos utilizados respectivamente para descrever:

- a) frequência cardíaca abaixo do normal, sensação de ardor, ruptura prematura da membrana amniótica.
- b) frequência cardíaca abaixo do normal, febre, ruptura prematura da membrana amniótica.
- c) frequência cardíaca abaixo do normal, febre, perda da visão em uma das metades do campo visual.
- d) pulso lento e filiforme, febre, ruptura prematura da membrana amniótica.
- e) pulso lento e filiforme, febre, perda da visão em uma das metades do campo visual.

Resposta

Bradisfigmia: frequência cardíaca abaixo do normal/filiforme,

Pirexia: febre

Hemianópsia: perda da visão em uma das metades do campo visual.

Alternativa: E.

Ano: 2008

Banca: FCC

Órgão: TRT - 2ª REGIÃO (SP)

As arritmias referentes à frequência cardíaca podem apresentar-se como:

- a) angina pectoris e taquicardia.
- b) bradicardia e disartria.
- c) choque cardiogênico e pulso em plateau.
- d) fibrilação e flütter atrial.
- e) bloqueio atrioventricular e pulso de Cheyne-Stokes.

Resposta

Dentre as alternativas, a única que diz respeito a 2 exemplos de manifestações de origem arritmica é a fibrilação e o flutter atrial.

Alternativa: D.



Ano: 2015

Banca: INSTITUTO AOCP

Órgão: EBSERH

A ordem Céfalo-caudal para os locais indicados na aferição do pulso é

- a) carotídeo e temporal, braquial, ulnar, radial, pedioso, subclávio, axilar e femoral.
- b) carotídeo e auricular, braquial, poplíteo, apical, femoral, radial, ulnar, tibial anterior, pedioso e tibial posterior.
- c) pedioso, poplíteo, braquial, radial, carotídeo, temporal, femoral.
- d) temporal, carotídeo, subclávio, apical, axilar, braquial cubital, radial, ulnar, femoral, poplíteo, tibial anterior, pedioso e tibial posterior.
- e) subclávio, axilar, braquial cubital, temporal, carotídeo, radial, ulnar, femoral, poplíteo, tibial anterior, pedioso e tibial posterior.

Resposta

Considerado que a ordem é cefalo-caudal, de início, já temos o pulso temporal e já é possível encontrar a resposta.

Alternativa: D.

1.5 FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA

A respiração é o mecanismo que o corpo utiliza para realizar a troca entre oxigênio e gás carbônico entre a atmosfera e o sangue e as células.

Envolve mecanismos como ventilação (circulação de gases para dentro e para fora dos pulmões), difusão (movimento do oxigênio e do dióxido de carbono entre alvéolos e hemácias) e perfusão (distribuição das hemácias para os capilares pulmonares).

O centro respiratório no tronco cerebral regula o controle involuntário das respirações. O padrão respiratório dos adultos costuma ser suave e em torno de 12 a 20 inspirações por minuto (adulto). A inspiração é um processo ativo e a expiração é um processo passivo.

São fatores que influenciam as características da respiração:

- Exercício: aumenta frequência e profundidade
- Dor aguda: aumenta o ritmo e a frequência da respiração e reduz a profundidade.
- Ansiedade: aumenta o ritmo e a frequência.
- Tabagismo: aumenta a frequência respiratória durante o repouso.



- Medicamentos: analgésicos opióides , sedativos e anestésicos gerais deprimem a frequência e a profundidade da respiração.
- Lesão neurológica: inibe centro respiratório, e reduzem a frequência e ritmo.
- Função a hemoglobina: níveis séricos diminuídos de hemoglobina reduzem a capacidade de oxigênio do sangue e aumentam a frequência respiratória

A avaliação da frequência respiratória ocorre pela observação da expansão torácica através da contagem de inspirações durante 1 minuto. Geralmente a contagem se dá após a verificação do pulso, visto que não convém que o paciente note que está sendo contada suas inspirações para que o mesmo, ainda que sem perceber, altere o padrão respiratório.

Devem, também, ser avaliados:

PROFUNDIDADE RESPIRATÓRIA: é possível observar o grau de desvio ou movimento na parede torácica. Assim, os movimentos podem ser profundos, normais ou superficiais.

RITMO RESPIRATÓRIO: na respiração normal há um intervalo regular após cada ciclo respiratório. Assim, a respiração pode ser regular ou irregular.

São padrões respiratórios:

- **EUPNEIA:** frequência respiratória entre 12 e 20 ipm com inspirações e expirações regulares.




- **BRADIPNEIA:** A frequência da respiração é regular, mas lenta (menos de 12 ipm)



- **TAQUIPNEIA:** A frequência da respiração é regular, mas rápida (mais de 20 ipm)



- **HIPERPNEIA:** A respiração é difícil, com frequência e profundidade aumentadas (superior a 20 ipm)



- **APNEIA:** A respiração essa durante vários segundos




- **HIPERVENTILAÇÃO:** A frequência e profundidade da respiração aumentam



- **HIPOVENTILAÇÃO:** A frequência respiratória é normalmente lenta e a profundidade está reprimida



- **RESPIRAÇÃO DE CHEYNE-STOKES** (o padrão preferido das bancas!!!) A frequência e a profundidade da respiração são irregulares caracterizadas pela alternância entre período de apneia e hiperventilação.



- **RESPIRAÇÃO DE KUSSMAUL:** A respiração é anormalmente profunda, regular e de alta frequência.



- **RESPIRAÇÃO DE BIOT:** A respiração é anormalmente superficial para 2 ou 3 respirações, seguidas de um período irregular de apneia.



Ano: 2017

Banca: CONSULPLAN

Órgão: TRF 2ª REGIÃO

O controle da frequência respiratória normalmente é realizado em seguida à verificação do pulso por que:

- a) O pulso interfere diretamente no padrão respiratório.
- b) Está definido como regra na enfermagem para a verificação dos sinais vitais.
- c) Pode haver alteração do pulso através da mudança do padrão da respiração.
- d) Para evitar que o paciente perceba e exerça controle voluntário sobre a respiração.

Resposta

Como vimos acima, para que o paciente não altere voluntariamente seu padrão respiratório, opta-se pela sua verificação após realização a contagem da frequência cardíaca.

Alternativa: E.

Ano: 2015

Banca: INSTITUTO AOCP

Órgão: EBSEH

Dentre as alterações respiratórias, como é chamada aquela que se caracteriza por aumento gradual na profundidade das respirações, seguido de decréscimo gradual dessa profundidade e com período de apneia subsequente?

- a) Ortopneia.
- b) Respiração de Cheyne Stokes.
- c) Murmúrios adventícios.
- d) Respiração estertorosa.
- e) Taquipneia.

Resposta

Taquipneia – apneia – taquipneia (só para te ajudar a decorar) é Respiração de Cheyne Stokes.



Alternativa: B.



Ano 2015

Banca: FCC

Órgão: 3ª REGIÃO/MG

O enfermeiro ao atender um paciente percebe alteração no seu padrão respiratório, representado pela figura abaixo.



Este padrão respiratório é chamado de:

- a) Biot.
- b) Kussmaul.
- c) Cheyne-Stokes.
- d) Platipneia.
- e) Ortopneia.

Resposta

a) ERRADA. A Respiração de Biot é uma alteração do padrão respiratório, causada por uma compressão do tronco cerebral. Apresenta ritmo irregular com variação de frequência e profundidade, seguidas ou não de apneia.

b) ERRADA. Respiração de Kussmaul é o padrão lento e profundo, seguida de apneia e expiração suspirante.

c) CORRETA. A Respiração Cheyne-Stokes é também chamada de periódica ou cíclica. Consiste em momentos de hiperventilação intercalados com apneia. O gráfico que a representa é o do próprio enunciado.

d) ERRADA. Platipneia é a dispneia quando a pessoa adota a posição ortostática (em pé).

e) ERRADA. Ortopneia, ao contrário da anterior, é a dispneia quando a pessoa adota a posição deitada ocasionada pelo aumento do retorno do sangue venoso nesta posição.

Alternativa: C.

Ano: 2005

Banca: CESPE

Órgão: TRT - 16ª REGIÃO (MA)

Ocorre bradipneia quando a frequência respiratória está acima do normal.

Resposta



Ao contrário. O descrito é a taquipneia. Bradipneia é a frequência respiratória abaixo do normal.

Alternativa: Errada.

Ano: 2016

Banca: FCC

Órgão: TRT - 20ª REGIÃO (SE)

O padrão respiratório de uma pessoa pode sofrer alterações, sendo algumas delas denominadas

- a) dispneia, parada respiratória e respiração de Blakemore.
- b) taquipneia, dispneia, ortopneia, apneia, respiração ruidosa e respiração Machado Guerreiro
- c) bradipneia, dispneia, ortopneia, apneia, respiração de plateau e respiração ruidosa
- d) respiração ruidosa, respiração de Sengstaken e apneia.
- e) bradipneia, taquipneia, dispneia, ortopneia, apneia, respiração de Cheyne-Stokes e respiração ruidosa.

Resposta

- a) ERRADA. Sengstaken-Blakemore: é um balão esofágico
- b) ERRADA. Respiração Machado Guerreiro não existe.
- c) ERRADA. Pressão de "Plateau" e não respiração de Plateau é valor da pressão das vias aéreas, medida no momento da pausa inspiratória.
- d) ERRADA. A banca gostou desse nome! Veja alternativa A.
- e) CERTA

Alternativa: E

1.6 PRESSÃO ARTERIAL

A pressão arterial consiste na tensão que o sangue exerce nas paredes das artérias . São fatores que influenciam a pressão arterial: pelo débito cardíaco, resistência vascular periférica, elasticidade dos vasos, idade e viscosidade sanguínea.

Para a AFERIÇÃO manual da pressão arterial utiliza-se um esfigmomanômetro e um estetoscópio e o valor será em mmHg.



- Primeiramente, é necessário selecionar o tamanho da braçadeira.
- A largura do manguito deve corresponder a 40% da circunferência braquial e seu comprimento a 80%.
- A braçadeira deve envolver suavemente o braço e o manguito deve ser posicionado sobre a artéria braquial e com a margem inferior da braçadeira cerca de 2,5 cm acima da dobra do cotovelo.
- O indivíduo deve ser colocado em ambiente calmo e com o braço apoiado a nível do coração e deixando-o à vontade, permitindo 5 minutos de repouso.

- Palpar o pulso radial e inflar o manguito até seu desaparecimento do pulso.
- Verificar o valor que isso ocorreu e somar 30 mmHg ao valor inicial.
- Desinsuflar rapidamente o manguito e esperar de 15 a 30 segundos antes de insuflá-lo novamente.
- O diafragma do estetoscópio deve ser posicionado sobre a artéria braquial com leve pressão e então, deve-se insuflar o manguito até o valor anterior somado aos 30 mmHg e Desinsuflar na velocidade de 2 a 3 mmHg por segundo.
- Os sons auscultados (sons de Korotkof), sendo o primeiro som o determinante do valor da pressão sistólica e o último (antes do desaparecimento), a pressão diastólica.

A classificação dos valores sistólicos e diastólicos se classificam, conforme a seguir:



CLASSIFICAÇÃO	PRESSÃO SISTÓLICA (mmHg)	PRESSÃO DIASTÓLICA (mmHg)
Ótima	< 120	<80
Normal	< 130	<85
Limítrofe	130 - 139	85 - 89
Hipertensão Estágio 1	140 - 159	90 - 99
Hipertensão Estágio 1	160 - 179	100 - 109
Hipertensão Estágio 1	>= 180	>=110



Ano: 2017

Banca: CESGRANRIO

Órgão: PETROBRAS

Para executar a técnica correta de verificação da pressão arterial no braço de um adulto, o profissional de Enfermagem deverá observar alguns conceitos e cuidados.

Nesse sentido, esse profissional deve considerar o seguinte:

- a) a margem inferior no manguito deverá estar na fossa ilíaca.
- b) a campânula do estetoscópio deve estar sobre a artéria braquial.
- c) manguitos frouxos podem levar à leitura falsamente elevada da pressão.
- d) fumo, cafeína e atividade física não alteram a pressão arterial.
- e) o primeiro batimento ouvido deverá ser considerado como a pressão diastólica.

Resposta

- a) ERRADO. A margem inferior no manguito deverá estar cerca de 2cm da dobra oposta ao cotovelo.
- b) CORRETA. A campânula do estetoscópio deve estar sobre a artéria braquial.
- c) ERRADO. Manguitos frouxos podem levar à leitura falsamente BAIXA da pressão.
- d) ERRADA. Fumo, cafeína e atividade física PODEM ALTERAR a pressão arterial.
- e) ERRADA. O primeiro batimento ouvido deverá ser considerado como a pressão SISTÓLICA.

Alternativa: B.

Ano: 2017

Banca: INSTITUTO AOCP

Órgão: EBSERH

No momento da verificação da pressão arterial, o técnico de enfermagem deve utilizar manguitos com câmara inflável (cuff) adequada para a circunferência do braço de cada pessoa, observando que a largura do manguito deve ser de, pelo menos:

- a) 50% do comprimento do braço (distância entre o olécrano e o acrômio).
- b) 40% do comprimento do braço (distância entre o olécrano e o acrômio).
- c) 60% comprimento do braço (distância entre o olécrano e o acrômio).
- d) 30% comprimento do braço (distância entre o olécrano e o acrômio).
- e) 20% comprimento do braço (distância entre o olécrano e o acrômio).

Resposta



Retomando: a largura do manguito deve corresponder a 40% da circunferência braquial e seu comprimento a 80%.

Alternativa: B.

Ano: 2015

Banca: VUNESP

Órgão: Prefeitura de São José dos Campos - SP

Na consulta de enfermagem de dengue, o enfermeiro verifica a pressão arterial do paciente deitado ou sentado e em pé, considerando o estreitamento ou convergência de PA um sinal de choque. A pressão arterial é considerada convergente se

- a) em todas as medidas, o paciente apresenta níveis pressóricos elevados.
- b) em todas as medidas, o paciente apresenta níveis pressóricos muito baixos.
- c) a diferença entre a PA sistólica e a PA diastólica for igual ou menor do que 20 mmHg.
- d) diferença entre a PA sentado e a PA em pé for igual ou menor do que 20 mmHg.
- e) em todas as posições, o paciente mantiver os níveis pressóricos iguais.

Resposta

Pressão arterial convergente ocorre quando a diferença entre a PA sistólica e a PA diastólica for igual ou menor do que 20 mmHg.

Alternativa: C.

Ano: 2017

Banca: IBFC

Órgão: EBSERH

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Considerando a aferição da pressão arterial, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e acima da altura do precórdio.
- II. Palpar o pulso apical e inflar o manguito até 100mmHg acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido.
- III. A pressão diastólica corresponde ao desaparecimento dos batimentos (fase V).
- IV. A pressão sistólica corresponde ao valor em que começarem a ser ouvidos os



ruídos de Korotkof (fase I).

- a) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I,II,III e IV estão corretas
- c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
- e) Apenas as afirmativas III está correta

Resposta

I. ERRADO. O paciente deve estar sentado, com o braço apoiado NA ALTURA DO CORAÇÃO.

II. ERRADO. Palpar o pulso BRAQUIAL e inflar o manguito até 30mmHg acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido.

III. CORRETA.

IV. CORRETA.

Alternativa: A.

Ano: 2014

Banca: FCC

Órgão: TJ-AP

A aferição da pressão arterial é importante para o rastreamento e o diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica. Uma das condições padronizadas pelo Ministério da Saúde que assegura a medida correta da pressão arterial é,

- a)medi-la nos dois braços e considerar o valor mais baixo aferido como sendo o verdadeiro.
- b)palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 10 mmHg acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido.
- c)medi-la após 5 minutos de repouso.
- d)evitar a aferição nas 4 horas precedentes ao uso de cigarros e à ingestão de bebidas com cafeína.
- e)desinflar o manguito rapidamente entre 8 a 10 mmHg/seg.

Resposta

- a) ERRADA. Na primeira avaliação, as medidas devem ser obtidas em ambos os braços e, em caso de diferença, deve-se utilizar como referência sempre o braço com maior valor
- b) ERRADA. Palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 30 mmHg acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido.
- c) CERTA.
- d) ERRADA. Certificar-se que o paciente não ingeriu bebidas alcólicas, café e fumos nos 30 minutos anteriores.



e) ERRADA. Proceder à deflexão lentamente (2mmHg/segundo);
Alternativa: C.

Ano: 2016

Banca: IBFC

Órgão: EBSERH

Sobre pressão arterial, assinale a alternativa correta.

- a) Ingestão de alimentos, exercícios, dor e emoções como medo, ansiedade, raiva e estresse aumentam a pressão arterial.
- b) A pressão sistólica representa o grau de resistência periférica
- c) A pressão diastólica representa a intensidade da contração ventricular
- d) A pressão arterial depende da resistência vascular periférica determinada pelas proteínas do sangue
- e) A pressão arterial geralmente é mais alta durante o sono e com o decorrer do dia pode haver uma ligeira diminuição.

Resposta

- a) CORRETA.
- b) ERRADA. A pressão DIASTÓLICA representa o grau de resistência periférica
- c) ERRADA. A pressão SISTÓLICA representa a intensidade da contração ventricular
- d) ERRADA. A pressão arterial depende da resistência vascular periférica, DETERMINADA PELAS FIBRAS VASCULARES, ESFÍNCETERES PRÉ CAPILARES E SUBSTÂNCIAS REGULADOREAS DA PRESSÃO COM ANGIOTENSINA E CATECOLAMINA.
- e) ERRADA. A pressão arterial geralmente é mais BAIXA durante o sono e com o decorrer do dia pode haver UM LIGEIRO AUMENTO.

Alternativa: A.

Ano: 2015

Banca: IF-TO

Órgão: IF-TO

O Esfigmomanômetro é o equipamento utilizado na verificação da pressão arterial e pode-se utilizar a artéria braquial na aferição. O nome clínico para o som das batidas que você ouve é "sons de Korotkof". Marque a alternativa correta de acordo com o primeiro som auscultado.

- a) Pressão arterial periaortólica.
- b) Pressão arterial mediastólica.
- c) Pressão arterial medial.



- d) Pressão arterial diastólica.
- e) Pressão arterial sistólica.

Resposta

O primeiro som auscultado se refere à pressão sistólica e o último, se refere a pressão diastólica.

Alternativa: E

Ano: 2016

Banca: FCC

Órgão: TRT - 20ª REGIÃO (SE)

Durante a consulta de enfermagem, para a verificação da pressão arterial do trabalhador que refere mal estar e ser hipertenso, o enfermeiro deverá seguir alguns procedimentos, sendo um deles

- a) certificar-se que o paciente realizou exercícios físicos há pelo menos 30 minutos, antes de iniciar o procedimento.
- b) explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso por 5 minutos em ambiente calmo.
- c) posicionar o paciente sentado com as pernas cruzadas e os pés apoiados no chão.
- d) determinar a pressão diastólica no primeiro som após a deflação do manguito, (fase II de Korotkof).
- e) colocar o manguito, sem deixar folgas, de 2 a 3 cm abaixo da fossa cubital.

Resposta

- a) ERRADA. Certificar-se que o paciente NÃO realizou exercícios há pelo menos 30 minutos antes.
- b) CERTA.
- c) ERRADA. As pernas devem estar descruzadas.
- d) ERRADA. A pressão sistólica é que corresponde ao primeiro som.
- e) ERRADA. Acima da fossa cubital.

Alternativa: B.

Ano: 2015

Banca: VUNESP

Órgão: HCFMUSP

Ao calcularmos o produto entre débito cardíaco e resistência periférica total estaremos analisando



- a) o pulso de oxigênio.
- b) a frequência cardíaca.
- c) o duplo produto arterial.
- d) a pressão parcial arterial de oxigênio.
- e) a pressão arterial.

Resposta

O débito cardíaco (volume sanguíneo ejetado por minuto) vezes a resistência periférica resulta no conceito da pressão arterial.

Alternativa: E.

Ano: 2016

Banca: INSTITUTO AOCP

Órgão: EBSERH

No procedimento para aferição da pressão arterial, é correto

- a) deixar o paciente em posição ortostática com o braço pendente.
- b) colocar o manguito do esfigmomanômetro 3 centímetros abaixo da fossa cubital.
- c) certificar-se de que o paciente está com a bexiga cheia.
- d) insuflar o manguito vagarosamente até 100 mmHg.
- e) solicitar ao paciente que não fale durante o procedimento.

Resposta

- a) ERRADA. Deixar o paciente, preferencialmente sentado, com o braço apoiado na altura do precórdio.
- b) ERRADA. Acima da fossa cubital
- c) ERRADA. Certificar-se de que ele está com a bexiga vazia.
- d) ERRADA. Palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 30 mmHg acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido.
- e) CERTA.

Alternativa: E.

Ano: 2015

Banca: INSTITUTO AOCP

Órgão: EBSERH

Os valores normais da Pressão Arterial Sistêmica de um homem adulto são:

- a) Pressão sistólica entre 120 e 139 mmHg ou pressão diastólica entre 80 e 89 mmHg.
- b) Pressão sistólica entre 140 e 159 mmHg ou pressão diastólica entre 90 e 99 mmHg.



- c) Pressão sistólica acima de 160 mmHg ou pressão diastólica acima de 100 mmHg.
- d) Pressão sistólica acima de 180 mmHg ou pressão diastólica acima de 110 mmHg.
- e) Pressão sistólica de até 120 mmHg e pressão diastólica de até 80 mmHg, na ausência de hipotensão.

Resposta

Observe que ele foi considerado normal, os valores “ótimos”, visto que a letra A (alternativa que mais causaria dúvidas), englobou a categoria “limítrofe”. Esta questão deveria ser feita por eliminação.

Alternativa: E.

1.7 OXIMETRIA DE PULSO

Consiste na monitorização não invasiva da saturação de oxigênio do sangue arterial, cujo padrão de normalidade varia de 90 a 100 de SpO₂.

Depois que o oxigênio se funde nos alvéolos para a circulação pulmonar, a maior parte deles se fixa a moléculas de hemoglobina oxigenadas nas hemácias e nos capilares sanguíneos das extremidades é possível aferir sua concentração, indiretamente.

O LED emite comprimentos de ondas de luz que são absorvidos de forma diferente por hemoglobinas oxigenadas e desoxigenadas. O cálculo da saturação de O₂ provém dessa diferença de captação da absorção.

Alguns fatores dificultam a verificação da oximetria, tais como:

1. Movimentação do paciente
2. Baixa perfusão periférica.
3. Hipoxemia local.
4. Baixa saturação de O₂ (inferior a 70%).
5. Carboxihemoglobina.
6. Meta - hemoglobina.
7. Alterações nos níveis de bilirrubina.
8. Anemia.
9. Hiperpigmentação da pele.
10. Convulsão.



11. Pulsação venosa.
12. Congestão venosa.
13. Interferência luminosa: fonte de luz de xenon, fototerapia, luzes fluorescentes, lâmpadas com raios infravermelhos ou a incidência direta dos raios solares.
14. Esmalte de unhas.
15. Vasoconstrição periférica.
16. Utilização incorreta do sensor.
17. Corantes intravasculares (indocianina verde ou azul de metileno).
18. Posicionamento de sensor em extremidade com manguito para pressão arterial ou cateter arterial.
19. Oclusão arterial próxima ao sensor.
20. Paciente em parada cardiorrespiratória ou choque.

Deve-se realizar rodízio dos locais de instalação dos sensores. A frequência de troca dos locais de instalação depende das condições clínicas dos pacientes. Em pacientes com perfusão periférica normal incluir na prescrição de enfermagem frequência máxima de troca de 4 horas. A avaliação da eficácia desta intervenção deve ser controlada. Pacientes com baixa perfusão periférica podem requerer troca a cada hora.

Ano: 2016

Banca: IBFC

Órgão: EBSEH

Sobre o saturômetro ou oxímetro de pulso, assinale a alternativa correta:

- a) O saturômetro informa, em parte, sobre a função ventilatória, ou seja, a oxigenação e circulação periférica
- b) O saturômetro informa sobre a eficácia real da ventilação (eliminação de CO₂)
- c) O saturômetro informa sobre a quantidade real de oxigênio transportado.
- d) Uma das causas de acionamento do alarme pode ser devido à vasodilatação periférica (calor)
- e) O saturômetro é um elemento dispensável da monitorização básica durante a anestesia geral.

Resposta

O saturômetro ou oxímetro de pulso traz valor referente a oxigenação e circulação periférica. E é **INDISPENSÁVEL** na monitorização durante a anestesia geral.

Geralmente, o alarme no monitor por falha na medição se dá por vasoconstrição.

Alternativa: A.

Ano: 2014



Banca: IBFC

Órgão: TRE-AM

A oximetria de pulso é a modalidade de monitorização não invasiva mais presente na prática clínica. Os oxímetros de pulso combinam os princípios da espectrofotometria e da plestiomografia para a mensuração não invasiva da saturação de oxigênio no sangue arterial, utilizando o princípio da absorção diferencial da luz vermelha e infravermelha. Considerando os cuidados de enfermagem com a oximetria de pulso, assinale a alternativa correta.

- a) A queda de saturação superior a 70% em ar ambiente não é indicação de uso de oxigenoterapia.
- b) Posicionamento correto do oxímetro de pulso tem o tórax como o local mais indicado para a mensuração da oximetria de pulso.
- c) O rodízio dos dedos deve ser realizado para a utilização do oxímetro, com a finalidade de eliminar possíveis lesões de pele.
- d) A presença de esmalte e de extremidade fria não diminuem a acurácia do oxímetro de pulso.

Resposta

- a) ERRADA. A queda abaixo de 90 já pode ser indicativa da necessidade de oxigenoterapia.
- b) ERRADA. A extremidade dos dedos é o local mais indicado.
- c) CERTA.
- d) ERRADA. A presença de esmalte pode interferir na capacidade de leitura do aparelho.

Alternativa: C.

1.8 AEROSOLTERAPIA

Adiciona umidade ou medicamentos ao ar inspirado por meio de partículas de tamanhos variados que se misturam com o ar. A aerossolização suspende o número máximo de gotas de água ou de partículas com o tamanho desejado no ar inspirado.

A umidade acrescentada através da nebulização melhora a limpeza de secreções pulmonares, já que aumenta a eliminação mucociliar, o mecanismo natural do corpo para remover o muco e detritos celulares a partir do trato respiratório.



O esperado é que o nebulizador produzidas partículas em aerossol entre 0,5 já as de diâmetro superior a 15 microns atingem somente as vias aéreas mais superiores. Além disso, o paciente deve estar posicionado a 30 graus do leito ou sentado.

Os medicamentos mais frequentemente administrados por aerossol são:

Broncodilatadores, tal como o **Berotec** que age sobre os receptores B2 adrenérgicos da musculatura brônquica e pode ter por efeitos colaterais: tremores, taquicardia e inquietação, dentre outros; e o **Atrovent**, cujo princípio ativo é o brometo de ipratrópio que possui propriedades anticolinérgicas (parassimpaticolíticas).

Antibióticos

Anti-inflamatórios

Mucolíticos: tal como o flumicil que estimula a secreção de surfactante e facilita o transporte mucociliar.

Ano: 2017

Banca: IADES

Órgão: Correios

A partir de qual ângulo, o paciente deve estar no leito para receber a administração de Aerossolterapia?

- a) 15º.
- b) 10º.
- c) 30º.
- d) 25º.
- e) 20º.

Resposta

O paciente deve estar a 30 graus do leito ou sentado.

Alternativa: C.



1.9 OXIGENIOTERAPIA

A oxigenoterapia é a administração de oxigênio em concentração maior do que a encontrada na atmosfera para fornecer o transporte adequado de oxigênio no sangue, ou seja, prevenir hipóxia tecidual. A hipoxemia reduz o aporte de oxigênio para os tecidos e pode acarretar risco de vida ao paciente.

Dentre as indicações podemos citar parada cardiorrespiratória, IAM, intoxicação por gases (CO) Indicações, traumatismos graves, angina instável, recuperação pós-anestésica, insuficiência cardíaca congestiva (ICC), apneia obstrutiva do sono, dentre outras.

SISTEMAS DE BAIXO FLUXO:

- **Cânula nasal (Tipo óculos)**



É um dispositivo simples e confortável, geralmente de silicone, que são introduzidas nas narinas e permitem fluxo preciso de oxigênio de até 6l/min. Sem umidificação poderá ser oferecido ao paciente no fluxo de até 4l/min e umidificado se for além disso, devido irritação da mucosa. Não há risco de reinalação e não impede a alimentação.

- **Máscara Facial Simples**





Abrange nariz e boca e é utilizada para curto prazo na oxigenoterapia. É contraindicada para pacientes com retenção de dióxido de carbono porque a retenção pode ser agravada. As taxas de fluxo devem ser de 5L ou mais para evitar a reciclagem do ar exalado e retenção de dióxido de carbono na máscara.

Oferece oxigênio na forma umidificada, mas não possui vedação. A velocidade do fluxo pode variar de 4 a 15l/min e a oferta de O₂ pode variar entre 35 a 50%.

- **Máscara Facial com reservatório**



Máscara acoplada a uma bolsa inflável (1 L). Capaz de administrar concentrações mais elevadas de oxigênio, cerca de 40 a 70%, com taxa de fluxo de 7 a 10l/min.

SISTEMAS DE ALTO FLUXO:

- **Máscara de Venturi**





Possui sistema de alto fluxo e permite o controle da quantidade certa de O₂ por meio de adaptadores, atingindo FiO₂ (fração inspirada de oxigênio) fixa de 24-50% da concentração de oxigênio e necessita de umidificação.

A cor do adaptador indica o fluxo de O₂ (L/min), conforme abaixo:



COR DO ADAPTADOR	FLUXO DE O ₂	FiO ₂ (%)
Azul	3	24
Amarelo	6	28
Branco	8	31
Verde	12	35
Rosa	15	49
Laranja	15	50

Ano: 2015

Banca: FCC

Órgão: TRT - 15ª Região (SP)

Com relação à oxigenoterapia não invasiva, o técnico de enfermagem, no uso de suas atribuições, deve

- evitar alterações no fluxo e pressão do oxigênio mediante a não fixação do cateter nasal.
- colocar no umidificador, preferencialmente, uma solução pirogênica.



- c) completar o reservatório, aproveitando a quantidade de água que esteja no umidificador.
- d) retornar para o reservatório a água que esteja acumulada no extensor intermediário.
- e) utilizar um regulador de pressão e fluxômetro no preparo do procedimento.

Resposta

- a) ERRADA. Evita-se tais alterações COM a fixação do cateter
- b) ERRADA. Coloca-se água destilada no umidificador.
- c) ERRADA. Não se completa, mas despreza-se e troca o conteúdo.
- d) ERRADA. Despreza-se essa água acumulada, evitando infecção
- e) CERTA.

Alternativa: E.

Ano: 2017

Banca: FEPESE

Órgão: SES/SC

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com relação à oxigenoterapia.

- () A máscara de Venturi é a forma mais confiável e precisa para a administração de oxigênio não invasivo, pois permite um fluxo constante de ar ambiente misturado com oxigênio.
- () A cânula nasal é a forma mais confiável e precisa para a administração de oxigênio não invasivo, sendo um método simples.
- () O cateter nasofaríngeo é usado para administração de altas concentrações de oxigênio.
- () As máscaras simples são utilizadas para baixas e moderadas concentrações de oxigênio.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V V F F
- b) F V F F
- c) V F V V
- d) F F F V
- e) V F F V

Resposta

(V)

(F) Veja a alternativa acima.

(F) Utilizado para baixas concentrações de oxigênio. (V)



Alternativa: E.

Ano: 2011

Banca: FCC

Órgão: TRE-RN

A oxigenoterapia pode ser aplicada por meio de diferentes dispositivos, incluindo

- a) máscara de Venturi que oferece suporte ventilatório de maneira invasiva.
- b) máscara facial com nebulização contínua por pressão positiva.
- c) cateter tipo óculos que fornece uma concentração de oxigênio superior a 21%.
- d) bolsa valva máscara com reservatório que fornece uma concentração de oxigênio inferior a 21%.
- e) máscara de CPAP com pressão negativa inspiratória.

Resposta

- a) ERRADA. A Máscara de Venturi é um dispositivo de alto fluxo, não invasivo.
- b) ERRADA. A máscara facial com nebulização não apresenta fluxo regular, nem é fornecido O₂ por pressão positiva.
- c) CERTA.
- d) ERRADA. Superior a 21%
- e) ERRADA. Pressão inspiratória positiva.

Alternativa: C.

Ano: 2016

Banca: INSTITUTO AOCP

Órgão: EBSEH

Foi indicada oxigenoterapia a um paciente adulto, internado em clínica cirúrgica que apresentava PaO₂ < 60 mmHg e SatO₂ < de 88% em ar ambiente. De acordo com o descrito no caso, a indicação ocorreu devido à situação de

- a) hipoxemia.
- b) hipercalemia.
- c) hiponatremia.
- d) ortostática.
- e) dislipidemia.

Resposta

A queda na saturação de oxigênio já indica a condição de hipóxia.



Alternativa: A.

Ano 2017

Banca: CONSULPLAN

Órgão: TRF 2ª REGIÃO

“A oxigenoterapia é a administração de oxigênio em uma concentração maior que aquela encontrada na atmosfera ambiental.” (Smeltzer; Bare, 2005.)

Sobre esta terapia, é correto afirmar que:

- a) pode ser administrado o oxigênio sem a prescrição médica.
- b) através da cânula nasal administra-se o oxigênio até 10 L/min.
- c) ao nível do mar, a concentração de O₂ no ar ambiente é de 31%.
- d) quando administrado em altas concentrações, o oxigênio causa toxicidade.

Resposta

- a) ERRADA. Oxigenioterapia, na maioria dos casos, depende de prescrição médica, mas pode ser iniciada pelo enfermeiro, caso o paciente necessite na urgência.
- b) ERRADA, A velocidade de fluxo máxima é 6l/min.
- c) ERRADA A concentração O₂ no ar ambiente é 21%.
- d) CERTA. Podem causar toxicidade para os pulmões e sistema nervoso central ou deprimirem a ventilação.

Alternativa: D.

Ano: 2014

Banca: UNIRIO

Órgão: UNIRIO

A oxigenioterapia consiste na administração de oxigênio com finalidade terapêutica. É INCORRETO afirmar que, quando utilizamos a nebulização:

- a) coloca-se soro fisiológico no copo do nebulizador.
- b) conecta-se a cânula nasal à extensão plástica, abre-se e regula-se o fluxômetro, conforme a prescrição médica.
- c) identifica-se o nebulizador com etiqueta adesiva, anotando data e horário.
- d) recolhe-se o material após o uso e registra-se nas anotações de enfermagem as reações do paciente.
- e) explica-se ao paciente o procedimento e a sua finalidade.

Resposta

No caso da nebulização utiliza-se a máscara apropriada com o recipiente abaixo para



colocar o soro fisiológico, acrescido ou não de alguma medicação prescrita.

Alternativa: B.

Ano: 2017

Banca: IBFC

Órgão: EBSERH

Correlacione corretamente os tipos de oxigenoterapia e seus meios de aplicação.

(1) Sistema de baixo fluxo.

(2) Sistema de alto fluxo.

(3) Sistema de umidificação.

(4) Sistema de nebulização.

(A) Máscara de Venturi.

(B) Umidificadores de ambiente.

(C) Nebulizador pneumático, ultra sônico, micro nebulizador.

(D) Cateter nasal e nasofaríngeo, máscara para nebulização.

A correlação correta se estabelece em:

a) 1D, 2A, 3B, 4C

b) 1C, 2B, 3A, 4D

c) 1A, 2B, 3C, 4D

d) 1A, 2D, 3B, 4C

e) 1A, 2D, 3C, 4B

Resposta

Basta saber que Máscara de Venturi (A) é alto fluxo e cateter nasal (D) é baixo fluxo, pois umidificador e nebulizador apresentam nomes correspondentes nas alternativas:

Alternativa: A.

Ano: 2016

Banca: IBFC

Órgão: EBSERH

Assinale a alternativa correta.

A participação dos profissionais da equipe de saúde é fundamental no atendimento pré-hospitalar de pacientes com suspeita de infarto do miocárdio. O oxigenoterapia foi uma estratégia historicamente utilizada nesse tipo de pacientes. De acordo com as recomendações atuais, essa conduta:

a) Deve ser realizada, quando indicada com cateter nasal de O₂ a 100%, 0,5 l/minuto

b) Não é mais indicada



- c) Deve ser realizada, quando indicada com cateter nasal de O₂ a 100%, 2-4 l/minuto
- d) Deve ser realizada, quando indicada, com cateter nasal de O₂ a 100%, 1 l/minuto
- e) Deve ser realizada, quando indicada com cateter nasal de O₂ a 100%, 1-2 l/minuto

Resposta

A oxigenoterapia é indicada, conforme o enunciado, através do uso do cateter nasal a 2 a 4l/min, não necessitando de umidificação.

Alternativa: C.

Ano: 2015

Banca: VUNESP

Órgão: Prefeitura de São José dos Campos - SP

Homem, 67 anos, portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), deu entrada no pronto socorro com quadro de agravamento. Para o diagnóstico de enfermagem “Troca de gases prejudicada relacionada à desigualdade de ventilação e perfusão”, o enfermeiro posiciona o paciente em decúbito elevado, reduzindo o esforço respiratório, monitora SpO₂ por oxímetro e inicia oxigenoterapia por cateter, se o nível observado for

- a) > 95%.
- b) > 90%.
- c) ≤ 90%.
- d) < 85%.
- e) ≤ 50%.

Resposta

90% é o valor mínimo de saturação de O₂ para paciente em ar ambiente. Abaixo disso, recomenda-se uso de oxigenoterapia.

Alternativa: C.

1.10 CATETERIZAÇÃO VESICAL

Objetiva a drenagem da urina, instilação de medicação ou controle preciso da diurese através da inserção de uma sonda no interior da bexiga.

Sonda Vesical de Demora: uso da sonda Foley com diferentes opções de tamanho.





Pode ter 2 a 3 vias. Uma para inflar o balão (5 a 30 ml de água destilada), outra para drenar a urina e outra (se houver a 3ª via) para instilar medicação.

A inserção é atividade PRIVATIVA DO ENFERMEIRO (COFEN 450/2013) e o manuseio e coleta de exames é de toda a equipe de enfermagem.

O conjunto da sonda, equipo e bolsa coletora formam um sistema fechado que não deve ser aberto sem extrema necessidade. A bolsa coletora deve permanecer abaixo do nível da bexiga.

PROCEDIMENTO

- 1. Confirme o paciente e o procedimento a ser realizado*
- 2. Reúna o material e leve até o paciente*
- 3. Explique o procedimento ao paciente*
- 4. Promova privacidade ao paciente*
- 5. Higienizar as mãos*
- 6. Coloque as luvas de procedimento*
- 7. Posicione o paciente*
- 8. Realize a higiene íntima com clorexidine degermante*
- 9. Retire, despreze as luvas e higienizar novamente aos mãos.*
- 10. Abra o kit de cateterismo sobre a cama, com técnica estéril, entre as pernas do paciente,*
- 11. Coloque a solução de clorexidina tópica nas gazes, dentro da cúpula*
- 12. Abrir o material descartável sobre o campo*
- 13. Calce as luvas estéreis*
- 14. Aspire água destilada na seringa com o auxílio de um colega para segurar a ampola*
- 15. Teste o cuff da sonda com água destilada*



16. Conecte a sonda no coletor e mantenha o clamp aberto
17. Coloque lubrificante anestésico na seringa (homem)
18. Faça a antissepsia do pênis e do meato (homem) / lábios maiores, menores e meato uretral (mulher) com a clorexidina tópica, com movimentos únicos e troca de gaze a cada movimento, utilizando pinça cirúrgica, ex. Kocher.
19. Posicione o pênis do paciente perpendicular ao corpo (homem) / mantenha os grandes e pequenos lábios abertos e o meato exposto (mulher)
20. Injete o lubrificante no meato e aguarde cerca de 3 min (homem) / lubrifique a sonda (mulher)
21. Introduza a sonda, delicadamente, no meato até a bifurcação e o retorno da urina.
22. Introduza de 5 a 10mL de água destilada (conforme demarcação na sonda) e tracione lentamente
23. Fixe a sonda na região supra púbica (homem) ou na face interna da coxa (mulher) com adesivo hipoalergênico
24. Oriente o paciente quanto a importância de manter o coletor abaixo do nível do órgão genital.
25. Retire a luva e higienize as mãos
26. Realize o devido registro no prontuário, inclusive mencionando o retorno da urina.

Ano: 2016

Banca: FCC

Órgão: TRT - 20ª REGIÃO (SE)

Em relação ao cateterismo vesical de demora, o Técnico de Enfermagem está

a) proibido de realizar a inserção do cateter vesical, pois é um procedimento privativo do enfermeiro.

b) autorizado a realizar a inserção da sonda vesical de demora, por não ser considerado invasivo.

c) autorizado a realizar a inserção do cateter vesical, somente sob supervisão do enfermeiro.

d) proibido de realizar a coleta de urina para exame, pois é um procedimento privativo do enfermeiro.

e) autorizado a realizar a inserção do cateter vesical de demora, desde de que tenha sido prescrito pelo médico, com assinatura e nº do registro profissional.

Resposta



A inserção do cateter é privativa do enfermeiro e o manuseio e procedimentos correlatos é permitido ao técnico de enfermagem.

Alternativa: A.

Ano: 2017

Banca: UEM

Órgão: UEM

Sobre o manuseio correto do cateter para prevenção de infecção do trato urinário relacionada ao uso de sonda vesical de demora, considera-se desnecessário:

- a) fixar o cateter de modo seguro e que não permita tração ou movimentação.
- b) manter o sistema de drenagem fechado e estéril.
- c) trocar todo sistema quando ocorrer desconexão, quebra da técnica asséptica ou vazamento.
- d) esvaziar a bolsa coletora regularmente, utilizando recipiente coletor individual e evitando contato do tubo de drenagem com o recipiente coletor.
- e) limpar rotineiramente o meato uretral com solução antisséptica.

Resposta

Não é necessário limpar o meato uretral com solução antisséptica, apenas a higiene habitual durante o banho.

Alternativa: E.

Ano: 2013

Banca: FCC

Órgão: TRT - 9ª REGIÃO (PR)

Ao efetuar a sondagem vesical de alívio em paciente adulto, sem alterações anatômicas, um dos procedimentos de enfermagem é

- a) realizar a antisepsia da paciente do sexo feminino no sentido meato urinário para o ânus.
- b) realizar o procedimento com o paciente do sexo masculino em decúbito lateral de sua preferência.
- c) realizar a higiene íntima com solução de hipoclorito de sódio a 5%.
- d) selecionar sonda de cateterismo vesical de número 2 a 4.
- e) posicionar o pênis do paciente em ângulo de 30 graus em relação ao corpo para efetuar a inserção da sonda.

Resposta

a) CERTA.



- b)ERRADA. Realizar em decúbito dorsal.
- c)ERRADA. Utilizar degermante tópico (aquoso)
- d) ERRADA Utilizar-se os tamanhos número 12 a 14 para mulheres e de 16 a 18 para homens.
- e)ERRADA. Posicionar o pênis do paciente perpendicular ao corpo.

Alternativa: A

Ano: 2014

Banca: CESGRANRIO

Órgão: Banco do Brasil

Em atendimento no ambulatório de reabilitação, para prevenir infecções em pessoas com cateter vesical, a enfermeira deve drenar toda a urina do tubo para a bolsa coletora.

Esse procedimento deverá ocorrer

- a) a cada 12 horas
- b) antes da realização de exercícios ou de deambulação
- c) depois da transferência para a mesa de exames
- d) com posicionamento da bolsa coletora acima da bexiga
- e) com a manutenção do pinçamento prolongado do tubo

Resposta

- a) ERRADA. Sempre que necessário, ou seja, que o tubo está com urina estagnada ou bolsa cheia.
- b) CERTA. Assim, evita o retorno da urina e extravasamento.
- c) ERRADA. Antes da transferência e não após.
- d) ERRADA. Posicionamento abaixo da bexiga.
- e) ERRADA. A drenagem deve ser mantida aberta.

Alternativa: B.

Ano: 2015

Banca: CESPE

Órgão: TJ/DFT

Julgue o item seguinte com relação a procedimentos técnicos em enfermagem.

O cateterismo vesical de longa permanência, cujo objetivo é o esvaziamento da bexiga, é um procedimento realizado por meio da introdução de um cateter estéril de nelaton simples na bexiga de pacientes que apresentam retenção urinária.



Resposta

A inserção de um cateter estéril de nelaton simples diz respeito a sondagem vesical de alívio.

Errada

Ano: 2010

Banca: FCC

Órgão: TRF - 4ª REGIÃO

Durante o cateterismo vesical de demora, feminino, é necessário

- a) colocar a paciente em posição de Sims para melhor visualização do meato urinário.
- b) realizar a assepsia com solução tópica, aquosa e, em seguida, aplicar solução degermante.
- c) utilizar sondas de calibres 6 a 8 em mulheres adultas.
- d) introduzir a sonda até a saída de urina e progredir cerca de 3 cm para insuflação do balonete.
- e) fixar a sonda na região supra púbica, permitindo a contração dos músculos retroperitoneais.

Resposta

- a) ERRADA. A posição é decúbito dorsal horizontal, com as pernas afastadas.
- b) ERRADA. Após a higiene íntima, utiliza-se solução tópica (aquosa) para a antisepsia.
- c) ERRADA. Os tamanhos mais utilizados de sonda vesical de demora para mulheres são 14 e 16
- d) CERTA
- e) ERRADA. A fixação é na face anterior da coxa para mulheres.

Alternativa: D.

Ano: 2015

Banca: CESPE

Órgão: TJ-DFT

Julgue o item seguinte com relação a procedimentos técnicos em enfermagem.

O cateterismo vesical de longa permanência, cujo objetivo é o esvaziamento da bexiga, é um procedimento realizado por meio da introdução de um cateter estéril de nelaton simples na bexiga de pacientes que apresentam retenção urinária.

RESPOSTA



O CATETERISMO VESICAL DE ALÍVIO Consiste na inserção de um cateter estéril de nelaton simples através do meato uretral até a bexiga, com o objetivo de drenar a urina ou até mesmo coleta de exames, dentre outros.

Só aproveitando a questão....

No que tange à realização do cateterismo vesical intermitente no domicílio, a capacitação do paciente (quando possível o auto cateterismo) deve ser atribuição do Enfermeiro. Quando existirem limitações para o auto cuidado, o familiar poderá ser capacitado para realizar este procedimento.

ERRADA.

Ano: 2015

Banca: INSTITUTO AOCP

Órgão: EBSEH

Em caso de solicitação de cateterismo vesical de demora, quais são os materiais corretos para o procedimento completo?

- a) Luva de procedimento (não-estéril), degermante tópico e gazes.
- b) Luva estéril, degermante tópico, gazes estéreis, água destilada, seringa estéril grande, campo estéril, cuba-rim, pinça Kocher, lubrificante estéril (Lidocaína gel), sonda de Foley e coletor de urina em sistema fechado.
- c) Luva estéril, degermante tópico, gazes estéreis, água destilada, seringa estéril pequena, campo estéril, lubrificante estéril (Lidocaína gel) e sonda uretral de alívio.
- d) Luva de procedimento, gazes estéreis, água destilada, seringa estéril, campo estéril, lubrificante estéril (Lidocaína gel), sonda de Foley e coletor de urina em sistema aberto.
- e) Luva estéril, água e sabão, água destilada, seringa estéril, campo estéril, lubrificante estéril (Lidocaína gel), sonda uretral de alívio e coletor de urina em sistema fechado.

Resposta

Baseie-se no fato de ser um procedimento estéril:

- a) ERRADA: Utiliza-se luva estéril
- b) CORRETA
- c) ERRADA. A seringa precisa ser grande para encher o cuff e a sonda não é de alívio, mas sim de demora.
- d) ERRADA: Utiliza-se luva estéril e o coletor é fechado.
- e) ERRADA. A sonda não é de alívio, mas sim de demora e faltou o antisséptico tópico.

Alternativa: B.




1.11 SONDAGEM NASOGÁSTRICA

A sonda nasogástrica tem o objetivo de alimentar o paciente que não o pode fazer por via oral, drenar conteúdo gástrico, ou ainda, prepará-lo para determinadas cirurgias ou exames.

Para a instalação da sonda nasogástrica, recomenda-se o paciente esteja, pelo menos, há 4 horas em jejum, evitando ou reduzindo a ocorrência de náuseas e vômitos.

É necessário se elevar a cabeceira para a passagem da sonda em cerca de 45 graus (posição Fowler) e medir a porção da sonda a ser introduzida da ponta do nariz, até o lóbulo da orelha e até a ase o apêndice xifóide.

A descrição do procedimento segue a mesma lógica da Sonda Nasoenteral, tema a seguir.



A checagem do posicionamento da SNG é um passo fundamental do procedimento, pois várias complicações podem ser decorrentes de falha nessa intervenção, sendo a mais grave, a aspiração pulmonar de conteúdos gastrointestinais. Para tal, pode-se aspirar 20 mL de ar e introduzir na sonda para ser auscultada na região epigástrica por meio do estetoscópio.

Outro teste, não tão cobrado em concurso consiste em mergulhar a ponta da sonda em um copo de água e verificar a presença de bolhas de ar, indicando o posicionamento errado da sonda, no caso, nas vias aéreas. Este procedimento, conforme PARECER COREN-SP CAT Nº 018 / 2009, não apresenta confiabilidade satisfatória.

Não é tão comum, mas também é possível a confirmação da localização através da realização do pH da secreção gástrica, que no estômago encontra-se entre 1 a 5, e nas secreções intestinais e pulmonares, o pH é maior do que 6.



Ano: 2011

Banca: FCC

Órgão: TRT - 24ª REGIÃO (MS)

Sobre os diversos cuidados de enfermagem, a todo paciente com sonda nasogástrica recomenda-se

- a) inflar cuidadosamente o balão gástrico situado na extremidade proximal da sonda.
- b) providenciar sedação e priorizar o posicionamento em decúbito dorso-horizontal.
- c) monitorizar e administrar antiarrítmicos por via endovenosa.
- d) manter o material de intubação endotraqueal próximo ao paciente.
- e) aspirar conteúdo gástrico para confirmação do posicionamento correto da sonda.

Resposta

- a) ERRADA. Não há balão gástrico (balonete).
- b) ERRADA. Não é necessário, inclusive porque a participação dele é importante. Além disso, o paciente deve permanecer sentado.
- c) ERRADA. Não existe essa recomendação.
- d) ERRADA. Não existe essa recomendação.
- e) CERTA.

Alternativa: E

Ano: 2016

Banca: INSTITUTO AOCP

Órgão: CASAN

Sobre o procedimento de sondagem nasogástrica, é correto afirmar que:

- a) a extensão da cabeça do paciente reduz a probabilidade da sonda penetrar na traqueia.
- b) a medida adequada do comprimento da sonda a ser introduzido é da ponta do nariz ao apêndice xifoide.
- c) a sonda deve ser lubrificada com solução hidrossolúvel antes de sua introdução na narina.
- d) deve-se introduzir a sonda sempre fechada para evitar a saída de conteúdo gástrico ou ar.
- e) a localização da Sonda deve ser testada por meio da ausculta de ruído em região epigástrica concomitantemente à introdução de 20 ml de água pela sonda.

Resposta

- a) ERRADA. a extensão da cabeça do paciente AUMENTA a probabilidade da sonda



penetrar na traqueia.

b) ERRADA. a medida adequada do comprimento da sonda a ser introduzido é da ponta do nariz, ATÉ O LÓBULO DA ORELHA E ATÉ o apêndice xifoide.

c) CORRETA.

d) ERRADA. deve-se introduzir a sonda sempre ABERTA PARA EVITAR PRESSÃO E LESIONAR A MUCOSA.

e) ERRADA. Os meios mais comuns de testagem da localização é a aspiração do conteúdo gástrico ou ausculta de ruído por introdução em bolus de ar por seringa.

Alternativa: C.

Ano: 2016

Banca: FCC

Órgão: AL-MS

No atendimento a paciente do ambulatório com história de ingesta voluntária de grande quantidade de medicamento para epilepsia, como primeira medida, o médico prescreve a realização da lavagem gástrica por meio de sonda gástrica. Para a passagem da sonda gástrica, um dos procedimentos é

a) manter o paciente em decúbito dorso horizontal para o posicionamento adequado da sonda gástrica.

b) injetar 20 mL de água filtrada, na sonda inserida, para testar a sua correta localização, avaliando a reação do paciente.

c) colocar o diafragma do estetoscópio no abdome do paciente, abaixo do processo xifoide, injetando 10 mL de ar com a seringa para ouvir o ruído e confirmar a correta localização.

d) solicitar ao paciente que estenda o pescoço, orientando-o a inspirar e deglutir para facilitar o percurso da sonda gástrica pelo esôfago até a primeira porção do duodeno.

e) medir o comprimento da sonda desde a ponta do nariz até à região supra púbica, garantindo a correta localização.

Resposta

a) ERRADA. A passagem se dá na posição Fowler alto.

b) ERRADA. Injetar de 10 a 20 mL de ar para o teste de localização da sonda.

c) CERTA.

d) ERRADA. Orientar que flexione o pescoço.

e) ERRADA. Até a supra púbica!!!! Uau! Do lóbulo da orelha à ponta do nariz e até o apêndice xifóide.

Alternativa: C.



Ano: 2016

Banca: INSTITUTO AOCP

Órgão: CASAN

Sobre o procedimento de sondagem nasogástrica, é correto afirmar que

- a) a extensão da cabeça do paciente reduz a probabilidade da sonda penetrar na traqueia.
- b) a medida adequada do comprimento da sonda a ser introduzido é da ponta do nariz ao apêndice xifoide.
- c) a sonda deve ser lubrificada com solução hidrossolúvel antes de sua introdução na narina.
- d) deve-se introduzir a sonda sempre fechada para evitar a saída de conteúdo gástrico ou ar.
- e) a localização da Sonda deve ser testada por meio da ausculta de ruído em região epigástrica concomitantemente à introdução de 20 ml de água pela sonda.

Resposta

- a) ERRADA. Deve-se solicitar a cabeça permaneça fletida.
- b) ERRADA. Faltou a medida do lóbulo da orelha ao nariz.
- c) CERTA.
- d) ERRADA. A sonda deve ser introduzida aberta.
- e) ERRADA. Esta é apenas uma das formas de se confirmar o posicionamento, no entanto, é com introdução de ar e não água.

Alternativa: C

1.12 SONDAGEM NASOENTERAL

Utiliza-se um tubo de silicone (sonda de Levine) para a alimentação quando a via normal está comprometida. É instalado por via nasal ou oral (nariz ou boca) e chega até o estômago ou intestino, depende da indicação do paciente.

A medição do tamanho é semelhante da nasogástrica, mas ao final, deve se acrescentar cerca de 10 cm para que o posicionamento fique adequado.



Devido risco de entupimento, deve ser injetado 20 ml de água filtrada ou fervida (já em temperatura ambiente) na sonda, antes e após a administração da dieta ou de medicamento, realizando a lavagem da sonda.

A fixação da sonda deve ser feita com fita adesiva hipoalergênico ou esparadrapo e vistoriada periodicamente, evitando deslocamento.

A troca do equipo de nutrição enteral deverá ocorrer a cada 24h ou conforme determinação da CCIH.

É procedimento PRIVATIVO do Enfermeiro conforme PARECER COREN-SP - CT 025/2013, no entanto, o mesmo encontra-se em revisão no momento.

PROCEDIMENTO

- *Reunir o material*
- *Higienizar as mãos, explicar o procedimento ao paciente*
- *Preservar a privacidade do paciente*
- *Posicionar-se de pé no lado direito do leito, se destro, e do lado esquerdo, se canhoto.*
- *Posicionar o cliente em posição Fowler alta ou a 45°;*
- *Proteger o tórax do cliente com a toalha;*
- *Pedir ao cliente que assoe as narinas;*
- *Selecione a narina mais pérvia*
- *Medir a extensão da sonda, que deve ser realizada colocando seu orifício distal na ponta do nariz do paciente ao lóbulo da orelha e para baixo até o apêndice xifóide. Marcar este ponto. Para o posicionamento do duodeno ou jejuno, acrescentar mais 20 a 25 cm.*
- *Calçar as luvas de procedimento;*
- *Lubrificar 10 cm iniciais da sonda com o soro fisiológico;*
- *Avisar o paciente quanto à introdução da sonda e pedir que o mesmo faça movimentos de deglutição;*
- *Observar se o paciente apresenta tosse, dificuldade respiratória, cianose, agitação. Nesse caso, retirar a sonda e reintroduzi-la posteriormente;*
- *Checar o posicionamento: injetar aproximadamente 10ml de ar na sonda e efetuar a ausculta com o estetoscópio na região epigástrica e aspirar a sonda com a seringa e avaliar o retorno de conteúdo gástrico;*
- *Fixe a sonda, adequadamente, no rosto do paciente.*
- *Oriente o paciente para andar ou coloque-o deitado sobre o lado direito do corpo durante pelo menos uma hora. Esse período permite que a sonda se mova através do piloro, pela ação da gravidade.*
- *Prenda a sonda junto ao nariz colocando um pedaço de esparadrapo sobre a fronte e outro sobre o dorso nasal do cliente fixando-a com auxílio do cordonê quando a segunda marca estiver na extremidade do nariz;*



- *Retire as luvas;*
- *Higienizar as mãos;*
- *Realize as devidas anotações*
- *Após a realização do Raio X, o mandril poderá ser retirado e guardado junto ao paciente.*

Durante a administração da dieta, manter o paciente sentado para evitar vômitos e o risco de pneumonia aspirativa, mantendo-o nesta posição até cerca de 30 minutos após término. Além disso, a velocidade de gotejamento não deve ser rápida, evitando diarreia, distensão abdominal e má absorção.

Ano: 2015

Banca: UFRJ

Órgão: UFRJ

A aspiração pulmonar é a principal complicação da nutrição por meio da sonda nasoenteral. Em caso de pacientes acamados, o principal cuidado que o profissional de enfermagem deve realizar para prevenir esta complicação é o de:

- a) medir o resíduo gástrico e devolvê-lo ao estômago, se o volume for inferior a 10 ml.
- b) confirmar o posicionamento da sonda.
- c) lavar a sonda com 30 ml de água.
- d) elevar a cabeceira da cama em pelo menos 30°.
- e) observar a característica do conteúdo gástrico aspirado.

Resposta

Para evitar que o conteúdo gástrico/enteral volte pela sonda e haja maior risco de aspiração pulmonar é necessário manter a cabeceira do paciente em, pelo menos, 30 graus.

Alternativa: D.

Ano: 2012

Banca: UNIRIO

Órgão: UNIRIO



A administração de dieta e de medicações por via de sonda nasoenteral e nasogástrica vem aumentando com o aparecimento de doenças degenerativas do envelhecimento. Sobre o procedimento de sondagem, analise as proposições a seguir:

- 1) Para a sondagem nasogástrica, utiliza-se a sonda de LEVINE (calibre médio: mulher 14 a 16Fr; homem 16 a 18Fr).
- 2) A sonda nasoenteral somente estará aberta, se estiver infundindo.
- 3) A sonda nasoenteral pode ser utilizada tanto para alimentação quanto para drenagem.
- 4) A sonda nasoenteral possui um fio guia (mandril), que deve permanecer instalado para conduzir a dieta até o intestino.
- 5) Toda vez que a sonda enteral ou gástrica for aberta, para algum procedimento, deve-se dobrá-la, para evitar a entrada de ar.

Estão CORRETAS, apenas, as proposições

- a) 2, 3 e 5.
- b) 1, 2 e 5.
- c) 3 e 4.
- d) 1 e 2.
- e) 1, 4 e 5.

Resposta

- 1) CORRETA
- 2) CORRETA
- 3) ERRADA. Apenas para alimentação
- 4) ERRADA. O mandril deve ser retirado após a confirmação da localização.

Alternativa: A.

Ano: 2010

Banca: CESPE

Órgão: MPU

A respeito da técnica de lavagem e manutenção de sonda nasoenteral, julgue os próximos itens.

Quando o acesso pós-pilórico for necessário, recomenda-se o controle de pH do líquido aspirado uma vez ao dia, sendo de 6 a 8 o valor esperado para o pH duodenal.

Resposta

A região pós-pilórica corresponde ao duodeno ou jejuno. O pH desta porção gira em torno de 6 a 8, enquanto que no estômago varia de 1 a 5.



CERTA.

1.13 ASPIRAÇÃO DE VIAS AÉREAS

A aspiração das vias aéreas se trata do uso da sucção do trato respiratório do paciente com o intuito de remover secreções, em situações em que o mesmo esteja incapaz de eliminá-las sozinho. Tem por função prevenir infecções e obstruções respiratórias e permitir a melhora da ventilação e oxigenação.

Objetiva:

- Manter vias aéreas desobstruídas removendo secreções;
- Promover ventilação eficiente;
- Permitir troca gasosa adequada.

Podem sugerir necessidade da aspiração:

- Presença de secreção visível na VA
- Presença de ruído no tubo traqueal
- Presença de roncospulmonares e/ou crepitações e redução dos sons pulmonares na ausculta pulmonar
- Desconforto respiratório
- Queda da SpO₂
- Oscilações na curva de fluxo do ventilador

Os locais de aspiração incluem nasofaríngeas, nasotraqueal (ambas juntamente com a aspiração orofaríngea) ou de via aérea artificial.

Se situação de emergência, é procedimento PRIVATIVO do enfermeiro. Já em unidades de repouso/observação, unidades de internação e atendimento domiciliar, ou ainda, em uso de traqueostomia de longa permanência poderá ser realizado pelo técnico de Enfermagem, desde que avaliado e prescrito pelo enfermeiro como parte integrante do processo de enfermagem.

PROCEDIMENTO

- Higienizar as mãos;



- *Identificar sinais e sintomas que indiquem a necessidade da realização do procedimento;*
- *Explicar o procedimento ao cliente;*
- *Reunir todo o material;*
- *Promover a privacidade do paciente;*
- *Posicionar o cliente em posição de Fowler ou semi-fowler ;*
- *Proteger o tórax do cliente com a toalha de banho;*
- *Ajustar a pressão apropriada da fonte de aspiração na régua de gases que deve ser de 80 a 120mmHg (no caso de unidade portátil, a pressão negativa deve ser de 10 a 15 mmHg);*
- *Higienizar as mãos;*
- *Colocar máscara, óculos de proteção e avental;*
- *Abrir a ampola de água destilada ou soro fisiológico 0,9%, realizando desinfecção externa das mesmas com algodão e álcool 70%;*
- *Abrir o invólucro da sonda de aspiração sem retirá-la do mesmo, mantendo os princípios de assepsia;*
- *Conectar o intermediário da sonda à extensão do aspirador;*
- *Interromper a infusão de dieta enteral caso o cliente esteja recebendo;*
- *Calçar a luva estéril, a mão dominante deverá permanecer estéril e a mão não dominante deverá ser considerada contaminada;*
- *Pegar a sonda estéril com a mão dominante sem tocar em superfícies, e com a mão não dominante (contaminada) clampear a borracha do aspirador próximo ao intermediário;*
- *Aspirar pequena quantidade de AD do frasco ampola para umedecer o cateter;*
- *Se cliente traqueostomizado, iniciar a aspiração pela cânula de traqueostomia;*
- *Com a sonda clampeada, introduzir cerca de 10 a 12,5cm ou até o paciente tossir, delicadamente com o polegar e o indicador da mão dominante;*
- *Aplicar o vácuo e fazer movimentos circulares tracionando a sonda de aspiração. Este procedimento de entrada e retirada da sonda deve durar no máximo 10s;*
- *Se forem necessárias aspirações adicionais, propiciar um tempo adequado (no mínimo 1 minuto completo) entre as aspirações para oxigenação, encorajando-o a tossir e respirar profundamente;*
- *Lavar a sonda e a extensão do aspirador com AD até limpar;*



- *Limpar a sonda externamente com gaze estéril se necessário;*
- *Repetir o procedimento quantas vezes forem necessárias e de acordo com as condições clínicas do paciente;*
- *Proceder à aspiração da naso e em seguida da orofaringe com a mesma sonda;*
- *Aplicar o vácuo e fazer movimentos circulares tracionando a sonda de aspiração. Este procedimento de entrada e retirada da sonda na faringe deve durar no máximo 10s;*
- *Respeitar um intervalo de no mínimo 20 a 30 segundos entre as aspirações, encorajando o cliente a tossir e respirar profundamente entre as aspirações;*
- *Aspirar a orofaringe com a mesma sonda;*
- *Ao término das aspirações lavar a sonda e a extensão do aspirador com AD até limpar;*
- *Desconectar a sonda da extensão do aspirador. Enrolar a sonda em torno dos dedos da mão dominante, puxar a luva para fora, pelo lado de dentro de modo que a sonda permaneça dentro da luva;*
- *Retirar a outra luva da mesma forma. Desprezá-las no recipiente apropriado;*
- *Realizar ausculta pulmonar*
- *Higienizar as mãos;*
- *Desprezar material adequadamente;*
- *Realizar os devidos registros em prontuário, inclusive quanto as características das secreções e eventuais intercorrências.*



Lembre-se que a quantidade aspirada e a viscosidade da secreção devem constar nas anotações de enfermagem. Com relação à coloração da secreção, temos:

- Branca – muco (normal)
- Amarelada – muco + inflamação crônica
- Esverdeada – muco denso + substâncias inflamatórias + infecção
- Marrom – muco + substâncias inflamatórias + fragmentos de parênquima (DPOC)
- rósea – muco + hemácias destruídas (EAP) Hemoptise – hemorragia árvore brônquica

Ano: 2017



Banca: FEPESE

Órgão: SES/SC

A aspiração de secreções pode ser oronasofaríngea, orotraqueal e por traqueostomia. Identifique abaixo as afirmativas corretas em relação ao assunto.

1. Durante a aspiração oronasofaríngea o cliente deve ser colocado deitado para facilitar a expansão pulmonar.
2. Sonda números 12 a 16 são adequadas para aspiração em adultos.
3. Na aspiração nasal a sonda deve ser retirada em movimentos firmes e rotatórios com o aspirador ligado.
4. Na aspiração, a manobra de introdução e retirada da sonda nasal não deve ultrapassar 30 segundos.
5. Na aspiração orotraqueal, o diâmetro da sonda não deve ser superior à metade do diâmetro do tubo endotraqueal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- b) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Resposta

1. ERRADA. Durante a aspiração oronasofaríngea o cliente deve ser colocado SENTADO OU COM CABECEIRA ELEVADA para facilitar a expansão pulmonar.
2. CORRETA.
3. CORRETA.
4. ERRADA. Na aspiração, a manobra de introdução e retirada da sonda nasal não deve ultrapassar 10 SEGUNDOS.
5. CORRETA.

Alternativa: D.

Ano: 2012

Banca: FCC

Órgão: AL-SP

Ao realizar a aspiração das vias respiratórias de um paciente adulto com traqueostomia, um dos procedimentos de enfermagem é

- a) orientar o paciente consciente para evitar tossir 15 minutos antes de iniciar a aspiração e por 30 minutos após finalizar a aspiração.
- b) selecionar a sonda de aspiração descartável, esterilizada e de calibre adequado ao paciente.



c) aspirar as secreções, de forma contínua, por um período de 15 a 30 segundos, de acordo com o volume de secreções.

d) fluidificar as secreções com 10 a 15 mL de água destilada antes, durante e após a aspiração.

e) aspirar as secreções no momento da introdução da sonda de aspiração evitando os movimentos circulares.

Resposta

a) ERRADA. A tosse deve ser estimulada para o desprendimento das secreções.

b) CERTA.

c) ERRADA. Não ultrapassar 10 segundos. Aspirar intermitentemente e observando as reações e saturação do paciente.

d) ERRADA. Apenas antes, preferencialmente, e talvez durante.

e) ERRADA. Aspirar no momento da retirada e realizar movimentos circulares.

Alternativa: B.

1.13 AVALIAÇÃO DA DOR

A dor por ser classificada como uma experiência sensorial e emocional desagradável, relacionada a lesão tecidual real ou potencial.

A dor aguda tem uma função importante de alerta quanto à proteção, indício de algo não está bem, auxílio diagnóstico, dentre outros. Geralmente, associa-se com alterações neurovegetativas (taquicardia, hipertensão arterial, sudorese, palidez, expressão facial de desconforto, agitação psicomotora e ansiedade)

Já a dor crônica é aquela que persiste além do curso normal de uma doença ou do tempo razoável para curar uma lesão; ou que é associada a processo patológico crônico. Geralmente não afetam os sinais vitais, mas seu incômodo constante pode causar isolamento social e apatia.

Também é possível classificar a dor em:

- Somática: localizada na pele, músculo, articulações, ossos e ligamentos. Geralmente é bem localizada e pode ser reproduzida por toque no local da dor.
- Visceral: acomete os órgãos internos e apresenta características mais vagas e mal localizadas.
- Neuropática: se dá por degeneração, compressão, infecção ou inflamação dos nervos e, geralmente, vem acompanhada de parestesias e fraqueza.




A avaliação da dor guiará a escolha da terapêutica e dará o feedback do seu sucesso. As escalas mais utilizadas são as unidimensionais e as multidimensionais. As unidimensionais são as mais cobradas em concurso.

UNIDIMENSIONAIS: inclui a numérica e a visual analógica, como a seguir:



- Sendo 0, a ausência de dor
- 1 a 3, dor leve
- 4 a 6, dor moderada
- 7 a 10, dor intensa.



Escala de faces na qual o paciente avalia uma expressão facial que seja compatível com o que está sentindo.

Ano: 2017

Banca: FCC

Órgão: TRE-PR

No pós-operatório imediato de cirurgia ortopédica de um paciente idoso, antes de iniciar os cuidados, o profissional de enfermagem utilizou a Escala Linear não Visual. Esta escala é utilizada com o objetivo de

- a) identificar o nível de stress.
- b) avaliar o estado mental.
- c) classificar a úlcera de pressão.
- d) avaliar o risco de queda.
- e) quantificar a dor.

Resposta



A escala vai de 0 a 10, sendo 0, a ausência da dor e 10, a dor pior possível. Logo, essa escala visa quantificar a dor.

Alternativa: E.

Ano: 2011

Banca: FCC

Órgão: TRT - 4ª REGIÃO (RS)

Baseado na escala de dor de visualização numérica, o nível 8 de dor é classificado como sendo de intensidade

- a)fraca
- b)forte
- c)suportável
- d)média
- e)insuportável

Resposta

Conforme a escala numérica da dor, a pontuação de 7 a 10 caracteriza a dor intensa ou forte.

Alternativa: B

Ano: 2011

Banca: FCC

Órgão: TRE-RN

A dor, considerada como 5º sinal vital, pode ser

- a)tratada com medicamentos como clopidogrel, diltiazem e imipenen na terapia profilática.
- b)potencializada por métodos invasivos, como a bomba de ACP (Analgesia Controlada pelo Paciente).
- c)avaliada periodicamente pela escala de Braden por meio de representação visual analógica.
- d)qualificada e quantificada pelos parâmetros fisiológicos fornecidos pela escala de Glasgow.
- e)relacionada a etiologias distintas como cirurgia, doença aguda, crônica, causa emocional ou psicossomática.

Resposta



- a) ERRADA. Não são analgésicos.
- b) ERRADA. Aliviadas ou controlada por esse método.
- c) ERRADA. A escala de Braden avalia feridas e não dor.
- d) ERRADA. Escala de Glasgow avalia nível de consciência.
- e) CERTA.

Alternativa: E.

1.15 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Conforme o documento “Uso Seguro de Medicamentos” do COREN, é importantíssima a observação criteriosa dos 9 certos antes de iniciar a administração de medicamentos, seja lá qual for a via.



<http://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/uso-seguro-medicamentos.pdf>



Observe que orientar o paciente tem forte ênfase, tanto neste ciclo, quanto no Código de Ética (Res. 564/17), já que a recusa do paciente só tem fundamento se ele for informado da indicação, efeitos colaterais e riscos (dentre outros) do medicamento prescrito.

No entanto, também há na literatura a descrição dos 11 certos e, por isso, não vale a pena descartar:

1. PRESCRIÇÃO MÉDICA CERTA
2. PACIENTE CERTO
3. MEDICAÇÃO CERTA



4. VALIDADE CERTA
5. DILUIÇÃO CERTA
6. DOSE CERTA
7. HORA CERTA
8. VAZÃO (FLUXO) CERTA
9. VIA CERTA
10. TÉCNICA CERTA
11. REGISTRO CERTO

Esta lista já tem enfoque na validade, diluição e vazão.

Vejamos as PRINCIPAIS vias de medicação:

ORAL

É a via em que se utiliza da deglutição ou da sua colocação diretamente no estômago, por meio de sondas para a administração dos medicamentos. Para o preparo da medicação usa-se técnica limpa, dispensando-se a técnica estéril.

Tem por vantagens ser econômica, segura, confortável e isenta de dor. A apresentação dos medicamentos por essa via pode ser comprimidos, cápsulas, pós ou líquidos.

É contraindicada em pacientes com náuseas, vômitos, com deglutição dificultada ou inconscientes/sedados.

Equivalência de medidas:

1 colher de sopa = 15 ml

1 colher de sobremesa = 10ml

1 colher de chá = 5ml

1 colher de café = 3ml

1 ml = 20 gotas

1 gota = 3 microgotas



A administração por essa via deve ocorrer com o paciente com cabeceira alta ou sentado, preferencialmente com água. Os medicamentos por esta via podem sofrer influência dos alimentos ingeridos concomitantemente ou ainda de outros fármacos.

Outra informação importantíssima:

Há medicamentos que possuem revestimento para liberação entérica, protegendo-o do ácido gástrico, que não devem ser triturados. Sua trituração destrói este revestimento e altera a absorção do medicamento.

Ano: 2017

Banca: AOCP

Órgão EBSEH

Qual das vias de administração de fármacos é considerada enteral?

- a) endovenosa
- b) oral
- c) intramuscular
- d) subcutânea
- e) intra-arterial

Resposta

Para ser considerado via enteral, é necessário utilizar-se do trato gastrointestinal para a administração, logo, a via oral, dentre essas, é a resposta.

Alternativa: B

VIA INTRADÉRMICA

Uma via de absorção lenta utilizada para a administração de pequenos volumes na camada da derme (entre a epiderme e o tecido subcutâneo), como por exemplo na administração de vacina BCG e reação de prova de hipersensibilidade (PPD).

A seringa utilizada é de 1mL, a agulha de 13x4,5 mL, o ângulo da aplicação em torno de 10 a 15 graus, o bisel voltado para cima, o volume máximo de infusão é 0,5 mL e o local mais apropriado é a face anterior do antebraço.

Ano: 2017

Banca: CONSULPLAN

Órgão: TRF 2ª REGIÃO



A via intradérmica, uma das vias de administração de medicamentos, consiste na aplicação de soluções:

- a) Na epiderme que é a camada mais superficial da pele.
- b) Na derme que está localizada entre o tecido subcutâneo e o músculo.
- c) Na epiderme que está localizada entre a derme e o tecido subcutâneo.
- d) Na derme que está localizada entre a epiderme e o tecido subcutâneo.

Resposta

A medicação intradérmica, como o nome indica, é realizada na derme, localizada entre a epiderme e o tecido cutâneo (veja a imagem).

Esta via proporciona uma lenta absorção das vacinas administradas.

Alternativa: D.

Ano: 2016

Banca: CONSULPLAN

Órgão: Prefeitura de Cascavel - PR

Acerca das injeções intradérmicas, é correto afirmar que:

- a) O que é administrado é injetado na pele.
- b) O bisel da agulha deve ser apontado para baixo.
- c) São realizadas com a agulha formando um ângulo de inserção de 45° com a pele.
- d) Os medicamentos administrados através desta via têm absorção mais rápida que a via subcutânea.
- e) É sempre necessário realizar a aspiração para se certificar que não há risco de injeção diretamente na corrente sanguínea.

Resposta

- a) CERTA
- b) ERRADA. O bisel deve estar para cima.
- c) ERRADA. Ângulo de 10 a 15 graus.
- d) ERRADA. Absorção mais lenta que a SC.
- e) ERRADA. Não se deve aspirar.

Alternativa: A.

Ano: 2014

Banca: IADES

Órgão: EBSERH



O técnico em enfermagem, ao aplicar um líquido na face interna do braço de um paciente com uma seringa de 1 mL, com um ângulo de aplicação de 15° em relação à pele, introduziu com o bisel para cima e injetou o líquido, formando uma pequena pápula no local da aplicação. Nesse caso hipotético, a via de aplicação provavelmente utilizada foi a

- a)oral.
- b)subcutânea.
- c)endovenosa.
- d)intradérmica.
- e)intramuscular.

Resposta

Tais características correspondem à aplicação intradérmica.

Alternativa: D.

SUBCUTÂNEO

Via que introduz a medicação diretamente no tecido subcutâneo ou hipodérmico (entre a pele e o músculo) por meio de punção.

É utilizada para aplicação de medicamentos que necessitam de absorção lenta e contínua.

Tolera tanto substâncias aquosas como oleosas, cristalinas ou coloidais, no entanto, é extremamente necessário a realização de rodízio da aplicação das injeções para evitar distrofias e alterações na taxa e velocidade de absorção.

No entanto, são incompatíveis com a via subcutânea:




DIAZEPAM, DICLOFENACO, ELETRÓLITOS NÃO DILUÍDOS E FENITOÍNA.

Para se atingir a cada correta, o ângulo da aplicação pode variar de 45 a 90 graus, considerando o tamanho da agulha e o volume de tecido subcutâneo do paciente.



Os locais de aplicação incluem: face superior externa do braço, região anterior da coxa, face externa da coxa, região abdominal (entre os rebordos costais e as cristas ilíacas), região superior do dorso.



http://2.bp.blogspot.com/_r8zLYBTSINo/S0lcSlrUu7I/AAAAAAAY/FQkRqqPOV5M/s320/aplicacao_boneco.jpg

Procedimento:

1. Higienizar as mãos;
2. Reunir o material necessário;
3. Aspirar o medicamento segundo as técnicas assépticas;
4. Explicar ao cliente o procedimento
5. Posicionar o cliente sentado ou deitado de maneira confortável
6. Escolher e expor o local para administração do medicamento conforme as características do paciente e o rodízio realizado
7. Calçar luvas de procedimento
8. Fazer a antissepsia da região utilizando algodão com álcool a 70%
9. Pinçar a pele do paciente
10. Introduzir a agulha em ângulo conforme a quantidade de tecido adiposo do paciente (magros – ângulo de 30°, indivíduos com pesos normais – ângulo de 45°, indivíduos obesos – ângulo de 90° ou se a agulha for 10mm x 5mm ou menor - ângulo de 90°, independente da espessura da tela subcutânea)
11. Soltar a prega e puxar o êmbolo (aspirar), caso não haja retorno de sangue injetar lentamente a medicação.
12. Injetar o medicamento lentamente.
13. Retirar a agulha em movimento rápido e único;



14. *Comprimir o local com algodão para facilitar a hemostasia*
15. *Desprezar o conjunto de seringa e agulha (sem encapá-la) na caixa de descarte de material perfurocortante;*
16. *Retirar as luvas de procedimento.*
17. *Higienizar as mãos.*
18. *Registrar adequadamente o procedimento no prontuário do paciente.*

Ano: 2017

Banca: FCC

Órgão: TRE/PR

O rodízio nos pontos de aplicação é fator decisivo para o tratamento seguro e eficaz com insulina subcutânea, prevenindo as lipodistrofias e o descontrole glicêmico. Considerando as recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes com relação ao esquema de rodízio do local da aplicação da insulina, o profissional de enfermagem deve orientar o paciente e seus familiares, dentre outras, que

I. é necessário dividir cada região recomendada para aplicação em pequenos quadrantes. As aplicações, nesses quadrantes, devem ser espaçadas em pelo menos 1 cm entre eles, e seguir em sentido horário a cada aplicação.

II. para mais de duas aplicações ao dia, uma única região poderá ser usada, sem haver a necessidade de alternar os quadrantes de aplicação no mesmo dia.

III. para múltiplas aplicações, recomenda-se fixar uma região para cada horário, alternar entre os quadrantes da mesma região, usar os lados direito e esquerdo dos locais indicados para aplicação.

IV. é recomendado evitar o mesmo ponto de aplicação durante 14 dias.

Está correto o que se afirma APENAS em:

a) I, II e IV.

b) I, III e IV.

c) II e III.

d) I e III.

e) IV.

Resposta

Esta questão é um verdadeiro resumo sobre o assunto.

I) CORRETA

II) ERRADA. A cada aplicação, deve existir o rodízio do sítio.

III) CORRETA



IV) CORRETA

Alternativa: B.

Ano: 2018

Banca: COPERVE

Órgão: UFSC

Embora a insulina esteja em uso há mais de 90 anos, nas últimas três décadas ocorreram os maiores avanços na sua produção e na forma como ela é utilizada na prática clínica. As diversas preparações de insulina diferem entre si com relação a quatro características: concentração, grau de purificação, origem de espécie e tempo de ação. Quanto às diretrizes relacionadas à aplicação da insulina, é correto afirmar que:

- a) é indicado o uso de agulhas mais curtas, inserindo-se a agulha em um ângulo de 45° para todas as pessoas.
- b) a unidade de medida da insulina é dada em Unidade Internacional (UI). Com isso, pode-se dizer que em cada 1 ml de solução preparada há 1 UI de insulina.
- c) o rodízio nos pontos de aplicação é fator decisivo para o tratamento seguro e eficaz com insulina, além de prevenir a lipodistrofia e a consequente hiperglicemia.
- d) o local indicado para a aplicação de insulina são os braços, na face anterior, três a quatro dedos abaixo da axila e acima do cotovelo.
- e) a via utilizada para a aplicação diária de insulina é a intramuscular.

Resposta

- a) ERRADA. No caso do uso de agulhas mais curtas, o ângulo de inserção será sempre de 90 graus.
- b) ERRADA. A relação ML / UI não é de 1 para 1, como por exemplo, nas seringas de 1mL com 100 UI.
- c) CERTA.
- d) ERRADA. Os locais adequados para a aplicação da insulina são: abdômen, região posterior superior dos braços, nádegas e lateral externa das coxas.

Alternativa: C



Ano: 2017

Banca: FCC

Órgão: TRE/PR

Durante a assistência de enfermagem a um paciente adulto recebendo terapia anticoagulante preventiva com heparina de baixo peso molecular por via subcutânea, alguns cuidados devem ser observados. Dentre eles,

- a) manter o mesmo local da aplicação até aparecer os primeiros sinais flogísticos ou hematomas.
- b) alternar o local da injeção a cada três aplicações.
- c) introduzir a agulha em ângulo de 30°C em metade do seu comprimento.
- d) injetar o conteúdo rapidamente e massagear, em seguida, o local de aplicação.
- e) considerar que o local ideal para a administração do medicamento é o tecido celular subcutâneo do abdômen.

Resposta

- a) ERRADA. É necessário rodízio dos sítios subcutâneos de aplicação, prevenindo as lipodistrofias e o descontrole glicêmico.
- b) ERRADA. A cada aplicação deve-se escolher um novo local de aplicação.
- c) ERRADA. O ângulo de aplicação da terapia subcutânea em 30º é para indivíduos muito magros. Geralmente varia de 45 graus (pessoa com pouca gordura) a 90 graus (pessoa com maior taxa de gordura). Desta forma evita-se que a agulha atinja outra camada da pele.
- d) ERRADA. O conteúdo deve ser injetado lentamente e o local não deve ser massageado após.
- e) CERTA

Alternativa: E.

Ano: 2016

Banca: FCC

Órgão: TRT - 20ª REGIÃO (SE)

Entre os medicamentos incompatíveis com a administração por via subcutânea está

- a) Heparina.
- b) Diazepam.
- c) Clexane.
- d) Insulina.
- e) Adrenalina.

Resposta

Essa tem que decorar:



DIAZEPAM, DICLOFENACO, ELETRÓLITOS NÃO DILUÍDOS E FENITOÍNA.
Alternativa: B.

HIPODERMÓCLISE

Trata-se de uma alternativa que permite a infusão LENTA no tecido subcutâneo de grandes volumes, através da punção de 30 a 45 graus, quando outras vias estiverem comprometidas, como impossibilidade de administração por via oral, nem endovenosa.

Medicamentos com pH neutro e hidrossolúveis são compatíveis, tais como Sulfato de morfina, Brometazida, Ondansetrona, Metadona, Midazolam, Prometazina, Metoclopramida, Fenobarbital, Escopolamina, Dexametasona, Clorpromazina, Clonidina, Ranitidina, Garamicina e Tramadol.

Regiões recomendadas: deltoideana, abdominal, anterior do tórax.

Dentre as vantagens desta terapia estão o baixo custo do procedimento, o baixo índice de infecção e ser alternativa para hidratação. Já as desvantagens incluem a contra indicação por pacientes com coagulopatias e a possibilidade de reações locais tais como dor, endurecimento, eritema e necrose.

Conforme o Instituto Nacional do Câncer, são indicações para a terapia pela hipodermóclise:

- Impossibilidade de ingestão por via oral
- Pacientes em cuidados paliativos que apresentem embotamento cognitivo, náuseas e vômitos incoercíveis, obstrução do trato gastrointestinal por neoplasia.
- Impossibilidade de acesso venoso
- Possibilidade de permanência do paciente em domicílio.

Conforme o Parecer COREN/SP 31/2014: Todos os integrantes da equipe de enfermagem poderão realizar a punção e a administração da hipodermóclise, desde que capacitados para tal.

Ano: 2012
Banca: FCC



Órgão: TRF – 2ª REGIÃO

Dentre as vantagens e desvantagens da hipodermóclise, em relação à via intravenosa, destacam-se, respectivamente, a

a) Vantagem – administração segura de diclofenaco e diazepam.

Desvantagem – impossibilidade de infusão rápida de grandes volumes.

b) Vantagem – impossibilidade de formação, no sítio da infusão, de hematoma e edema.

Desvantagem – risco de necrose tecidual como complicação tardia.

c) Vantagem – possibilidade de infusão de solução oleosa ou suspensão.

Desvantagem – impossibilidade de administração de fenitoína.

d) Vantagem – infusão segura em pacientes com coagulopatia.

Desvantagem – dificuldade de ajuste rápido de doses.

e) Vantagem – facilidade na educação do autocuidado e do cuidador em domicílio.

Desvantagem – impossibilidade de infusão de nutrição parenteral.

Resposta

Os medicamentos que são incompatíveis com a via SC, obviamente, são incompatíveis com a hipodermóclise. Além disso, os riscos incluem hematoma, edema e necrose, dentre outros e pacientes com coagulopatias não apresentam indicação desta terapia.

Alternativa: E.

Ano: 2012

Banca: FCC

Órgão: TRT/PE

A hipodermóclise é intervenção utilizada em pacientes no ambiente hospitalar. No atendimento domiciliar, dentre as indicações destaca-se

a) embotamento cognitivo.

b) distúrbio de coagulação.

c) síndrome da veia cava superior.

d) anasarca.

e) congestão pulmonar.

Resposta

Dentre as indicações destacadas no início do assunto, temos o embotamento cognitivo como indicação, acrescido da dificuldade de acesso venoso, impossibilidade de administração via oral, possibilidade de permanência no domicílio, dentre outros.

Alternativa: A.



Ano: 2013

Banca: VUNESP

Órgão: IMESC

Na administração de injeções por via intramuscular em pacientes adultos idosos, com pouca massa muscular, para minimizar a dor, a irritação local da pele e impedir a saída do medicamento, de acordo com o Conselho Regional de Enfermagem (COREN-SP), a técnica atualmente recomendada é chamada de:

- a) Hochstetter
- b) modelo geométrico
- c) método em Z (Z-track).
- d) hipodermóclise.
- e) ventroglútea

Resposta

A hipodermóclise é uma alternativa para infusão de volumes maiores quem não está com rede venosa adequada ou, ainda, a pessoas com pouca massa muscular, principalmente idosos.

Alternativa: D.

SUBLINGUAL

Os medicamentos são rapidamente absorvidos pelos capilares da mucosa local. Não há passagem pela mucosa gástrica e enteral.

O paciente deve ser orientado a não mastigar o medicamento, mas apenas deixá-lo dissolver sob a língua.

Ano: 2014

Banca: FCC

Órgão: METRÔ-SP

As vias de administração de medicamentos que proporcionam início quase imediato da ação dos mesmos, dentre outras, são as vias

- a) subcutânea, intravenosa e oral.
- b) oral, intravenosa e intramuscular.
- c) sublingual, intravenosa e inalatória.
- d) sublingual, intramuscular e oral.



e)oral, intravenosa e inalatória.

Resposta

Atente que a via oral apresenta absorção muito mais lenta do que as vias parenterais e vias que envolvem absorção por mucosa. Só por essa informação, temos a resposta: sublingual, intravenosa e inalatória.

Alternativa: D.

Ano: 2015

Banca: NUBES

Órgão: Hospital São Lucas

Nitratos são medicamentos que promovem vasodilatação arterial e principalmente venosa, diminuem a pré e pós-carga ventricular, trabalho cardíaco e o consumo de oxigênio. Não devem ser utilizados de rotina visto que não diminuem mortalidade e sim morbidade. São utilizados para alívio de dor isquêmica, congestão pulmonar e diminuição pressórica. Logo após o primeiro ECG, nos casos em que houver dor torácica isquêmica, deve ser administrado nitrato (dinitrato de isossorbida 5 mg ou mononitrato de isossorbida 5 mg) por via:

- a)Endovenosa
- b)Oral
- c)Subcutânea
- d)Sublingual

Resposta

A isossorbida deve ser administrada por via sublingual e terá uma rápida absorção pelos capilares da mucosa.

Alternativa: D.

RETAL

É a via na qual a introdução de medicamentos é realizada através do ânus, sob a forma de supositório, pomada ou creme e/ou clister medicamentoso.

Ocorre absorção do medicamento pela mucosa intestinal tanto com efeitos locais (aumento da peristalse) quanto sistêmicos (alívio de dores, vômitos, irritação local, febre, dentre outros).



Ano: 2016

Banca: IBFC

Órgão: SES-PR

Não é considerada como via parenteral de administração de medicamentos a via:

a) Retal

b) Subcutânea

c) Intravenosa

d) Intramuscular

Resposta

Via parenteral não utiliza o trato gastrointestinal para a absorção do fármaco. Logo, a via retal, destoa desta definição.

Alternativa: A.

Ano: 2011

Banca: CESPE

Órgão: EBC

Julgue o item subsecutivo, acerca de técnicas fundamentais de enfermagem.

Na administração de medicamento por via retal, o paciente deve ficar em posição de Fowler.

Resposta

A posição adequada é a de Sims, já que a de Fowler não permitirá a visualização das nádegas para a administração pela via retal.

ERRADA.

INTRAVENOSA

É a via cujo medicamento é aplicado diretamente na corrente sanguínea, podendo ser infundido grandes volumes, através de acesso venoso estabelecido.

Costuma ser cobrado a questão da troca dos insumos que envolve a terapia endovenosa, tais como:

Equipos





- Infusão contínua (superior a 2h): proceder a troca a cada 72-96 horas.
- Infusões intermitentes (inferior a duas horas): proceder a troca a cada 24 horas.
- Nutrição parenteral: proceder a troca a cada 24 horas.
- Emulsões lipídicas: proceder a troca a cada 24 horas.
- Conectores: Proceder a troca a cada 72-96 horas.
- Dânuas (torneirinhas) e tubos extensores para infusão: Proceder a troca conjuntamente com o sistema de infusão.
- Cateteres periféricos: cateter periférico de teflon, a troca deve ser a cada 72 h
- Cateter Periférico de poliuretano: troca deve ser a cada 96h
- Agulhas de aço: Seu uso deve restringir-se para coleta de amostra sanguínea e ou administração de medicamentos em dose única.

Deve-se administrar separadamente cada medicamento, mesmo que prescritos para o mesmo horário, possibilitando maior segurança quanto à incompatibilidade e interação entre eles.

Procedimento

1. *Lavar as mãos;*
2. *Reunir o material necessário*
3. *Fazer desinfecção da ampola/frasco ampola com álcool 70%.*
4. *Aspirar o medicamento e diluir, se necessário.*
5. *Retirar o ar da seringa*
6. *Explicar o procedimento ao cliente*
7. *Calçar luvas de procedimento*
8. *Escolha o dispositivo venoso de acordo com o perfil da terapia e características venosas do paciente.*
9. *Garroteie o membro do paciente cerca de 1 palmo acima do local da punção.*
10. *Realize a antisepsia do local a ser puncionado com álcool a 70%*
11. *Realizar a punção venosa, conforme técnica correta e observar o retorno venoso*
12. *Verificar a permeabilidade do acesso venoso*
13. *Fixe o acesso adequadamente.*



14. Injetar lentamente o medicamento ou acoplar o equipo com posterior abertura da válvula e controle do gotejamento
15. Despreze o material adequadamente
16. Higienize as mãos
17. Registrar adequadamente em prontuário.

Ano: 2015

Banca: INSTITUTO AOCP

Órgão: EBSERH

Para a punção de acesso venoso periférico em adultos com finalidade de soroterapia intravenosa, é correto afirmar que:

- a) o cateter deve ser introduzido com o bisel voltado para baixo em um ângulo de aproximadamente 30°.
- b) o cateter deve ser introduzido com o bisel voltado para baixo, independente do ângulo de inserção.
- c) o cateter deve ser introduzido com o bisel voltado para cima em um ângulo exato de 90°.
- d) o cateter deve ser introduzido em um ângulo de aproximadamente 90°, independente da posição do bisel.
- e) o cateter deve ser introduzido com o bisel voltado para cima em um ângulo de aproximadamente 30°.

Resposta

O bisel do cateter deve estar voltado PARA CIMA e o ângulo de punção pode variar de 10 a 45 graus, visto a profundidade da veia.

Alternativa: E.

Ano: 2017

Banca: IADES

Órgão: CORREIOS

Qual é o tipo de insulina que pode ser administrado por via endovenosa?

- a) Glargina.
- b) Regular.
- c) NPH.
- d) Detemir.
- e) Gabapentina.



Resposta

A insulina regular tem rápido início de ação (30 min) e curta duração (2 horas) sendo amplamente utilizada em emergências/urgências hiperglicêmicas. É a única insulina que pode ser administrada EV.

Alternativa: B.

Ano: 2012

Banca: FCC

Órgão: TRT - 11ª Região (AM e RR)

A administração da fenitoína por via endovenosa no adulto requer alguns cuidados, sendo um deles

- a) administrar o medicamento diluído em 200 mL de soro fisiológico, na forma de bolus
- b) evitar administrá-lo com soro glicosado, para evitar a precipitação da droga.
- c) envolver frasco e equipo do soro com invólucro escuro para prevenir a inativação da droga.
- d) testar, diariamente, acuidade auditiva e visual devido à alta toxicidade otológica e oftalmológica da droga.
- e) administrar, concomitantemente, ácido fólico para prevenir síndrome convulsiva.

Resposta

- a) ERRADA. Administração de medicamentos em bolus é até 20 mL.
- b) CERTA.
- c) ERRADA. Não é fotossensível
- d) ERRADA. Não apresenta toxicidade otológica nem visual.
- e) ERRADA. Não há essa indicação.

Alternativa: B.

INTRAMUSCULAR

Administração parenteral diretamente no músculo com absorção rápida, devido à vascularização muscular.

Dentre os riscos possíveis incluem abscesso, eritema, embolia, celulite, necrose tecidual, contratura muscular, fibrose e perda de amplitude de movimento articular, entre outras.

Dentre os vários aspectos a serem observados na realização de injeção IM, um que se destaca é o volume a ser administrado. Veja a seguir:



Idade/Músculo	Deltoide	Ventro glúteo	Dorsoglúteo	Vasto lateral
Prematuros	-	-	-	0,5 ml
Neonatos	-	-	-	0,5 ml
Lactentes	-	-	-	1,0 ml
Crianças de 3 a 6 anos	-	1,5 ml	1,0 ml	1,5 ml
Crianças de 6 a 14 anos	0,5 ml	1,5 – 2,0 ml	1,5 – 2,0 ml	1,5 ml
Adolescentes	1,0 ml	2,0 – 2,5 ml	2,0 – 2,5 ml	1,5 – 2,0 ml
Adultos	1,0 ml	4,0 ml	4,0 ml	4,0 ml

http://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/parecer_coren_sp_2012_39.pdf

Outras literaturas (Ex. Potter) indicam, para as regiões de Ventro glúteo e dorso glúteo, volume máximo de até 5 mL, portanto, não despreza a alternativa, de imediato, quando houver divergência do documento do COREN.

Em suma, vários aspectos devem ser observados para a determinação de local e volume máximo a ser injetado pela via IM, tais como a faixa etária e as condições clínicas do paciente/cliente; as características anatômicas e funcionais do local da punção; a rotatividade dos locais de aplicação; a preferência do paciente/cliente; e as peculiaridades físico-químicas da substância a ser administrada.

Vejamos as regiões:

VENTROGLÚTEA (Hochester)

Envolve os músculos glúteos médio e mínimo e está distante de nervos e vasos sanguíneos importantes. Além disso há menor camada de tecido adiposo sobre o músculo, em comparação com o glúteo máximo.



A técnica consiste em colocar a mão dominante no quadril direito do paciente, espalmando a mão sobre a base do trocânter maior do fêmur. Localiza-se com a falange distal do dedo indicador, a espinha ilíaca anterossuperior direita; estende-se o dedo médio ao longo da crista-ilíaca e forma-se, com o indicador, um triângulo. Faz-se a punção no centro deste triângulo.






Potter PA, Perry AG. Fundamentos de Enfermagem. Conceitos, processo e prática. Trad. Cruz ICF, Lisboa MTL, Machado WCA. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

DORSOGLÚTEAL

Envolve o músculo glúteo máximo e está próximo da artéria glútea e do nervo ciático. É recoberto por grande camada de tecido adiposo.

Deve-se dividir o glúteo em 4 quadrantes e administrar na porção externa do quadrante externo, conforme abaixo:




https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4168031/mod_resource/content/1/aula%20ADM_AdmMedVialM_2017.pdf

VASTO LATERAL DA COXA

Localiza-se na região anterolateral da coxa e apresenta localização relativamente próxima da artéria e nervo femorais.

O paciente deverá estar, preferencialmente, sentado ou deitado (com os joelhos ligeiramente fletidos). A aplicação ocorre terço médio lateral em angulação de 90°.





<https://estudandoenfermagemblog.wordpress.com/2016/07/21/vias-de-administracao-de-medicamentos/>

DELTOIDE

Músculo pequeno utilizado, basicamente, para vacina. Há risco de lesão dos nervos braquial, radial, axilar e ulnar, bem como lesão vascular da artéria e veia braquiais.


A aplicação deverá ocorrer cerca de 2 a 2,5 cm abaixo do acrômio e com angulação de 90 graus, em adultos.




<https://estudandoenfermagemblog.wordpress.com/2016/07/21/vias-de-administracao-de-medicamentos/>

A **TÉCNICA EM Z** é uma particularidade dentro da administração dos medicamentos por via intramuscular, **cujas vantagens incluem minimizar a irritação local da pele, uma vez que esta técnica bloqueia o medicamento dentro do tecido muscular**. Recomenda-se a escolha de um músculo grande e profundo. Depois de fazer a antissepsia da região, puxa-se lateralmente a pele e os tecidos subcutâneos aproximadamente 2,5 cm a 3,5 cm e introduz a agulha profundamente no músculo. Aspira-se para confirmar que não há retorno venoso e injeta-se o medicamento lentamente. A agulha permanece por 10 segundos para permitir que o medicamento seja disperso de maneira homogênea. Após a retirada da agulha, a pele é solta, o que cria um caminho em ziguezague, promovendo um tampão que ocluirá o ponto de introdução da mesma no músculo, de modo que a solução não refluirá no tecido subcutâneo, o que poderia provocar irritação.





Relembrando: Comparativo dos ângulos para administração por via intramuscular, subcutânea e intradérmica



Ano: 2010

Banca: FCC

Órgão: TRF - 4ª REGIÃO

Na administração de medicamentos por via intramuscular, é recomendável



- a) utilizar a região de Hochester, quando o volume a ser administrado for maior que 8 mL.
- b) optar por locais que não tenham recebido injeções recentes, com ausência de lesões e de ferimentos.
- c) administrar volumes maiores que 5 mL em duas aplicações, na região do deltoide direito.
- d) injetar na região glútea, quando o volume a ser administrado for maior que 7 mL, ao associar dois medicamentos.
- e) posicionar a agulha em ângulo de 45° em aplicações no músculo reto-femoral.

Resposta

- a) ERRADA. Tal região suporta até 4 a 5mL. Além disso, a dose deverá ser fracionada.
- b) CERTA.
- c) ERRADA. Conforme documento do COREN, deltoide até 1 mL.
- d) ERRADA. Ver comentário da "A".
- e) ERRADA. O ângulo é de 90 graus.

Alternativa: B.

Ano: 2017

Banca: CONSULPLAN

Órgão: TRF 2ª REGIÃO

A via intramuscular é muito utilizada para a administração de medicamentos por ter rápida velocidade de absorção da solução administrada, perdendo apenas para a via endovenosa. Sobre a região ventroglútea utilizada para a administração de medicamentos pela via intramuscular, assinale a afirmativa INCORRETA:

- a) O músculo ventroglúteo corresponde ao glúteo médio.
- b) O nervo mais importante nesta região corresponde ao nervo femoral.
- c) É um músculo recomendado para a injeção de volumes maiores que 2 ml.
- d) O músculo ventroglúteo situa-se em local profundo e afastado de nervos importantes.

Resposta

- a) CORRETA.
- b) ERRADA. A região ventroglútea é livre de vasos ou nervos importantes e seu tecido subcutâneo apresenta menor espessura, se comparado a outros músculos utilizados para IM.
- c) CORRETA. Veja os volumes máximos a serem administrados em adulto por via intramuscular.



d) CORRETA. Por isso é considerada cientificamente como a mais segura para aplicação intramuscular.

Alternativa: B.

Ano: 2018

Banca: COPERVE

Órgão: UFSC

Antes de administrar o medicamento, o profissional de Enfermagem deve observar algumas regras básicas, como o medicamento certo, a dose certa, a via certa, a hora certa, o paciente certo, a forma certa, a orientação certa, o monitoramento certo e o registro certo. A esse respeito, associe os locais listados na coluna 1 aos locais relacionados à aplicação de medicamento por via intramuscular da coluna 2 e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

Coluna 1

1. Quadrante superior lateral do glúteo
2. Anterolateral da coxa, terço médio
3. Hochstetter
4. Aproximadamente 4 cm abaixo do acrômio

Coluna 2

- () Deltoide
 - () Dorsoglúteo
 - () Ventroglúteo
 - () Vasto lateral
- a) 4 – 1 – 2 – 3
 - b) 1 – 4 – 3 – 2
 - c) 3 – 2 – 1 – 4
 - d) 4 – 1 – 3 – 2
 - e) 3 – 1 – 4 – 2

Resposta

Vamos localizar cada local:

Deltoide: Aproximadamente 4 cm abaixo do acrômio

Dorsoglúteo: Quadrante superior lateral do glúteo

Ventroglúteo: Hochstetter: corresponde ao glúteo médio

Vasto lateral: Anterolateral da coxa, terço médio

Alternativa: D.



Ano: 2017

Banca: FEPESE

Órgão: SES

Com relação à via de administração de medicamentos, relacione as colunas abaixo:

Coluna 1: Via

1. Subcutânea
2. Endovenosa
3. Intradérmica
4. Intramuscular

Coluna 2: Característica

- () absorção mais rápida do que as outras vias.
- () indicada para medicamento que necessita de absorção lenta e contínua.
- () método de aplicação em “Z” para administração de medicamentos.
- () hipodermóclise.
- () raramente é usada para tratamento.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

- a) 1 2 3 4 1
- b) 2 1 2 1 3
- c) 2 1 4 1 3
- d) 2 1 4 3 3
- e) 2 2 1 4 3

Resposta

(ENDOVENOSA) absorção mais rápida do que as outras vias. (SUBCUTÂNEA) indicada para medicamento que necessita de absorção lenta e contínua.

(INTRAMUSCULAR) método de aplicação em “Z” para administração de medicamentos.

(SUBCUTÂNEA) hipodermóclise.

(INTRADÉRMICA) raramente é usada para tratamento.

Alternativa: C

1.16 CURATIVO



Curativo é um meio terapêutico que inclui a limpeza e aplicação de material sobre uma ferida, visando a cicatrização.



Para contextualizar, a cicatrização de feridas passa pelas seguintes etapas:

1. **FASE INFLAMATÓRIA:** dura em torno de 3 dias, ocorre a hemostasia (cascata de coagulação), vasoconstrição inicial com posterior vasodilatação para liberação de mediadores.
2. **PROLIFERATIVA:** ocorre por volta do 2º ou 3º dia e dura de 3 a 24 dias aproximadamente. Fase de contração da ferida, angiogênese, formação do tecido de
3. **FASE DE MATURAÇÃO:** dura de 20 dias a até 1 ano. Diminui a vascularização, o tecido de granulação clareia e granulação e migração de célula endoteliais da periferia para o centro.

Com relação ao modo de cicatrização, temos:

1ª intenção: bordas aproximadas, pouco ou nenhum exsudato, e pouca perda de tecido.

2ª intenção: há perda significativa de tecido, cujas bordas não conseguem se aproximar, portanto, permanece aberta. É possível visualizar claramente as fases de cicatrização.

3ª intenção: é a primeira intenção que foi adiado por infecção ou rompimento dos pontos.

A realização de curativo visa promover um ambiente adequado para a cicatrização. Basicamente pode-se proceder a uma TÉCNICA LIMPA (utilização de luvas de procedimento) OU ASSÉPTICA (utilização de pinças cirúrgicas).

O meio úmido do leito de uma ferida, em relação ao seco, apresenta as seguintes vantagens:

- Estimula a epitelização, formação do tecido de granulação e maior vascularização na área da ferida
- Facilita a remoção do tecido necrótico e impede a formação do espessamento do esfacelo
- Serve como barreira contra microrganismos
- Promove a diminuição da dor
- Mantém a temperatura no leito da vacina
- Evita traumas na troca de curativos

Logo, o curativo ideal contém as seguintes características:

- Mantém o meio úmido para a cicatrização
- Permitir troca gasosas
- Fornecer isolamento térmico



- Ser impermeável
- Estar isento de partículas contaminantes
- Não ser aderente
- Absorver parte da exsudação
- Permitir o monitoramento da ferida
- Permitir o aumento do tempo de troca

Os tecidos de uma ferida podem ter elementos VIÁVEIS (tecido de granulação) ou INVIÁVEIS (necrose, esfacelo). Em ambos os casos é possível a presença de exsudato, podendo este estar seroso, serosanguinolento ou, ainda, purulento.

Em geral, procede-se a limpeza antes da realização do próprio curativo. Para tal o mais utilizado é o soro fisiológico em temperatura ambiente ou morno, preferencialmente em jato (irrigação) de dentro para fora.

De acordo com a localização e as características da ferida, será realizada uma avaliação da melhor cobertura a se utilizar. Veja esta tabela resumo a respeito das coberturas:

TIPO DE CURATIVO	COMPOSIÇÃO	AÇÃO	INDICAÇÕES	CONTRA INDICAÇÕES
GAZE NÃO ADERENTE	Tela de acetato de celulose com vaselina	Não aderência e permite o livre fluxo de exsudato	Queimaduras, áreas doadoras e receptoras de enxertos, lacerações	Feridas infectadas ou com grande volume de exsudato.
FILME TRANSPARENTE	Polímero de poliuretano com adesivo de acrílico em uma das faces	Cobertura permeável a gases e impermeável a água e microrganismos. Mantém o meio úmido e alivia a dor	Feridas de primeira intenção, sem exsudato ou áreas doadoras de enxerto	Feridas com exsudação
PAPAÍNA	Enzima proteolítica do látex da Carica papaya	Desbridamento enzimático	Tecido desvitalizado, necrose úmida ou seca	Hipersensibilidade, dor, feridas limpas e secas
COLAGENASE	Enzima proteolítica Clostridiopeptidase	Degrada o colágeno da ferida	Tecido desvitalizado, necrose úmida ou seca,	Feridas limpas e secas



HIDROCOLOIDE	Poliuretano semipermeável (ext.) e celulose, gelatina e pectina (int.)	Absorção de pouco exsudato, mantém o meio úmido, alivia a dor e estimula tecido de granulação	Proteção de proeminência óssea e lesão parcial da pele	Feridas com grande exsudação e infectadas
HIDROGEL	Álcool de polivinila, poliacrilamidas e polivinil	Ambiente hidrófilo que retém umidade e faz liquidação da necrose	Lesão parcial da pele e feridas com tecidos desvitalizados, inclusive úlcera venosa	Feridas infectadas
ALGINATO DE CÁLCIO	Fibras de algas marinhas impregnadas com cálcio	O cálcio induz a hemostasia, faz a absorção de exsudatos e mantém o meio úmido por desbridamento autolítico	Feridas abertas, exsudativas, cavitárias e sangrantes	Lesões superficiais com pouca exsudação e limpas
CARVÃO ATIVADO COM PRATA	Fibras de carvão ativado impregnado com prata 0,15%	Ação bacteriostática da prata, adsorção de exsudato, diminuição do odor	Feridas fétidas, exsudativas e infectadas	Feridas limpas e secas
MATRIZ DE COLÁGENO	Colágeno bovino ou suíno decelularizado com celulose oxidada	Ativação de fatores de crescimento endógenos	Feridas crônicas e anérgicas (diabéticos, úlceras venosas)	Experiência clínica limitada
TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA	Esponjas, tubos, conectores, película adesiva, reservatório e bomba de vácuo	Pressão subatmosférica, estimula à vascularização, à granulação, controle do edema e população bacteriana	Feridas extensas e de difícil resolução, feridas complexas agudas e crônicas	Feridas neoplásicas

https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/biblioteca_em_saude/062_material_saude_artigo_tratamento_feridas.pdf

Ano: 2011

Banca: FCC

Órgão: TRE-RN

A finalidade do curativo, em ferimento corto contuso extenso, é

- a) manter a ferida seca para facilitar a propagação do tecido de granulação.
- b) proteger contra traumas mecânicos e manter o meio úmido para facilitar a cicatrização.
- c) permitir a utilização de materiais biodegradáveis e favorecer a ação dos osteócitos.



d)proteger contra a proliferação de príons e manter a ferida seca para facilitar a cicatrização.

e)manter a ferida úmida e propiciar a lise da fibrina acelerando o processo de granulação.

Resposta

O curativo, não importa a origem, visa, dentre outros, manter o meio úmido para cicatrização, proteger de traumas, absorver o exsudato moderadamente e etc.

Alternativa: B.

Ano: 2017

Banca: INSTITUTO AOCP

Órgão: EBSEH

Trata-se de uma mistura complexa de enzimas proteolíticas e peroxidases, extraída do látex de um vegetal, que causa a proteólise (degradação de proteínas em aminoácidos) do tecido desvitalizado e da necrose, sem alterar o tecido sadio. O enunciado refere-se

a)ao gel de papaína.

b)à colagenase.

c)ao gel de própolis.

d)aos ácidos graxos essenciais

e)ao hidrocolóide.

Resposta

O enunciado fala em mistura que provém do látex de um vegetal e que atua em necrose. **Trata-se da papaína.**

Alternativa: A.

Ano: 2010

Banca: FCC

Órgão: TRF - 4ª REGIÃO

A indicação para realização de um curativo tem várias finalidades, inclusive

a)fornecer isolamento térmico para estimular o processo de fibrinólise.

b)manter baixa umidade no leito da ferida, favorecendo o processo cicatricial.

c)ser permeável às bactérias do tipo anaeróbicas, agindo como barreira protetora.

d)absorver o excesso de exsudato para evitar a maceração dos tecidos adjacentes.

e)ser isento de substâncias angiogênicas que auxiliam no processo de epitelização.

Resposta



Nesta questão está a continuação das finalidades do curativo, como evitar a maceração dos tecidos adjacentes.

Alternativa: D.

Ano: 2014

Banca: IBFC

Órgão: TRE-AM

Considerando à técnica do curativo, assinale a alternativa incorreta.

- a) Iniciar os curativos pelas fístulas e colostomias, em seguida as incisões limpas e, por último, as feridas não infectadas e infectadas.
- b) Nas feridas com tecido de granulação ou infecção em cavidades ou fístulas, pode-se irrigar com soro fisiológico aquecido ou solução antisséptica com auxílio de seringa.
- c) Pode-se executar a técnica de curativo com pinças e luvas, sendo recomendado o uso de dois pares de luvas (um para a retirada do curativo e o outro para a realização do curativo), um por vez.
- d) Ao promover o enfaixamento de membros, iniciar da parte distal para a proximal, no sentido do retorno venoso.

Resposta

- a) ERRADA. Inicia-se pelas feridas limpas e depois as infectadas.
- b) CERTA
- c) CERTA
- d) CERTA
- e) CERTA.

Alternativa: A.

Ano: 2015

Banca: FGV

Órgão: Prefeitura de Cuiabá - MT

Assinale a opção que apresenta uma situação em que se recomenda o curativo com hidrogel.

- a) Feridas infectadas.
- b) Queimaduras de 3º grau.
- c) Lesões cavitárias.
- d) Feridas com exsudação abundante.
- e) Feridas limpas com pouco exsudato.



Resposta

O hidrogel é indicado para feridas com tecido de granulação, limpas com pouco exsudato ou queimaduras de segundo grau.

Alternativa: E.

Ano: 2011

Banca: CESGRANRIO

Órgão: Transpetro

Um trabalhador destro sofreu queimadura extensa determinada por agente físico em toda a mão direita.

Antes da avaliação médica, qual deve ser o cuidado de enfermagem?

- a)Aplicar soro fisiológico
- b)Aplicar pomada anestésica
- c)Aplicar pomada adstringente
- d)Realizar curativo fechado
- e)Realizar curativo compressivo

Resposta

É necessário hidratar a área e o soro fisiológico (morno, de preferência) e o mais indicado e neutro.

Alternativa: A.

Ano: 2012

Banca: FCC

Órgão: TRE-PR

Ao realizar um curativo em feridas e abscessos profundos no membro inferior deve-se

- a)evitar o uso de soluções coloridas por prejudicarem a avaliação da ferida.
- b)limpar a ferida com antisséptico iodado antes da coleta de material para o exame de cultura.
- c)coletar o material purulento na parte mais superficial da ferida, aspirando com seringa.
- d)enfaixar o membro inferior iniciando-se da parte proximal para a distal, no sentido da circulação arterial.
- e)manter o ambiente iluminado, limpo e com correntes de ar.

Resposta

a) CERTA



- b) ERRADA. Quando se faz cultura, não pode utilizar antisséptico. previamente.
- c) ERRADA. Coletar da parte mais profunda.
- d) ERRADA. Distal para proximal
- e) ERRADA. Sem corrente de ar, diminuindo risco de contaminação.

Alternativa: A.

Ano: 2011

Banca: FCC

Órgão: TRE-AP

Curativo utilizado em úlcera por pressão, derivado de algas, cuja função é absorver o exsudato, promover a hemostasia da ferida e que requer curativo secundário, é chamado de

- a) alginato de bário.
- b) hidrocolóide de cálcio.
- c) hidrogel de alcatrão.
- d) alginato de cálcio.
- e) hidrocolóide de iodo.

Resposta

O enunciado remete ao alginato de cálcio. Ao entrar em contato com a secreção da ferida, forma-se um gel fibroso, absorvente e hemostático, rico em cálcio, que mantém o meio úmido. Devido a essas características, requer curativo secundário.

Alternativa: D.

Ano: 2015

Banca: AOCP

Órgão: EBSEH

Paciente internado na UTI apresenta deiscência de incisão cirúrgica abdominal, com exposição de tecido granulado e pequenas áreas com esfacelos, apresentando grande exsudação serossanguinolenta. Qual é o tipo de curativo passivo que induz hemostasia, absorve exsudatos e mantém o meio úmido com desbridamento autolítico para o tratamento desta ferida?

- a) Hidrogel.
- b) Alginato de cálcio.
- c) Papaína.
- d) Hidrocolóide.



e) Carvão ativado com prata.

Resposta

Essa cobertura é famosa nas questões de concursos. Perceba as palavras chaves: hemostasia, desbridamento autolítico. Trata-se do alginato de cálcio.

Alternativa: B.

Ano: 2008

Banca: FCC

Órgão: TRT - 2ª REGIÃO (SP)

Ao realizar curativo em uma ferida com presença de exsudato purulento na perna de um cliente diabético, um dos procedimentos de enfermagem correto, dentre outros, pode ser

a) realizar a limpeza, em um só movimento e no sentido de fora para dentro e de dentro para fora da ferida, e repeti-los de forma contínua.

b) utilizar a pinça anatômica e a de Koch para retirar o curativo sujo e para a execução do novo curativo.

c) limpar a ferida com solução fisiológica morna.

d) realizar o desbridamento da ferida com solução iodada.

e) aplicar curativo à base de ácidos graxos essenciais para facilitar o processo de cicatrização no sentido do epitélio para o subcutâneo.

Resposta

a) ERRADA. A limpeza deve ocorrer em jato com auxílio de seringa.

b) ERRADA. Não se deve utilizar a mesma pinça para o curativo sujo e limpo.

c) CERTA.

d) ERRADA. O desbridamento poderá ocorrer por meio da papaína ou colagenase, por exemplo.

e) ERRADA. O AGE não é indicado para ferida com exsudato purulento.

Alternativa: C.

Ano: 2015

Banca: FGV

Órgão: Prefeitura de Cuiabá - MT

Associe o tipo de curativo à indicação correspondente:

1. Papaína

2. Hidrocolóide

3. Hidrogel



4. Alginato de cálcio

- () Úlcera venosa com drenagem
- () Lesões cavitárias
- () Desbridamento de tecidos desvitalizados
- () Tratamento de úlcera de pressão não infectada

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.

- a) 3 – 2 – 1 – 4
- b) 4 – 3 – 2 – 1
- c) 1 – 2 – 3 – 4
- d) 3 – 4 – 1 – 2
- e) 2 – 1 – 4 – 3

Resposta

- (HIDROGEL) Úlcera venosa com drenagem
- (ALGINATO DE CÁLCIO) Lesões cavitárias
- (PAPAÍNA) Desbridamento de tecidos desvitalizados
- (HIDROCOLOIDE) Tratamento de úlcera de pressão não infectada

Alternativa: D.

1.17 POSIÇÕES CIRÚRGICAS

O posicionamento do paciente para a cirurgia é essencial para o desempenho de um procedimento seguro e eficiente, por isso, todos os membros da equipe devem protegê-lo de qualquer efeito danoso decorrente do inadequado posicionamento. Compete ao enfermeiro, juntamente com os demais membros da equipe, a responsabilidade de avaliar previamente o paciente como um todo, observar as condições dos suportes de apoio e qualquer situação que possa comprometer o posicionamento do paciente na mesa de operações e acarretar complicações.

As intervenções eficazes na prevenção de lesões de pele estão relacionadas ao alívio de pressões durante e imediatamente após a permanência do paciente na mesa cirúrgica, sobre o colchão padrão⁵. Os dispositivos mais eficazes na prevenção de lesões de pele, em ordem decrescente, são: o colchão de ar micro pulsante, a cobertura de colchão de polímero de visco elástico seco e as almofadas de gel, sucessivamente.

O uso dos recursos de proteção no posicionamento do paciente no intraoperatório assegura a manutenção da integridade da pele e das pressões osteoarticulares e neuromusculares, tendo



como objetivo evitar atritos, prevenindo lesões da pele como UPPs, compressão ou estiramentos neuromusculares, contato com o metal da mesa que pode ocasionar queimaduras (devido ao uso do bisturi elétrico) e outros danos.

Resumindo:

Decúbito dorsal ou supina: acolchoar o calcâneo, o sacro, o cóccix, o olecrano, a escápula, a tuberosidade isquiática e o occipital. Manter os braços nas laterais com as palmas voltadas para baixo (em pronação) ou “em cruz” e o braço apoiado à tala, em um ângulo inferior a 80° em relação ao corpo, para não provocar estiramento dos músculos e nervos nessa região, assim como a compressão das artérias subclávia e axilar sob o processo coróide da escápula ou a compressão entre a clavícula e as primeiras duas costelas. Não garrotear as extremidades para fixar as mãos. O lençol da mesa cirúrgica pode ser utilizado para fixar os braços em toda a sua extensão e prevenir que fiquem, se for o caso, pendentes ao longo da mesa. A cabeça deve estar alinhada à coluna vertebral e ao quadril. Um pequeno coxim abaixo da cabeça permite o relaxamento do músculo trapézio e previne a distensão do pescoço; flexões e torções podem causar contraturas e interferir na permeabilidade das vias aéreas. Os membros inferiores (MMII) devem permanecer estendidos e os pés, ligeiramente separados^{3,6}.


Decúbito ventral ou prona: proteger o quadril e as coxas com travesseiros grandes. Proteger os seios. Acomodar a genitália masculina em posição lateral. Proteger o dorso dos pés, a cintura escapular, o olecrano, a espinha íliaca e a patela³. SIMS (lateral): manter o alinhamento espinal, observar orelhas, colocar um apoio sob a cabeça, a região da axila e entre as pernas, manter a perna em contato com a mesa flexionada na região do quadril e a superior esticada. Usar uma fita adesiva de 10 cm de largura fixada a um lado da mesa, sobre a crista íliaca, até o outro lado.

Litotomia: utilizar acolchoamento nos estribos. Ter duas pessoas para levantar lentamente as pernas com leve rotação do quadril, posicionar os joelhos com leve flexão. Cobrir as pernas com botas de algodão. Posicionar os braços sobre as talas ou relaxados sobre o abdome, apoiados por um lençol. Reverter o posicionamento lentamente, para favorecer a adaptação fisiológica do organismo à nova posição, uma vez que a mudança brusca pode causar hipotensão severa devido à súbita alteração do fluxo circulatório. Revestir as perneiras metálicas com coxins macios, com altura ajustada ao comprimento dos MMII do paciente, posicionando os dois membros ao mesmo tempo, ou seja, dois profissionais executando o procedimento, atentando-se ainda em realizá-lo de forma segura e lenta, flexionando os joelhos e apoiando uma das mãos na região da planta dos pés.




Estas são as que mais são cobradas, mas vejamos outras, junto com as imagens para melhor fixação.


Decúbito dorsal: costas em contato com a mesa cirúrgica.



Decúbito ventral: tórax do paciente em contato com a mesa cirúrgica.




SIMS ou Decúbito lateral: pernas fletidas e lateral do paciente encostada na mesa cirúrgica.




Litotômica ou ginecológica: costas na mesa cirúrgica com as pernas do paciente suspensas, abertas e apoiadas.



Tredelemburg: costas do paciente encostadas na mesa cirúrgica, mas os pés ficam mais elevados que a cabeça.



Tredelemburg reverso: inverso ao anterior. As costas do paciente encostam na mesa cirúrgica, mas o eixo é inclinado para baixo, deixando os pés mais baixos que a cabeça.



Fowler ou sentada: paciente semi-sentado em aproximadamente 45°.

Ano: 2017
Banca: CESPE
Órgão: TRE-BA



No período pré-operatório imediato de cirurgia de varizes, bem como durante a realização desse procedimento, o paciente deve ser mantido na posição de

- a) Sims.
- b) Elliot.
- c) Mayo-Robson.
- d) Fowler.
- e) Trendelemburg.

Resposta

Mantido com pernas mais elevadas que o corpo, em Trendelemburg.

Alternativa: E.

Ano: 2016

Banca: INAZ do Pará

Órgão: Prefeitura de Jacundá - PA

A posição na mesa cirúrgica com a paciente deitada de costas com as pernas e coxas fletidas em ângulos agudos, sendo mantida com os pés em estribos, é a utilizada para procedimentos no períneo. A denominação correta desta posição é

- A posição dorsal.
- B posição de trendelemburg.
- C posição de litotomia.
- D posição decúbito ventral.
- E posição lateral ou sims.

Resposta

Esta é a posição ginecológica ou litotômica.

Alternativa: C.

Ano: 2014

Banca: INSTITUTO AOCP

Órgão: UFC

Jesuína, 45 anos, encontra-se internada na clínica cirúrgica após crioescleoterapia de membro inferior esquerdo, devendo ficar em qual posição a fim de favorecer o retorno venoso?

- A Trendelemburg.
- B Litotômica.
- C Fowler.
- D Ortostática.



E Sims.

Resposta

O retorno venoso é facilitado com a elevação dos MMII, no caso, dentre as alternativas, com a posição descrita em "a".

Alternativa: A.

Ano: 2014

Banca: FEPESE

Órgão: Prefeitura de Palhoça - SC

Na técnica de sondagem nasoenteral, a posição do paciente, caso não haja contraindicação, deve ser:

A Fowler alta.

B Fowler baixa.

C Decúbito dorsal.

D Decúbito dorsal horizontal.

E Cabeça lateralizada.

Resposta

Para a passagem de sonda nasoenteral é necessário Fowler baixa, por volta de 45 graus.

Alternativa: B.

Ano: 2014

Banca: CESGRANRIO

Órgão: Banco do Brasil

No ambulatório de pronto atendimento de uma instituição, deu entrada um trabalhador com queixa de cefaleia intensa e apresentando vômitos em jato.

Para diminuir o fluxo sanguíneo cerebral e a pressão intracraniana, a equipe médica solicitou ao auxiliar de enfermagem que colocasse o trabalhador de repouso na posição de

A Fowler

B Sims

C Heimlich

D Kristeller

E Trendelemburg

Resposta



A posição de Fowler é tipicamente utilizada para libertar a tensão sobre os músculos do paciente e para melhorar a respiração, sendo indicada para pacientes que apresentam problemas respiratórios e cardíacos, em pós-operatório nasal, buco maxilo e tireoidectomia, higiene oral, passagem de sondas: nasogástrica ou nasoenteral, conforto e durante a alimentação do paciente.

Também é usada como prevenção de aspiração pelas vias respiratórias de secreções ou vômitos em pacientes com nível de consciência rebaixados.

Alternativa: A.

1.18 CÁLCULO DE MEDICAMENTOS

Calcular a dose do medicamento do paciente, baseado na prescrição médica e na apresentação disponível do fármaco, é tarefa usual para a equipe de enfermagem.

Uma boa parte dos cálculos são resolvidos por regra de 3 e transformações métricas.

Faremos esta parte na prática, evitando “decorebas”, mas treinando como realmente é cobrado nas provas.

(FEPESE – SES – 2017) **Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação à administração de medicamentos.**

() Utilizar materiais e técnicas assépticas para administrar medicamentos por via parenteral. Registrar todas as ações imediatamente após a administração do medicamento.

() Utilizar bandeja contendo diversos medicamentos para diferentes pacientes, no momento da administração.

() Solicitar revisão por um colega sempre que calcular doses para medicamentos potencialmente perigosos.

() Padronizar o armazenamento adequado e a identificação completa e clara de todos os medicamentos sob a guarda da equipe de enfermagem.

() Comunicar ao paciente qual o medicamento que está sendo administrado, mas não especificar qual a sua ação para não causar stress desnecessário.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

a) V V V F F

b) F V V V V



- c) V F V V V
- d) F F V V V
- e) V F V V F

Resposta

(V)

(F) Misturar, na mesma bandeja, medicamentos de vários pacientes aumentará o risco de erros.

(V)

(V)

(F) O paciente tem o direito de saber toda e qualquer informação sobre o medicamento que vier a receber e o livre arbítrio para a recusa.

Alternativa: E.

(INSTITUTO AOCP – EBSERH – 2016) **Em relação às práticas seguras na administração de medicamentos, assinale a alternativa correta.**

- a) Uma das regras de segurança é administrar os medicamentos que constem na prescrição
- b) A observação dos cinco certos na administração de medicamentos garante que os erros de administração não ocorrerão.
- c) A antecipação ou o atraso da administração do medicamento em relação ao horário predefinido pode ser alterado de acordo com a necessidade de quem administra os medicamentos.
- d) Em casos de preparo de pacientes para exames ou jejum, deve-se adiar a administração do medicamento sendo, nesse caso, desnecessário o registro da ação.
- e) Deve-se implantar a dupla checagem das doses prescritas principalmente para medicamentos potencialmente perigosos/alta vigilância.

Resposta

a) ERRADA. Os medicamentos que constem na prescrição deverão ser administrados somente se estiverem legíveis e com dose, via e periodicidade corretas, além do carimbo e assinatura do médico.

b) ERRADA. Hoje em dia, falamos em 9 certo, conforme já vimos e, mesmo assim, são para minimizar ao máximo a chance de erros na administração.

c) ERRADA. Os medicamentos deverão ser administrados conforme o apazamento, sendo alterados, apenas em casos de extrema necessidade e com o registro adequado do ocorrido.

d) ERRADA. Alguns medicamentos poderão ser dados mesmo em jejum, com o mínimo de água, já outros serão adiados. Tudo deverá ser registrado adequadamente.

e) CERTA.



Alternativa: E.

(FCC - TRT 5ª REGIÃO/BA – 2013) É prescrito 10 g de glicose ao paciente que apresenta quadro de hipoglicemia. No serviço de saúde existem ampolas de 10 mL de glicose 25% e ampolas de 20 mL de glicose 50%. Nessa situação, deve-se administrar ao paciente:

- a) 25 mL de glicose 25%.
- b) 20 mL de glicose 50%.
- c) 10 mL de glicose 50%.
- d) 10 mL de glicose 25%.
- e) 5 mL de glicose 25%.

Resposta

Toda vez que você ler, por exemplo, 25%, entenda que para 100mL há 25 gramas do produto.

Vamos tentar primeiro calcular as ampolas de 25% para ver se já chegamos na resposta:

$$25\text{g} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 100 \text{ mL}$$

$$X \text{ g} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 10 \text{ mL}$$

$$X = 2,5 \text{ g.}$$

Ou seja, se fossem usadas as ampolas de glicose a 25%, necessitaríamos de 4 ampolas para chegar aos 10g prescrito, ou seja, 40 mL.

Como não há essa resposta, vamos calcular com as ampolas de 50%.

$$50 \text{ g} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 100 \text{ mL}$$

$$X \text{ g} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 20 \text{ mL}$$

$$X = 10\text{g}$$

A prescrição é de 10g (resposta do nosso cálculo acima), então, a administração será de uma ampola de 20mL de glicose 50%, conforme disponível.

Alternativa: B

(CONSULPLAN– TRE/RJ - 2017) “Após atendimento médico, foram prescritas para Eunice Santos Pereira, 49 anos, 10 UI de insulina regular subcutânea (100 UI/ml). Para a aplicação, no posto de enfermagem, só havia seringa de 3,0 ml.” Quanto de insulina deverá ser administrado?

- a) 0,1 mL
- b) 0,2 mL
- c) 0,4 mL



d) 1,0 mL

Resposta

A seringa de insulina tem 1 mL. A cada 1 mL da seringa, temos 100 UI da insulina. Se eu quero apenas 10 UI, faço a regra de três para saber quanto devo aspirar de qualquer outro tamanho de seringa.

1 mL _____ 100 UI

X _____ 10 UI

X = 0,1 mL

Alternativa: A.

(FCC– TRE/PR – 2017) É prescrito pelo médico a administração de 300 mg de um medicamento e 1 g desse medicamento está diluído em 9 mL. Para atender a prescrição médica, deve-se administrar no paciente:

a) 2,7 mL.

b) 3 mL.

c) 2,3 mL.

d) 3,2 mL.

e) 3,7 mL

Resposta

Primeiro, vamos deixar tudo em mg para podermos calcular. No caso, 1 g = 1000 mg.

1000 mg _____ 9 mL (de diluição)

300 mg _____ X mL

X = 2,7 mL

Alternativa: A.

(FCC– TRF 11ª REGIÃO AM E RR – 2017) Durante a consulta ambulatorial, a paciente portadora de bronquite asmática apresentou um quadro de broncoespasmo intenso e foi prescrito pelo médico 60 mg de Aminofilina a ser administrado por via endovenosa. O medicamento está disponível na unidade na apresentação de ampola de 10 mL, contendo 24 mg/mL. Nesse caso, para administrar a dosagem prescrita, o técnico de enfermagem deve aspirar, em mL,

a) 5,2.

b) 0,6.

c) 2,5.



- d) 1,8.
- e) 4,0.

Resposta

Só regra de 3.

O frasco contém 24mg para cada mL e ele quer saber quantos mL administrar conforme a prescrição de 60 mg.

$$24\text{mg} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 1 \text{ mL}$$

$$60\text{mg} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad X \text{ mL}$$

$$X = 2,5 \text{ mL}$$

Alternativa: C.

(CESPE– TRE/BA – 2017) Em uma unidade de saúde, foram prescritas 60 unidades internacionais (UI) de insulina NPH, a serem administradas por via subcutânea, a um paciente diabético. Ao preparar a medicação, no entanto, o profissional de enfermagem notou que não havia seringas próprias para UI, estando disponíveis apenas seringas de 3 mL. Nesse caso, para atender à prescrição, o profissional deve aspirar nessa seringa o volume de insulina NPH correspondente a:

- a) 0,60 mL.
- b) 1,20 mL.
- c) 0,06 mL.
- d) 0,12 mL.
- e) 0,20 mL.

Resposta

O frasco de insulina é de 100 UI de insulina por mL. Lembra que vimos que a relação é a seringa de 1 mL para cada 100 UI de insulina? Então:

$$100\text{UI} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad 1\text{mL}$$

$$60 \text{ UI} \quad \underline{\hspace{2cm}} \quad X$$

$$X = 0,60 \text{ mL}$$

Alternativa: A

(FCC– TRT 23ª REGIÃO /MT – 2016) Após consulta médica, o paciente saiu com uma receita de paracetamol comprimido de 500 mg uso oral, tomar 500 mg de 6 em 6h,



se temperatura igual ou acima de 37,5 °C. Neste caso, a dose máxima diária do medicamento prescrito é de

- a) 0,2 gramas.
- b) 2.000 gramas.
- c) 2 gramas.
- d) 20,0 microgramas.
- e) 2 microgramas.

Resposta

Veja, se o intervalo máximo é de 6 em 6h, será administrado, no máximo, 4 vezes ao dia, pois o dia só tem 24h.

Logo, 500 mg x 4 vezes ao dia, resulta em, no máximo, 2000mg, ou 2g do medicamento.

Alternativa: C.

(FCC– TRT 23ª REGIÃO /MT – 2016) Para uma paciente com broncoespasmo foi prescrito 60 mg de Aminofilina diluída em 500 mL de Soro Glicosado a 5%. Ao verificar que na unidade de saúde a Aminofilina disponível é de 24 mg/mL em ampola de 10 mL, o Técnico de Enfermagem, para atender a prescrição médica, deve aspirar, em mL:

- a) 3,5.
- b) 2,0.
- c) 1,5.
- d) 5,0.
- e) 2,5.

Resposta

Se o disponível é 24 mg em 1 mL, vamos fazer uma regra de três simples:

24mg _____ 1 mL

60mg _____ X mL

X = 2,5 mL

Alternativa: E.

(FCC– TRT 23ª REGIÃO /MT – 2016) Na sala de observação de um pronto-socorro, o médico solicitou à equipe de enfermagem que, após a Srª X ser medicada conforme a prescrição de 450 mL de Soro Fisiológico a 0,9% para correr à velocidade de 25 gotas



por minuto por via endovenosa, a paciente deveria retornar ao consultório para ser reavaliada. Nesta situação, o tempo previsto para a infusão venosa é de:

- a) 6 horas.
- b) 3 horas e 30 minutos.
- c) 1 hora e 50 minutos.
- d) 4 horas e 40 minutos.
- e) 5 horas

Resposta

Vamos transformar mL em gotas primeiro. É apenas multiplicar por 20, já que **1 mL = 20 gotas.**

$450 \text{ mL} \times 20 = 9000 \text{ gotas.}$

Agora vamos calcular a velocidade. Se o solicitado é gotejar 25 gt por minuto:

25 gt _____ 1min

9000 gt _____ X min

$X = 360 \text{ minutos.}$

Para transformar minutos em horas, basta dividir por 60, já que 1h tem 60 minutos:

Assim: $360 \text{ minutos} / 60 = 6 \text{ horas.}$

Alternativa: A.

(FCC– TRT 20ª REGIÃO /SE – 2016) **O médico prescreve 500 mL de soro fisiológico 0,9% para ser infundido em 6h, via endovenosa. Para atender a essa prescrição, o técnico de enfermagem deverá controlar o gotejamento para:**

- a) 21 gotas por minuto
- b) 26 gotas por minuto
- c) 24 gotas por minuto
- d) 28 gotas por minuto
- e) 25 gotas por minuto

Resposta

Assim: $10.000 / 360 = 28 \text{ gt/min}$ (arredondando, já que não há como calcular meia gota).

Alternativa: D.

(FCC– TRT 20ª REGIÃO /SE – 2016) **De acordo com a prescrição médica, o paciente deverá receber Captopril 50 mg, VO, a cada 12h.**



No hospital onde este paciente está internado há disponível comprimidos de **Captopril 25 mg**. Para atender a prescrição médica e utilizando a medicação disponível, o técnico de enfermagem deverá, a cada 12h, administrar ao paciente:

- a) 2 comprimidos.
- b) 4 comprimidos.
- c) 1 comprimido.
- d) 1/2 do comprimido.
- e) 1/4 do comprimido.

Resposta

É uma simples regra de três, mas dá para resolver até sem ela. Se a disponibilidade do comprimido é de 25 mg e o paciente necessita de 50 mg, é somente dar o dobro da dose, ou seja, 2 comprimidos.

Alternativa: A

(FCC- TRT 3ª REGIÃO/MG – 2015) Foi prescrito para um paciente adulto 1,5 mL de determinado medicamento, por via oral. A unidade de saúde dispõe do medicamento prescrito em frasco/gotas contendo 10 mL. Nesta situação, o profissional de enfermagem deve administrar do frasco disponível:

- a) 30 gotas.
- b) 50 gotas.
- c) 25 gotas.
- d) 15 gotas.
- e) 10 gotas.

Resultado

Se a prescrição é de 1,5 mL, é somente multiplicar por 20 para ter o resultado em gotas.
 $1,5 \times 20 = 30$ gotas.

Alternativa: A.

(FCC- TRT 3ª REGIÃO/MG – 2015) Para administrar 0,6 mg de decadron por via endovenosa, e dispondo de frascos de 4 mg/mL, o volume a ser administrado e os efeitos deste medicamento estão corretamente descritos em:

- a) 0,10 mL, imunossupressor e antidepressivo
- b) 0,15 mL, anti-inflamatório e imunossupressor
- c) 0,18 mL, colinérgico e anti-inflamatório.
- d) 0,20 mL, imunossupressor e antidepressivo.
- e) 0,25 mL, anti-inflamatório e imunossupressor.



Resposta

Exercício parecido com os demais, apenas acrescido da função do fármaco. Quanto a função: decadron apresenta efeito anti-inflamatório e imunossupressor.

Agora vamos à conta:

4mg _____ 1 mL (apresentação)

0,6 mg _____ X mL

X = 0,15 mL

Alternativa: C.

(FCC– TRT 20ª REGIÃO /SE – 2016) **No frasco de 5.000.000 UI de penicilina cristalina foi injetado 8 ml de diluente. Após a diluição o volume contido no frasco é de:**

- a) 8 mL.
- b) 8,5 mL.
- c) 10 mL.
- d) 11,5 mL.
- e) 12 mL

Resposta

Quando o exercício envolver penicilina, lembre-se que a cada 5.000.000 UI de penicilina diluída, haverá expansão de 2mL na solução final.

Logo, com os 8mL de diluente, teremos 10mL de volume total, ao final.

A questão é apenas isso!

Alternativa: C.

(FCC– TRE/SP – 2017) **Para um paciente foi prescrito dipirona gotas, 1,5 grama, por via oral. A unidade de saúde dispõe de frascos de dipirona gotas com 500 mg/mL. Neste caso, devem ser administrados pelo profissional de enfermagem:**

- a) 3 mL ou 60 gotas.
- b) 1,5 mL ou 15 gotas.
- c) 2 mL ou 45 gotas.
- d) 1 mL ou 30 gotas.
- e) 1,5 mL ou 30 gotas.

Resposta

500 mg _____ 1 mL

1500mg _____ X mL

X = 3mL



Transformando em gotas: multiplique os 3mL por 20 = 60 gt.

Alternativa: A.

(FCC– TRE/SP – 2017) Foi prescrito a uma paciente Penicilina cristalina 3.500.000 UI EV de 8 em 8 horas. Cada frasco ampola apresenta 10.000.000 UI que deverá ser diluído em 6 mL de água destilada. Ao calcular quantos mL da medicação deverá ser administrado em cada horário, o profissional de enfermagem chega ao resultado, em mL, de:

- a) 2.1
- b) 35.
- c) 3,5.
- d) 21.
- e) 2,8

Resposta

A cada 5.000.000 UI de penicilina, há expansão de 2mL na solução final. Assim, proporcionalmente, as 10.000.000 UI do enunciado expandirão 4mL. Como diluiu em 6mL, serão 10mL no total.

10 000 000 UI _____ 10 mL

3 500 000 UI _____ X mL

X= 3,5 mL

Alternativa: C.

(UEM – UEM – 2017) Homem, 74 anos, acamado e totalmente dependente desde que teve Acidente Vascular Cerebral há 2 anos, está internado na Clínica Médica, com episódios recorrentes de hipoglicemia. O médico prescreveu acréscimo de 5 gramas de glicose hipertônica no soro de manutenção. Ao considerar que na Instituição só está disponível glicose hipertônica 25% com 10mL, quantas ampolas serão necessárias?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

Resposta

Temos ampolas de 25%, logo:

25g - 100mL



$$5g - x$$

$$X = 500/25$$

$$X = 20mL$$

Como cada ampola é de 10mL, precisaremos de 2 ampolas.

Alternativa: B

1.19 BANHO

Os hábitos relacionados ao banho, como freqüência, horário e temperatura da água, variam de pessoa para pessoa. Sua finalidade precípua, no entanto, é a higiene e limpeza da pele, momento em que são removidas células mortas, sujidades e microrganismos aderidos à pele.

Os movimentos e a fricção exercidos durante o banho estimulam as terminações nervosas periféricas e a circulação sangüínea. Após um banho morno, é comum a pessoa sentir-se confortável e relaxada. A higiene corporal pode ser realizada sob aspersão (chuveiro), imersão (banheira) ou ablução (com jarro banho de leite). O autocuidado deve ser sempre incentivado.

Assim, deve-se avaliar se o paciente tem condições de se lavar sozinho. Caso seja possível, todo o material necessário à higiene oral e banho deve ser colocado na mesa-de-cabeceira ou carrinho móvel do lado da cama, da forma que for mais funcional para o paciente. A enfermagem deve dar apoio, auxiliando e orientando no que for necessário.

Tradicionalmente, costuma-se lavar primeiro o rosto, braços, região ventral, membros inferiores, dorso e genitais, contudo é importante que o profissional de enfermagem avalie o estado geral do paciente e estabeleça a melhor maneira de prestar o cuidado, sempre lembrando que a higiene deve ser realizada da região mais limpa para a mais suja, evitando-se levar sujidade e contaminação às áreas limpas. Ao se posicionar o paciente de lado, para lavar o dorso, habitualmente se realiza uma massagem de conforto para ativar a circulação local.

Quando do banho, expor somente um segmento do corpo de cada vez, lavando-o com luva de banho ensaboada, enxaguando-o - tendo o cuidado de remover todo o sabão - e secando-o com a toalha de banho. Esse processo deve ser repetido para cada segmento do corpo. A secagem deve ser criteriosa, principalmente nas pregas cutâneas, espaços interdigitais e genitais, base dos seios e do abdome em obesos - evitando a umidade da pele, que propicia proliferação de microrganismos e pode provocar assaduras. Procurando



estimular a circulação, os movimentos de fricção da pele devem preferencialmente ser direcionados no sentido do retorno venoso.

Na higiene íntima:

- sexo feminino, a limpeza deve ser realizada no sentido ântero-posterior;
- masculino, o prepúcio deve ser tracionado, favorecendo a limpeza do meato urinário para a base da glândula, removendo sujidades (pêlos, esmegma, urina, suor) e inibindo a proliferação de microrganismos. A seguir, recobrir a glândula com o prepúcio.

A higiene oral frequente reduz a colonização local, sendo importante para prevenir e controlar infecções, diminuir a incidência de cáries dentárias, manter a integridade da mucosa bucal, evitar ou reduzir a halitose, além de proporcionar conforto ao paciente. Em nosso meio, a maioria das pessoas está habituada a escovar os dentes - pela manhã, após as refeições e antes de deitar - e quando isso não é feito geralmente experimenta a sensação de desconforto.

Avaliar a possibilidade de o paciente realizar a própria higiene. Se isto for possível, colocar o material ao seu alcance e auxiliá-lo no que for necessário. Caso contrário, com o material e o ambiente devidamente preparados, auxiliar o paciente a posicionar-se, elevar a cabeceira da cama se não houver contra-indicação e proteger o tórax do mesmo com a toalha, para que não se molhe durante o procedimento.

Em pacientes inconscientes ou impossibilitados de realizar a higiene bucal, compete ao profissional de enfermagem lavar-lhe os dentes, gengivas, bochechas, língua e lábios com o auxílio de uma espátula envolvida em gaze umedecida em solução dentifrícia ou solução bicarbonatada a qual deve ser trocada sempre que necessário. Após prévia verificação, se necessário, aplicar um lubrificante para prevenir rachaduras e lesões que facilitam a penetração de microrganismos e dificultam a alimentação.

Vamos complementar:

Ano: 2016

Banca: FUNRIO

Órgão: IF-PA



O banho de leito muitas vezes esgota o paciente. Virar o paciente durante o banho completo e prestar cuidados às costas aumenta consumo de oxigênio. Durante o banho, caso o paciente sinta-se dispneico no momento em que o leito se encontra na posição plana, qual conduta que se deve ter relação a isso?

- A O leito deve ser rapidamente colocado na posição Trendelenburg.
- B A posição do leito deve ser alterada para a posição Trendelenburg reversa.
- C O leito deve ser colocado na posição de fowler.
- D A leito deve ser rapidamente colocado na posição de semi-fowler.
- E O paciente deve ser colocado em decúbito lateral evitando o risco de broncoaspiração.

Resposta

Para melhorar o padrão respiratório, é necessário elevar a cabeceira do paciente.

Alternativa: C.

Ano: 2014

Banca: NUCEPE

Órgão: Prefeitura de Parnarama - MA

O banho no leito além de proporcionar conforto e bem estar ao paciente, ele é indicado para:

- A Estimular a circulação
- B Combater as úlceras
- C Regular a respiração
- D Regular a digestão
- E Aumentar o apetite.

Resposta

Massagem de conforto pode ser realizada durante o banho, onde, inclusive, ativa a circulação.

Alternativa: A.

Ano: 2017

Banca: FEPESE



Órgão: SES-SC

Dentre os cuidados de enfermagem está o banho, possuindo fins terapêuticos ou de limpeza.

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

- A O banho de aspersão é também conhecido como banho no leito.
- B A região perineal deve ser a primeira área a ser lavada, para minimizar infecção.
- C O banho no leito deve ser realizado preferencialmente por uma única pessoa, para minimizar o constrangimento do paciente.
- D A sequência correta do banho no leito deve seguir o retorno venoso para favorecer a circulação, ou seja, no sentido caudal-cefálico.
- E Dentre os objetivos do banho está o de proporcionar bem-estar e higiene, estimular a circulação, oportunizar exercícios ativos e passivos e realizar inspeção do paciente.

Resposta

- a) ERRADO. Banho de aspersão é de chuveiro.
- b) ERRADO. Região perineal deve ser a última.
- c) ERRADO. Em dupla pelo esforço físico e agilidade.
- d) ERRADO. Oposto. Célafo-caudal.
- e) CERTA.

Alternativa: E.

Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: EBSEH

O banho, mais que uma técnica, é um momento importante para a enfermagem interagir com o cliente. Sendo assim o banho no leito engloba que tipo de higiene?

- A Apenas íntima e oral.
- B Higiene ocular, oral, do couro cabeludo e dos cabelos, do corpo e íntima.
- C Apenas ocular e couro cabeludo.
- D Apenas dos cabelos e íntima.
- E Apenas oral e ocular.

Resposta



Inclui rosto, corpo, bucal, cabelos e região íntima.

Alternativa: B.

1.20 RETIRADA DE PONTO

Consiste no procedimento de remoção dos fios cirúrgicos com técnica asséptica, o qual pode ser retirada pode ser total ou alternada.

Finalidade:

- Oferecer a limpeza da incisão cirúrgica;
- Favorecer a drenagem de exsudato restrito na incisão cirúrgica
- Auxiliar na cicatrização cirúrgica prevenindo a infecção
- Prevenir complicações como infecção e rejeição

Contraindicação:

- Remoção dos pontos com menos que 7 dias da sutura cirúrgica.
- Discrasias sanguíneas

Pode ser realizado com:


Pacote ou kit de curativo estéril contendo, preferencialmente:

- ♣ 01 pinça Kelly reta,
- ♣ 01 pinça anatômica de dissecação,
- ♣ 01 tesoura cirúrgica Spencer ou Íris - romba e curva

Ou

- ♣ Com bisturi.





Como fazer?

01 Reunir o material;

02 Chamar o paciente, confirmar o nome e apresentar-se a paciente, explicando o procedimento que será realizado, sanando todas suas dúvidas antes de iniciar a execução;

03 Higienizar as mãos.

04 Paramentar-se com os EPIs;

05 Expor a área na qual o procedimento será feito e realizar limpeza local com soro fisiológico;

06 Tracionar o ponto pelo nó com a pinça e cortar, em um dos lados, próximo a pele com a tesoura de Íris;

07 Colocar os pontos retirados sobre uma gaze;

08 Cobrir a ferida se houver necessidade;

09 Desprezar os materiais utilizados nos lixos apropriados;

10 Retirar os EPIs e higienizar as mãos;

11 Realizar anotação de enfermagem.

PARECER TÉCNICO N.106 /2015

SOBRE A POSSIBILIDADE DA RETIRADA DE PONTOS CIRURGICO, UTILIZANDO A LÂMINA DE BISTURI



A retirada de pontos pode ser realizada pelos profissionais de enfermagem (Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem), estando também no rol de atribuições do nível médio (auxiliares e técnicos de enfermagem) os cuidados de enfermagem no pré e pós-operatório, desde que seja sob a supervisão e orientação do enfermeiro, podendo ser utilizado à tesoura de íris, sendo substituída pela lâmina de bisturi, desde que o mesmo esteja devidamente acoplado ao cabo de bisturi e o profissional se sinta seguro para realiza-lo.

A realização do procedimento deve ser feito com segurança e se o profissional avaliar que não tem a capacidade técnica e científica no momento de realizar tal procedimento, para o desempenho seguro para si e para o paciente, o profissional enfermeiro ou técnico de enfermagem tem o direito recusar a realizá-lo. Bem como se o serviço não oferecer condições e materiais necessários para realização do procedimento.

Vale ressaltar que todas as atividades que serão realizadas pelos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem deverão seguir a Resolução 358/09 que dispõe sobre a SAE, devendo obrigatoriamente estar implantada em todo e qualquer serviço de saúde.

Ano: 2014

Banca: NUCEPE

Órgão: Prefeitura de Parnarama - MA

De acordo com a Resolução 278/2003 do COFEN, que dispõe sobre sutura realizada por Profissional de Enfermagem, é CORRETO afirmar:

- A É ato de Enfermagem, quando praticada por Enfermeiro Obstetra, a episiorrafia.
- B Em qualquer circunstância é vedado ao Profissional de Enfermagem a realização de suturas.
- C Os Enfermeiros poderão realizar sutura, desde que seja de pequena extensão com comprometimento de menos de 1/3 do tecido lesado.
- D Nos casos de Urgência/Emergência o médico pode delegar ao técnico e auxiliar de enfermagem a confecção de sutura, desde que não seja uma situação iminente de gravidade e risco de morte.
- E O Enfermeiro pode indicar sutura em casos de lesão cutânea simples e delegar ao técnico de enfermagem sua confecção.



Resposta

A letra “a” está correta e todas as demais contrariam em tudo a correta.

Alternativa: A.



Abraço!

Prof. Lígia Carvalheiro



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.