

Eletrônico



**Estratégia**  
CONCURSOS

Aula

Matemática II (p/ Escola de Especialistas de Aeronáutica 2-2019) (Com Videoaulas)

Professor: Ismael de Paula dos Santos, Italo Marinho Sá Barreto

## AULA 00 – Sequências, Progressão Aritmética (PA) e Progressão Geométrica (PG)

### Sumário

<b>1 – Introdução</b>	<b>2</b>
<b>2 – Sequências</b>	<b>3</b>
1 - Sequências de Números Reais	3
2 - Recorrência	5
<b>3 – Progressões Aritméticas</b>	<b>10</b>
1 - Definição	10
2 - Classificações da P.A.	11
3 - Termo Geral da P.A.	12
4 - Média Aritmética	18
5 - Propriedades da média aritmética na P.A.	19
6 - Representações simétricas na P.A.	20
7 - Soma de P.A.	22
<b>4 – Progressões Geométricas</b>	<b>22</b>
1 - Definição	22
2 - Classificações da P.G.	23
3 - Termo Geral da P.G.	24
4 - Razão de P.G.	25
5 - Propriedades da média geométrica na P.G.	25
6 - Representações simétricas na P.G.	26
7 - Soma de P.G finita	27
8 - Produto de P.G finita	27
9 - Soma de P.G infinita	28
10 - Interpolação geométrica	28
<b>5 – Lista de Questões</b>	<b>52</b>
<b>6 – Gabarito</b>	<b>64</b>





## 1- INTRODUÇÃO

Olá, meu futuro aprovado! Como andam os estudos? Espero que bem!

Nesta aula daremos INÍCIO ao conteúdo de **MAT 2**. Espero que estejam gostando do nível da teoria abordada para o seu certame. Ainda temos muita coisa para ver e exercitar. Não perca o foco!

O primeiro dos assuntos será: Sequências. Tema não muito amplo, mas que servirá de embasamento para o estudo de Progressões. Tudo que veremos nesta aula cairá em sua prova, então, preste bastante atenção!

**Já adianto que não temos muitas questões da prova da EEAR. Assim, para que possamos ter um padrão de cobrança, selecionei questões, em sua maioria militares, para testar de fato o conteúdo adquirido.**

**Não esqueça do nosso fórum, local onde você poderá retirar possíveis dúvidas sobre seu aprendizado.**



*@professor\_ismaelsantos*



*profismael.mat@gmail.com*



Sem mais, vamos à luta!



## 2 – SEQUÊNCIAS

### 1 – SEQUÊNCIA DE NÚMEROS REAIS

A partir de conjuntos (Finitos ou Infinitos) podemos dizer, de modo informal, que sequência numérica nada mais é que uma lista de números, na qual necessita-se de uma ordenação. Esta lista ordenada é o que chamamos de sucessão ou sequência.

Vejam alguns exemplos abaixo:

- $(3; 3; 3; 3; \dots)$  - É a sequência com todos os termos iguais a 3.
- $(1; 2; 3; 4; 5)$  - É a sequência com os números inteiros positivos.
- $(10; -8; \sqrt{2}; 5; \frac{7}{3})$  - É uma sequência de números reais.
- $(2; 3; 5; 7)$  - É a sequência de números primos positivos com um algarismo.
- $(1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; \dots)$  - É a famosa sequência de Fibonacci (onde cada termo é igual a soma dos dois anteriores)



**TOME NOTA!**

Toda sequência é representada, em regra, por um par de parênteses, e seus elementos são separados por ponto e vírgula, como visto nos exemplos acima.

#### Meios e Extremos

Imagine uma sequência finita da forma:

$$(a_1; a_2; a_3; \dots; a_{n-1}; a_n)$$



Podemos dizer que:

$a_1$  e  $a_n$  são extremos. Os outros termos da sequência são chamados de meios.



**TOME NOTA!**

**Dois termos de uma sequência ou sucessão são ditos equidistantes dos extremos quando o número de termos que antecedem um deles for igual a quantidade de termos que sucedem o outro.**

Vejamos um exemplo abaixo de termos equidistantes.

$$(a_1; a_2; a_3; \dots; a_{n-2}; a_{n-1}; a_n)$$

- $a_1$  e  $a_n$  - são extremos
- $a_2$  e  $a_{n-1}$  - são equidistantes dos extremos
- $a_3$  e  $a_{n-2}$  - são equidistantes dos extremos

Perceba que, para ter a certeza de que dois termos são de fato equidistantes dos extremos, basta fazer a seguinte relação.

- ✓  $a_1$  : 1º termo
- ✓  $a_n$  : “n-ésimo” termo

**Ou seja, a soma dos índices de quaisquer termos equidistantes dos extremos deverá resultar em:  $n + 1$**

Assim, quaisquer dois termos que tiverem a mesma soma ( $n + 1$ ) será dito equidistante dos termos  $a_1$  e  $a_n$ .

Exemplo:

- ✓  $a_2$  : 2º termo
  - ✓  $a_{n-1}$  :  $(n - 1)$  termo
- $\Rightarrow (n - 1) + 2 = n + 1$



Podemos assim, de forma genérica, dizer que na sequência  $(a_1; a_2; a_3; \dots; a_k; a_p; a_n)$  os termos  $a_k$  e  $a_p$  serão equidistantes, se e somente se:

- ✓  $a_k$  – termo de posição  $k$
- ✓  $a_p$  – termo de posição  $p$

**Soma dos índices:  $k + p = n + 1$**

## 2 - RECORRÊNCIA

É importante notar que o termo sequência é bem amplo, ou seja, qualquer ordem de elementos. Porém, existem casos em que esta sequência é criada com base em uma **lei de formação**. A esta lei damos o nome de **Fórmula de Recorrência**.

Assim, a depender da sequência, podemos usar tal processo de recorrência, que consiste em dar o primeiro termo (ou primeiros termos) e uma sentença aberta que permita calcular cada termo em função do anterior (ou dos anteriores).

Para que fique mais claro, observe os exemplos abaixo.

**a) Consideremos a sequência infinita tal que  $a_1 = 5$  e para todo  $n > 1$  tem-se**

$$a_n = a_{n-1} + 3$$

Vemos que cada termo na da sequência é igual ao anterior  $a_{n-1}$  somado com 3.

$$\left[ \begin{array}{l} a_2 = a_1 + 3 = 5 + 3 = 8 \\ a_3 = a_2 + 3 = 8 + 3 = 11 \\ a_4 = a_3 + 3 = 11 + 3 = 14 \\ \dots \end{array} \right.$$

Portanto, a sequência pode ser representada por: (5; 8; 11; 14; ....)



b) Consideremos a sequência  $f$  de domínio  $E = \{1;2;3;4;5;6\}$  tal que  $f_1 = 3$ ,  $f_2 = 7$  e cada termo, a partir do terceiro, é igual a soma dos anteriores. Temos:

$$\begin{cases} f_3 = f_1 + f_2 = 3 + 7 = 10 \\ f_4 = f_1 + f_2 + f_3 = 3 + 7 + 10 = 20 \\ f_5 = f_1 + f_2 + f_3 + f_4 = 3 + 7 + 10 + 20 = 40 \\ f_6 = f_1 + f_2 + f_3 + f_4 + f_5 = 3 + 7 + 10 + 20 + 40 = 80 \end{cases}$$

Assim a sequência é: (3;7;10;20;40;80)

---

c) Seja a sequência infinita tal que:

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_2 = 1 \\ a_n = a_{n-1} + a_{n-2} \quad (n \geq 3) \end{cases}$$

Vemos que cada termo dessa sequência (a partir do terceiro) é igual a soma dos dois anteriores:

$$\begin{cases} a_3 = a_2 + a_1 = 1 + 1 = 2 \\ a_4 = a_3 + a_2 = 2 + 1 = 3 \\ a_5 = a_4 + a_3 = 3 + 2 = 5 \\ a_6 = a_5 + a_4 = 5 + 3 = 8 \\ \dots \end{cases}$$

Temos então: (1;1;2;3;5;8;...)

Esta sequência é chamada **Sequência de Fibonacci** e tem importantes propriedades. “Fibonacci” é o nome pelo qual ficou conhecido um importante matemático chamado Leonardo de Pisa, que viveu entre 1180 e 1250 aproximadamente. (“Filho de Bonaccio”)

---

Passamos agora para alguns exercícios de fixação.





1. Escreva os 4 primeiros termos das sequências infinitas dadas por:

a)  $a_n = \frac{n}{n+1}$

b)  $a_n = (-1)^n$

**Comentário:**

a)

$$a_n = \frac{n}{n+1}$$

$$a_1 = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

$$a_2 = \frac{2}{2+1} = \frac{2}{3}$$

$$a_3 = \frac{3}{3+1} = \frac{3}{4}$$

$$a_4 = \frac{4}{4+1} = \frac{4}{5}$$

$$\text{Assim, } \left( \frac{1}{2}; \frac{2}{3}; \frac{3}{4}; \frac{4}{5}; \dots \right)$$

Basta observar que, para cada  $n$  natural utilizado, que representa a posição do termos, este valor também será substituído nos locais onde aparecerem a variável  $n$ .



b)

$$a_n = (-1)^n$$

$$a_1 = (-1)^1 = -1$$

$$a_2 = (-1)^2 = +1$$

$$a_3 = (-1)^3 = -1$$

$$a_4 = (-1)^4 = +1$$

Assim,  $(-1; 1; -1; 1; \dots)$

02. Escreva os 5 primeiros termos das sequências infinitas por:

a)

$$\begin{cases} a_1 = 4 \\ a_n = a_{n-1} + 2n \quad (n \geq 2) \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} a_1 = -3 \\ a_n = 2a_{n-1} + 4 \quad (n \geq 2) \end{cases}$$

**Comentário:**

a)

$$a_1 = 4$$

$$a_n = a_{n-1} + 2n$$

$$a_2 = a_1 + 2(2) = 4 + 4 = 8$$

$$a_3 = a_2 + 2(3) = 8 + 6 = 14$$

$$a_4 = a_3 + 2(4) = 14 + 8 = 22$$

$$a_5 = a_4 + 2(5) = 22 + 10 = 32$$

$(4; 8; 14; 22; 32; \dots)$



b)

$$\begin{cases} a_1 = -3 \\ a_n = 2a_{n-1} + 4 \quad (n \geq 2) \end{cases}$$

$$a_2 = 2a_1 + 4 = 2(-3) + 4 = -2$$

$$a_3 = 2a_2 + 4 = 2(-2) + 4 = 0$$

$$a_4 = 2a_3 + 4 = 2(0) + 4 = 4$$

$$a_5 = 2a_4 + 4 = 2(4) + 4 = 12$$

$$(-3; -2; 0; 4; 12; \dots)$$

---

03. Seja a sequência infinita cujo termo geral é

$$a_n = 3n - 4$$

Determine:

a)  $a_6$

b)  $a_{k+1}$

**Comentário:**

Basta fazer a substituição do valor atribuído ao  $n$  em todas as posições em que ele aparece.

a)  $a_6 = 3(6) - 4 = 18 - 4 = 14$

b)  $a_{k+1} = 3(k+1) - 4 = 3k + 3 - 4 = 3k - 1$

---

04. Dê os termos gerais das seguintes sequências:

a) (2; 4; 6; 8; 10; 12; ...)

b) (2; 4; 8; 16; 32; 64; ...)

**Comentário:**



Neste tipo de questão, basta encontrar a lei de formação, ou seja, qual expressão fará você encontrar os termos das sequências dadas.

- a)  $a_n = 2n$ ; nesta sequência, cada termo seguinte é o dobro do índice correspondente a sua posição..
- b)  $a_n = 2^n$ ; nesta sequência, cada termo é uma potência de 2, elevado ao expoente que representa a posição do mesmo.

## 3 - PROGRESSÕES ARITMÉTICAS

### 1 - DEFINIÇÃO

Chamamos de Progressão Aritmética (PA) qualquer sequência onde cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior somado com uma constante denominada razão da progressão. Em outras palavras, uma progressão aritmética de razão  $r$  é uma sequência tal que:

$$a_n = a_{n-1} + r, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Exemplos:

- a) Considerando a sequência (3;5;7;9;11). Vemos que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior somado com 2. Dizemos então que a sequência é uma progressão aritmética de razão  $r = 2$ .
- b) A sequência (2;7;12;17;22;27) é uma progressão aritmética de razão igual a 5
- c) A sequência (20;17;14;11;8;5;2;-1) é uma PA de razão  $r = -3$ .
- d) A sequência (5;5;5;5;5) é uma PA de razão  $r = 0$
- e) A sequência  $\left(\frac{4}{3}; \frac{5}{3}; 2; \frac{7}{3}; \frac{8}{3}; 3\right)$  é uma PA de razão  $r = \frac{1}{3}$



f) Consideremos a PA infinita dada por:  $\begin{cases} a_1 = 4 \\ a_n = a_{n-1} - 2 \end{cases}$ ; podemos perceber que a razão dessa PA é  $r = -2$  e seus primeiros termos estão representados abaixo:

$$(4; 2; 0; -2; -4; -6; \dots)$$

## 2 - CLASSIFICAÇÕES DA PA

Consideremos a sequência  $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \dots, a_{n-1}, a_n)$ , dizemos que:

1º) a sequência é crescente se, e somente se, para todo  $n \in \mathbb{N}$  (com  $n > 1$ ), ou seja, o termo sucessor deve ser maior que seu antecessor. Assim, temos que:

$$a_n > a_{n-1} \Rightarrow r > 0$$

2º) a sequência é decrescente se, e somente se, para todo  $n \in \mathbb{N}$  (com  $n > 1$ ), ou seja, o termo sucessor deve ser menor que seu antecessor. Assim, temos que:

$$a_n < a_{n-1} \Rightarrow r < 0$$

3º) a sequência é estacionária se, e somente se, para todo  $n \in \mathbb{N}$  (com  $n > 1$ ), ou seja, o termo sucessor deve ser igual ao seu antecessor. Assim, temos que:

$$a_n = a_{n-1} \Rightarrow r = 0$$

Exemplos:

- ✓ a sequência  $(2; 7; 20; 42; 70)$  é crescente
- ✓ a sequência  $(18; 14; 12; 3; -4; -20)$  é decrescente
- ✓ a sequência  $(8; 8; 8; 8; 8)$  é estacionária
- ✓ a sequência  $(4; 6; 17; 20; 19; 18; 2)$  não é crescente, nem decrescente, nem estacionária.



### 3 - TERMO GERAL DA PA

É sabido que cada termo da PA pode ser escrito em função do seu antecessor e da razão. A partir deste conceito, considere uma PA de razão  $r$  da forma  $(a_1; a_2; a_3; \dots; a_n; \dots)$ . Observe abaixo a escrita de cada termo seguinte a ideia que acabamos de falar.

$$\left[ \begin{array}{l} a_2 = a_1 + r \\ a_3 = a_2 + r \\ a_4 = a_3 + r \\ \vdots \\ a_{n-1} = a_{n-2} + r \\ \dots\dots\dots \\ a_n = a_{n-1} + r \end{array} \right. \Rightarrow \text{Somando as equações e simplificando os termos semelhantes...}$$

...somando membro a membro essas  $n - 1$  igualdades, teremos:

$$a_n = a_1 + \underbrace{r + r + r + \dots + r}_{(n-1) \text{ parcelas}}$$

Logo, o termo geral é:

$$a_n = a_1 + (n-1).r$$

#### Exemplos

a) Podemos então, sempre escrever qualquer termo em função do primeiro e da razão da PA. Veja o exemplo abaixo:

$$\begin{aligned} a_2 &= a_1 + r \\ a_3 &= a_1 + 2r \\ a_4 &= a_1 + 3r \\ a_{20} &= a_1 + 19r \\ a_{37} &= a_1 + 36r \end{aligned}$$

Observe nos exemplos acima que, sempre **o número que multiplica a razão é uma unidade a menos que o índice do termo geral a ser encontrado**. Porém, isso só se faz verdade se o termo base for o primeiro, ou seja, o  $a_1$ . Pois, se por exemplo o termo base for o 4º termo, logo o número que multiplicar a razão será 4 unidades menor que o índice do termo geral.





Desta forma, podemos generalizar ainda mais a fórmula do termo geral, a saber:

$$a_n = a_m + (n - m) \cdot r$$

b) É importante observar que se  $a_n = a_{n-1} + r$  então  $r = a_n - a_{n-1}$ , isto é, para obtermos a razão de uma PA, basta fazermos as diferenças entre um termo qualquer (a partir do 2º) e o anterior. Assim:

$$r = a_n - a_{n-1}$$

Assim, na PA (5;12;19;26;33) a razão  $r$  pode ser obtida do seguinte modo:

$$\begin{aligned} r &= 12 - 5 = 7 \\ &\text{ou} \\ r &= 19 - 12 = 7 \end{aligned}$$

Vejamos alguns exercícios de fixação sobre este tema



05. Determine o oitavo termo de uma PA onde  $a_5 = 6$  e  $a_{17} = 30$ .

#### Comentário:

De acordo com a fórmula, temos:

$$\begin{aligned} a_{17} &= a_5 + 12r \rightarrow \text{perceba: } (17 - 5) = 12 \\ 30 &= 6 + 12r \\ 12r &= 24 \\ r &= 2 \end{aligned}$$

Assim  $a_8 = a_5 + 3r = 6 + 3(2) = 12$



06. Seja a PA de domínio  $E = \{1;2;3;4\}$  cujo termo geral é  $a_n = 2n - 1$

- a) qual é a razão dessa PA?  
b) quais são os termos dessa PA?

**Comentário:**

O domínio E dado, nada mais é que os possíveis valores de n, para que sejam utilizados na fórmula de recorrência dada. Assim,

a)

Basta encontrar o 2º e 1º termo, e após, fazer a simples subtração para encontrarmos a razão.

$$a_n = 2n - 1 \rightarrow a_1 = 2(1) - 1 \Rightarrow a_1 = 1$$
$$a_n = 2n - 1 \rightarrow a_2 = 2(2) - 1 \Rightarrow a_2 = 3$$

$$\text{Assim: } r = a_2 - a_1 = 3 - 1 = 2$$

b)

Basta neste caso, fazer a substituição de cada elemento do domínio no lugar do n, para que aí posamos encontrar os termos da PA.

$$a_1 = 2(1) - 1 = 1$$
$$a_2 = 2(2) - 1 = 3$$
$$a_3 = 2(3) - 1 = 5$$
$$a_4 = 2(4) - 1 = 7$$

07. Numa PA de termos  $a_3 = 11$  e  $a_7 = 27$ . Determine  $a_1$  e r.

**Comentário:**

$$a_3 = a_1 + 2r \rightarrow 11 = a_1 + 2r$$
$$a_7 = a_1 + 6r \rightarrow 27 = a_1 + 6r$$

Temos então o sistema:



$$\begin{cases} a_1 + 2r = 11 \\ a_1 + 6r = 27 \end{cases} \Rightarrow (a_1 + 2r) + 4r = 27 \rightarrow 11 + 4r = 27 \Rightarrow 4r = 16 \Rightarrow r = 4$$

Resolvendo-o, obtemos

$$\begin{aligned} a_1 &= 3 \\ r &= 4 \end{aligned}$$

---

08. Numa PA de razão  $r = -3$ , o 17º termo é igual a 20% do 1º termo. Escreva os 4 primeiros termos da PA

Comentário

$$a_{17} \text{ é igual a } 20\% \text{ de } a_1, \text{ isto é, } a_{17} = \frac{20}{100} a_1 = \frac{1}{5} a_1 = \frac{a_1}{5}$$

Sabemos que  $a_{17} = a_1 + 16r$

$$\text{Assim: } \frac{a_1}{5} = a_1 + 16(-3)$$

Resolvendo esta equação obtemos  $a_1 = 60$

Assim a PA é: (60;57;54;51;...)

---

09. Interpole 4 meios aritméticos entre -3 e 22

Comentário

Interpolar 4 meios aritméticos entre -3 e 22 significa que devemos achar 4 números que “colocados” entre -3 e 22 deverão formar uma PA, onde o primeiro termo é -3 e o último é 22. Teremos, portanto, um total de 6 termos.

$$a_1 = -3 \quad a_2 = \quad a_3 = \quad a_4 = \quad a_5 = \quad a_6 = 22$$



$$\begin{cases} a_6 = a_1 + 5r \\ 22 = -3 + 5r \\ 5r = 25 \\ r = 5 \end{cases}$$

Portanto, a PA é:  $(-3; 2; 7; 12; 17; 22)$  e os 4 meios são: 2, 7, 12 e 17

Devemos observar que podemos usar a palavra “inserir” no lugar da palavra “interpolar”

---

10. Um capital de R\$ 200,00 foi colocado a juros simples de 3% ao mês. Qual o montante após 47 meses?

Comentário

O montante é a soma do capital com os juros

$$3\% \text{ de } 200 = \frac{3}{100} \cdot 200 = 6$$

Assim, a cada mês o montante é acrescido de R\$ 6,00 e podemos afirmar então que os montantes formam uma PA de razão 6 (em reais). Sendo  $a_1$  o montante após o 1º mês temos:

$a_1 = 200 + 6 = 206$  e portanto, o montante após 47 meses será:

$$a_{47} = a_1 + 46r = 206 + 46(6) = 482$$

Temos, então, que após 47 meses, o montante será igual a R\$ 482,00

---

11. Sabendo que os números 12, 32 e 40 são termos de uma PA crescente, determine os possíveis valores de razão  $r$ .

Comentário

$(\dots; 12; \dots; 32; \dots; 40; \dots)$



Podemos escrever:  $\begin{cases} 32 = 12 + xr \\ 40 = 12 = yr \end{cases}$  onde  $x$  e  $y$  são números naturais não nulos (com  $y > x$ )

$$\begin{cases} 32 = 12 + x.r \Leftrightarrow x.r = 20(I) \\ 40 = 12 = y.r \Leftrightarrow y.r = 28(II) \end{cases}$$

Como obviamente  $r \neq 0$ , podemos dividir membro e membro as equações (I) e (II) obtendo:

$$\frac{x}{y} = \frac{20}{28} = \frac{5}{7}$$

Como a fração  $\frac{5}{7}$  é irredutível e os números  $x$  e  $y$  são naturais (não nulos), o menor valor possível para  $x$  é 5 e o menor valor possível para  $y$  é 7. Mas:

$$\frac{x}{y} = \frac{5}{7} = \frac{10}{14} = \frac{15}{21} = \frac{20}{28} = \frac{25}{35} = \dots$$

Isto é, para  $\frac{x}{y} = \frac{5}{7}$  basta que  $x = 5k$  e  $y = 7k$ , onde  $k \in \mathbb{N}$ .

$$\left. \begin{array}{l} x = 5k \\ xr = 20 \end{array} \right\} \rightarrow \text{fazendo a substituição } x = 5k \text{ na segunda equação}$$

$$\text{onde } r = \frac{20}{5k} = \frac{4}{k}$$

Portanto, os valores possíveis para a razão  $r$  são da forma  $r = \frac{4}{k}$ , onde  $k$  é um número natural qualquer não nulo.

---

12. Quantos múltiplos de 7 há entre 12 e 864?

Comentário



Depois de 12, o primeiro múltiplo de 7 é 14. Efetuando a divisão euclidiana de 864 por 7 temos:

$$\begin{array}{r|l} 864 & 7 \\ 16 & 123 \\ 24 & \\ \hline \underline{3} & \end{array} \quad \begin{array}{l} 864 - \underline{3} = 861 \end{array}$$

Portanto, 861 é o último múltiplo de 7 antes de 864. Temos, então, uma PA finita de razão 7, primeiro termo 14 e último termo 861:

$$(14; 21; 28; \dots, 861)$$

$$a_n = a_1 + (n-1)r$$

$$861 = 14 + (n-1)(7)$$

Resolvendo esta equação obtemos  $n = 122$

#### 4 - MÉDIA ARITMÉTICA

Consideremos “n” números  $x_1, x_2, \dots, x_n$ . A média aritmética deles é, por definição, o número  $M_A$ , calculado do seguinte modo:

$$M_A = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

**Ou seja, basta somar todos os números e dividi-los pela quantidade.**

Exemplos:

**a) A média aritmética dos números 4, 5 e 17 é:**



$$m_a = \frac{4+5+17}{3} = \frac{26}{3}$$

b) A média aritmética dos números 7 e -4 é:

$$m_a = \frac{(7) + (-4)}{2} = \frac{3}{2}$$

## 5 - PROPRIEDADES DA MÉDIA ARITMÉTICA NA PA

Sejam a, b e c três termos consecutivos de uma PA de razão r, tal que (...; a; b; c; ...). Assim, temos

$$\begin{cases} b = a + r \\ b = c - r \end{cases}$$

Somando membro a membro estas duas igualdades, temos:

$$2b = a + c$$

$$b = \frac{a+c}{2}$$

**Isto é: dados três termos consecutivos de uma PA, é correto afirmar que o termo central será a média aritmética dos extremos.**

Podemos dizer ainda, de forma mais genérica, que um determinado termo da PA será sempre igual a média aritmética dos termos que o equidistam. Assim, temos:

$$a_n = \frac{a_{n-k} + a_{n+k}}{2}$$



Exemplo:

**Consideremos o seguinte problema:**

**“Determine o valor de  $x$  de modo que  $x - 3$ ,  $3x - 7$  e  $x - 5$  sejam termos consecutivos de uma PA.”**

**Comentário:**

Devemos ter então:  $3x - 7 = \frac{(x-3) + x - 5}{2}$

Resolvendo esta equação obtemos:  $x = \frac{3}{2}$

## 6 - REPRESENTAÇÕES SIMÉTRICAS NA PA

É muito frequente aparecerem problemas de PA com poucos termos. Nestes casos pode ser útil usar representações especiais. Vamos considerar dois casos: número ímpar de termos e número par de termos.

### a) Número ímpar de termos

- Se forem três termos, podemos representá-los por:

$$x - r, x, x + r$$

Onde  $r$  é a razão.

- Se forem cinco termos, podemos representá-los por:

$$x - 2r, x - r, x, x + r, x + 2r$$

### b) Número par de termos

- Se forem quatro termos podemos representá-los por:

$$x - 3y, x - y, x + y, x + 3y$$



Onde a razão é  $r = 2y$

- Se forem 6 termos:

$$x-5y, x-3y, x-y, x+y, x+3y, x+5y$$

Exemplo:

**Determine 3 números em PA tais que sua soma seja 18 e o terceiro a metade do primeiro.**

**Comentário:**

$$\begin{cases} (x-r) + (x) + (x+r) = 18 \\ x+r = \frac{x-r}{2} \end{cases}$$

$$(x-r) + x + (x+r) = 18$$

$$3x = 18$$

$$x = 6$$

$$x+r = \frac{x-r}{2}$$

$$6+r = \frac{6-r}{2}$$

$$r = -2$$

A PA é então (8; 6; 4)



PRESTE MAIS  
**ATENÇÃO!!**



Observe que a utilização das representações especiais (simétricas) é particularmente interessante, quando se conhece a soma dos termos da PA.

## 7 - SOMA DE "N" TERMOS CONSECUTIVOS DE UMA PA

Para encontrarmos a soma dos  $n$  termos consecutivos de uma PA, devemos calcular a média aritmética dos termos extremos da PA (o primeiro e o último) e multiplicar pela quantidade de termos da PA:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

Exemplo:

Dada uma PA onde o primeiro termo vale 14, o último vale 56 e a quantidade de termos é igual 7. Qual a soma dos termos dessa PA?

**Comentário:**

Utilizando a fórmula da soma de PA, temos:

$$a_1 = 14$$

$$a_n = 56$$

$$n = 7$$

$$\text{Assim: } S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2} \Rightarrow S_n = \frac{(14 + 56) \cdot 7}{2} = \frac{70 \cdot 7}{2} = 35 \cdot 7 = 245$$

## 4 - PROGRESSÕES GEOMÉTRICAS

### 1 - DEFINIÇÃO

Chamamos de Progressão Aritmética (PG) qualquer sequência onde cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado por uma constante denominada razão da progressão.



Em outras palavras, uma progressão geométrica de razão  $q$  é uma sequência tal que:

$$a_n = a_{n-1} \cdot q, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Esta constante, geralmente representada por  $q$ , é chamado de razão da PG.

Podemos dizer, então, que os números 2, 4, 8, 16 e 32 formam uma PG com 5 elementos em que  $a_1 = 2$ ,  $a_2 = 4$ ,  $a_3 = 8$ ,  $a_4 = 16$  e  $a_5 = 32$ , e a razão  $q$  desta PG é igual a 2.

Vejamos:

$$a_1 = 2$$

$$a_2 = a_1 \times q = 2 \times 2 = 4$$

$$a_3 = a_2 \times q = 4 \times 2 = 8$$

$$a_4 = a_3 \times q = 8 \times 2 = 16$$

$$a_5 = a_4 \times q = 16 \times 2 = 32$$

## 2 - CLASSIFICAÇÕES DA PG

Consideremos a sequência  $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 \dots a_{n-1}, a_n)$ , dizemos que esta PG possui 5 classificações, a saber:

- **Crescente:**  $q > 1$  e  $a_1 > 0$  ou  $0 < q < 1$  e  $a_1 < 0$

Exemplo: (1, 2, 4, 8, ...)

- **Decrescente:**  $q > 1$  e  $a_1 < 0$  ou  $0 < q < 1$  e  $a_1 > 0$

Exemplo: (-1, -2, -4, -8, ...) e  $\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots\right)$

- **Alternante:**  $q < 0$  e  $a_1 \neq 0$

Exemplo: (1, -2, 4, -8, ...)

- **Constante:**  $q = 1$  ou  $a_1 = 0$  e  $q$  qualquer.



Exemplo:  $(2, 2, 2, 2, \dots)$  e  $(0, 0, 0, 0, \dots)$

- **Estacionária:**  $a_1 \neq 0$  e  $q = 0$

Exemplo:  $(5, 0, 0, 0, \dots)$

Exemplo:

Calcule a razão de uma progressão geométrica decrescente de cinco termos, sendo o 1º termo igual a  $\frac{2}{3}$  e o último igual a  $\frac{2}{243}$ .

**Comentário:**

Como  $a_5 = a_1 \cdot q^4$ , temos que  $\frac{2}{243} = \frac{2}{3} \cdot q^4 \Rightarrow q^4 = \frac{1}{81}$ . Como a PG é decrescente e o primeiro termo é positivo, a razão deve estar entre 0 e 1, o que nos dá  $q = \frac{1}{3}$ .

### 3 - TERMO GERAL DA PG

É sabido que cada termo da PG pode ser escrito em função do seu antecessor e da razão. A partir deste conceito, considere uma PG de razão  $r$  da forma  $(a_1; a_2; a_3; \dots; a_n; \dots)$ . Observe abaixo a escrita de cada termo seguinte a ideia que acabamos de falar.

$$\begin{cases} a_2 = a_1 \cdot q \\ a_3 = a_2 \cdot q \\ \dots \\ a_{n-1} = a_{n-2} \cdot q \\ a_n = a_{n-1} \cdot q \end{cases}$$

Veja que temos  $n - 1$  equações e ao multiplicarmos todas elas, ocorrem vários cancelamentos, o que nos dá:

Logo, o termo geral é:



$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

#### 4 - RAZÃO DA PG

O quociente entre um termo qualquer (a partir do segundo) e seu antecessor é igual à razão da PG. Desta forma temos:

$$q = \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

É importante ressaltar que a razão da PG pode ser positiva, negativa, nula, racional, irracional etc. Em tese, para cada valor desse, a PG sofre um classificação diferente, como vimos anteriormente.

#### 5 - PROPRIEDADES DA MÉDIA GEOMÉTRICA NA PG

Se  $a$ ,  $b$  e  $c$  são três termos consecutivos de uma progressão geométrica, então  $\frac{b}{a} = \frac{c}{b}$  e

então obtemos:

$$b^2 = ac$$

Também é verdade que um termo de uma progressão geométrica é a média geométrica de dois termos que dele equidistam.

$$(a_n)^2 = a_{n+p} \cdot a_{n-p}$$

De fato, temos  $a_{n+p} = a_n \cdot q^p$ ,  $a_{n-p} = a_n \cdot q^{-p}$  e multiplicando as duas igualdades, obtemos o desejado.

Exemplo:

**Uma progressão aritmética e uma progressão geométrica têm, ambas, o primeiro termo igual a 4, sendo que os seus terceiros termos são estritamente positivos e coincidem. Sabe-se ainda que o segundo termo da progressão aritmética excede o segundo termo da progressão geométrica em 2. Então, o terceiro termo das progressões é:**



- a) 10
- b) 12
- c) 14
- d) 16
- e) 18

Comentário:

Sejam  $(4, x + 2, y)$  a P.A e  $(4, x, y)$  a P.G. Temos então:

$$\begin{cases} 2(x+2) = 4 + y \\ x^2 = 4y \end{cases}$$

Pela primeira equação,  $y = 2x$  e substituindo na segunda, ficamos com  $x^2 = 8x$ . Como os terceiros termos são positivos,  $x$  não pode ser 0, e então  $x = 8$ , o que nos dá  $y = 16$ .

Resposta: D

## 6 - REPRESENTAÇÕES SIMÉTRICAS NA PG

Para progressões geométricas, podemos fazer uma representação análoga à que fizemos para progressões aritméticas. Entretanto, estas representações para PG's costumam ser úteis apenas quando nos é fornecido o produto dos termos. Para 4 termos, a representação não costuma ser útil.

3 termos:  $\left(\frac{x}{q}, x, x.q\right)$

**Em muitos problemas, o melhor a se fazer é trabalhar com a definição, por exemplo, em uma PG de 3 termos, trabalharmos com  $(x, xq, xq^2)$ .**





## 7 - SOMA DOS TERMOS CONSECUTIVOS DE UMA PG FINITA

Estamos interessados agora em calcular a soma dos  $n$  primeiros termos de uma progressão geométrica:  $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ . Podemos reescrever esta soma em função do primeiro termo e da razão, obtendo  $S_n = a_1 + a_1 \cdot q + a_1 \cdot q^2 + \dots + a_1 \cdot q^{n-1}$ .

Para  $q = 1$ , a soma é simplesmente  $n \cdot a_1$ , pois teremos uma PG constante.

Para  $q \neq 1$ , multiplicaremos  $S_n$  por  $q$  (esta ideia é bastante útil):

$$S_n = a_1 + a_1 \cdot q + a_1 \cdot q^2 + \dots + a_1 \cdot q^{n-1}$$

$$S_n \cdot q = a_1 \cdot q + a_1 \cdot q^2 + a_1 \cdot q^3 + \dots + a_1 \cdot q^n$$

Subtraindo as duas igualdades, obtemos:

$$S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}, \quad q \neq 1$$

## 8 - PRODUTO DOS TERMOS CONSECUTIVOS DE UMA PG FINITA

Podemos também calcular o produto dos  $n$  primeiros termos de uma progressão geométrica:

$P_n = a_1 a_2 \dots a_n$ . Há duas maneiras de lidarmos com este produto:

### I) Pelo termo geral:

Temos  $a_2 = a_1 q$ ,  $a_3 = a_1 q^2$ , ...,  $a_n = a_1 q^{n-1}$  e então  $P_n = a_1^n \cdot q^{1+2+\dots+n-1}$ . Usando a fórmula da soma dos termos de uma PA, obtemos

$$P_n = a_1^n \cdot q^{\frac{n(n-1)}{2}}$$



## II) Explorando a simetria:

Para a PG, temos uma propriedade similar à que temos em PA:  $a_1 a_n = a_2 a_{n-1} = \dots = a_n a_1$ . desta maneira, podemos escrever utilizando o truque de Gauss:

$$P_n = a_1 a_2 \dots a_n$$

$$P_n = a_n a_{n-1} \dots a_1$$

Multiplicando as duas igualdades, obtemos:

$$P_n^2 = (a_1 a_n)^n$$

**Observação:** A primeira relação obtida é mais utilizada que a segunda, pois na segunda, a presença do termo  $P_n^2$  requer atenção com o sinal na hora de extrair possivelmente uma raiz quadrada.

## 9 - SOMA DOS TERMOS DE UMA PG INFINITA

**Teorema:** Se  $(a_1, a_2, \dots)$  é uma progressão geométrica infinita com razão  $q$ , tal que  $|q| < 1$ , temos que:

$$S_\infty = a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots = \frac{a_1}{1-q}$$

## 10 - INTERPOLAÇÃO GEOMÉTRICA

Interpolar  $k$  meios geométricos entre os números  $a$  e  $b$  significa obter uma PG de extremos  $a_1 = a$  e  $a_n = b$ , com  $n = k + 2$  termos. Ou seja, queremos neste caso, inserir determinados números entre outros dois que, por sua natureza, irão formar um PG.



Para determinar os meios dessa PG é necessário calcular a razão. Assim, temos:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1} \Rightarrow b = a \cdot q^{k+1} \Rightarrow q = \sqrt[k+1]{\frac{b}{a}}$$

Exemplo:

**Interpolar 8 meios geométricos (reais) entre 5 e 2560.**

**Comentário:**

Formemos uma PG com 10 termos, já que queremos inserir 8 entre outros dois já existentes, em que  $a_1 = 5$  e  $a_{10} = 2560$ . Temos:

$$a_{10} = a_1 \cdot q^9 \Rightarrow q = \sqrt[9]{\frac{a_{10}}{a_1}} = \sqrt[9]{\frac{2560}{5}} = \sqrt{512} = 2$$

Então: a PG é (5, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560)

Ufa...quanta coisa, não guerreiro??!!

Tenho certeza que o tema desta aula será objeto de prova sua. Assim, solicito que pratique bastante.

Caso persista alguma dúvida, por não ser tão simples o conteúdo, pode entrar em contato!!

Passamos agora aos exercícios comentados de provas anteriores! Vamos nessa?



13. Os três termos de uma sequência são proporcionais aos números 3, 5 e 9. Somando 4 ao termo do meio, a nova sequência é uma PA. Determine a sequência inicial.



### Comentário:

Seja  $(x; y; z)$  a sequência;  $x, y$  e  $z$  são proporcionais aos números 3, 5 e 9, isto é

$$\frac{x}{3} = \frac{y}{5} = \frac{z}{9} = k$$

$$\text{E portanto } \begin{cases} x = 3k \\ y = 5k \\ z = 9k \end{cases}$$

Podemos, então, representar a sequência por:

$$(3k; 5k; 9k)$$

Somando 4 ao termo do meio, a nova sequência é:

$$(3k; 5k + 4; 9k)$$

Seja ela uma PA, temos:

$$5k + 4 = \frac{3k + 9k}{2}$$

Resolvendo esta equação, obtemos  $k = 4$  e, portanto:  $x = 12$ ,  $y = 20$  e  $z = 36$ .

A sequência original é assim:  $(12; 20; 36)$

---

14. Determine uma PA de três termos cuja soma é 9 e cujo produto é igual a 15.

### Comentário:

$$(x - r) + (x) + (x + r) = 9$$

$$3x = 9$$

$$x = 3$$

$$(x - r)(x)(x + r) = 15$$

$$(3 - r)(3)(3 + r) = 15$$

$$r^2 = 4$$

$$r = \pm 2$$



$$\text{Para } r = 2 \begin{cases} x - r = 1 \\ x = 3 \text{ e } a \text{ PA } \acute{e} (1; 3; 5) \\ x + r = 5 \end{cases}$$

$$\text{Para } r = -2 \begin{cases} x - r = 5 \\ x = 3 \text{ e } a \text{ PA } \acute{e} (5; 3; 1) \\ x + r = 1 \end{cases}$$

---

15. (EEAr) As seqüências  $(x; 3; y)$ , e  $(y; \sqrt{5}; x)$ , são, respectivamente, progressões aritmética e geométrica. Se a progressão aritmética é crescente, a razão da progressão geométrica é:

- a)  $\frac{\sqrt{5}}{5}$
- b)  $\frac{2\sqrt{5}}{5}$
- c)  $\sqrt{5}$
- d)  $2\sqrt{5}$

**Comentário:**

$$\left. \begin{array}{l} (x; 3; y) \quad (y; \sqrt{5}; x) \\ PA \Rightarrow 3 = \frac{x+y}{2} \Rightarrow x+y = 6 \\ PG \Rightarrow \sqrt{5} = \sqrt{x \cdot y} \Rightarrow x \cdot y = 5 \end{array} \right\}$$

Logo,  $x = 1$  e  $y = 5$

Assim:  $\frac{\sqrt{5}}{5} \rightarrow$  Razão



**Gabarito: A**

---

16. (EEAr) Sejam  $a$ ;  $b$  e  $c$  termos consecutivos de uma PG, todos positivos. Se  $a < b < c$  e  $a = m-1$ ,  $b = m+5$  e  $c = 11m-1$ , então o valor de  $a + b + c$  é:

- a) 40
- b) 42
- c) 44
- d) 46

**Comentário:**

PG:

$$(m+5) = \sqrt{(m-1)(11m-1)}$$

$$(m+5)^2 = (m-1)(11m-1)$$

$$m^2 + 10m + 25 = 11m^2 - 3 - 11m + 1$$

$$10m^2 - 22m - 24 = 0$$

$$5m^2 - 11m - 12 = 0$$

$$\frac{11 \pm \sqrt{121 + 240}}{10}$$

$$x_1 = \frac{11 + \sqrt{361}}{10} = \frac{11 + 19}{10} = 3$$

$$x_2 = \frac{11 - \sqrt{361}}{10} = \frac{11 - 19}{10} = \frac{-9}{10}$$

$$a = m - 1 \rightarrow 3 - 1 = 2$$

$$b = m + 5 \rightarrow 3 + 5 = 8$$

$$c = 11m - 1 \rightarrow 11 \cdot 3 - 1 = 32$$

$$S = 42$$

**Gabarito: B**

---



17. (EEAr) O valor de mercado de um automóvel é alterado a cada mês com um acréscimo de 1% em relação ao mês anterior. A sequência de valores do automóvel, a cada mês, forma uma progressão:

- a) aritmética de razão 0,1.
- b) aritmética de razão 0,01.
- c) geométrica de razão 1,1.
- d) geométrica de razão 1,01.

**Comentário:**

$$a_1 = x$$

$$a_2 = x = \frac{x}{100} = \frac{101x}{100} = 1,01x$$

$$PG: \frac{a_2}{a_1} = \frac{1,01x}{x} = 1,01 \Rightarrow \text{valor da razão PG}$$

$$PA: 1,01x - x = 0,01x \Rightarrow \text{valor da razão PA}$$

Como no enunciado o 1% é em relação ao ano anterior, temos aí uma operação de multiplicação, que nos remete a uma PG. Logo, será uma PG de razão 1,01.

**Gabarito: D**

---

18. (EEAr) Na sequência (1; 1; 2; 3; ...), onde  $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$ , o nono termo é:

- a) 34
- b) 21
- c) 43
- d) 28

**Comentário:**



1 1 2 3 5 8 13 21 34 55

A sequência acima é a simples aplicação da Sequência de Fibonacci, no qual o próximo termo a partir do terceiro é sempre igual à soma dos dois anteriores.

**Gabarito: A**

---

19. (EEAr) Numa progressão geométrica de 6 termos positivos, a soma de  $a_2$  e  $a_4$  é 6, e a soma de  $a_4$  e  $a_6$  é 12. A razão dessa P.G. é

- a) 2
- b)  $\sqrt{2}$
- c)  $-\sqrt{2}$
- d) -2

**Comentário:**

$$a_2 + a_4 = 6 \Rightarrow a_4 \left( \frac{1}{q^2} + 1 \right) = 6$$

$$a_4 + a_6 = 12 \Rightarrow a_4 (1 + q^2) = 12$$

$$a_1 = a_1$$

$$a_2 = a_1 \cdot q$$

$$a_3 = a_1 \cdot q^2$$

$$a_4 = a_1 \cdot q^3$$

$$a_6 = a_1 \cdot q^5$$

Substituindo:

$$a_1 \cdot q + a_1 \cdot q^3 = 6$$

$$a_1 \cdot q^3 + a_1 \cdot q^5 = 12 \rightarrow q^2 (a_1 \cdot q + a_1 \cdot q^3) = 12 \rightarrow q^2 \cdot 6 = 12 \Rightarrow q^2 = 2 \rightarrow q = \sqrt{2}$$

**Gabarito: B**

---



20. (EEAr) Numa progressão aritmética, o primeiro termo é  $10x - 9y$ , o último termo é  $y$ , e a razão é  $y - x$ . Sendo  $x \neq y$ , o número de termos dessa P.A. é

- a) 8
- b) 9
- c) 10
- d) 11

**Comentário:**

$$a_1 = 10x - 9y$$

$$a_n = y$$

$$r = y - x$$

$$y = 10x - 9y + (n - 1)(y - x)$$

$$-10x + 10y = (n - 1)(y - x)$$

$$10(y - x) = (n - 1)(y - x)$$

$$n = 11$$

**Gabarito: D**

---

21. (EEAr) Tanto numa P.A. quanto numa P.G., os números 3 e 243 são, respectivamente, a razão e o 6º termo. O produto do 1º termo da P.G. pelo 3º termo da P.A. é

- a) 702
- b) 693
- c) 234
- d) 231

**Comentário:**



$$r = 3$$

$$q = 3$$

$$a_6 = 243$$

$$a_6 = a_3 + (6 - 3) \cdot r$$

$$243 = a_3 + 3 \cdot 3$$

$$a_3 = 234$$

$$a_6 = a_1 \cdot q^5$$

$$243 = a_1 \cdot 3^5$$

$$a_1 = 1$$

Logo, o produto fica;  $234 \cdot 1 = 234$ .

**Gabarito: C**

---

22. (EEAr) Sabe-se que a sequência  $(x; y; 10)$  é uma P.A. e a sequência  $\left(\frac{1}{y}, 2, 3x + 4\right)$  é uma P.G.

Nessas condições, é correto afirmar que:

- a) a razão da P.A. é 2.
- b) a razão da P.G. é 26.
- c)  $x + y = 0$ .
- d)  $x \cdot y = -16$ .

**Comentário:**



$$PA: (x; y; 10)$$

$$PG: \left(\frac{1}{y}; 2; 3x + 4\right)$$

$$2y = x + 10 \rightarrow PA \text{ de } 3 \text{ termos}$$

$$4 = \left(\frac{3x + 4}{y}\right) \rightarrow PG \text{ de } 3 \text{ termos}$$

$$4y = 3x + 4 \rightarrow \text{sabemos que: } 4y = 2(2y) \text{ ; sendo } 2y = x + 10$$

$$2x + 20 = 3x + 4$$

$$x = 16$$

$$2y = 26$$

$$y = 13$$

Fazendo as devidas substituições de variáveis, podemos perceber que a letra B é VERDADEIRA.

#### Gabarito: B

---

23. (EEAr) Se em uma P.G. de três termos reais o produto e a soma dos termos são, respectivamente, 216 e 26, então a soma dos dois primeiros termos dessa P.G., quando decrescente, é

- a) 24
- b) 20
- c) 18
- d) 8

#### Comentário:



$$x \cdot y \cdot z = 216 \rightarrow y^2 = x \cdot y$$

$$x + y + z = 26$$

$$y^3 = 216$$

$$y = \sqrt[3]{216}$$

$$y = 6$$

Logo :

$$x + 6 + z = 26$$

$$\begin{cases} x + z = 20 \rightarrow x = 2 \\ x \cdot z = 36 \rightarrow z = 18 \end{cases}$$

Logo a PG é do tipo (18; 6; 2), pois deve ser decrescente. Assim, a soma dos dois primeiros resulta um valor igual a 24.

**Gabarito: A**

---

24. (EEAr) Se  $(x+3; 2x-1; x+5)$  é uma P.A., então a soma dos três termos dessa P.A. é

- a) -13
- b) 15
- c) 19
- d) 27

**Comentário:**

$$2x - 1 = \frac{(x + 3) + (x + 5)}{2}$$

$$4x - 2 = x + 3 + x + 5$$

$$4x - 2x = 8 + 2$$

$$2x = 10$$

$$x = 5$$

Logo a PA é do tipo (8; 9; 10), bastando apenas fazer a substituição de x pelo 5.

**Gabarito: D**

---



25. (EEAr) A soma dos vinte primeiros termos da PA cujo termo geral tem para expressão  $a_n = 3n + 5$  é

- a) 657
- b) 730
- c) 803
- d) 1460

**Comentário:**

$$a_1 = 3.1 + 5 \rightarrow \text{fazendo } n = 1$$

$$a_1 = 8$$

$$a_{20} = 3.20 + 5 \rightarrow \text{fazendo } n = 20$$

$$a_{20} = 65$$

$$\frac{(65 + 8).20}{2} = 730 \rightarrow \text{utilizando Soma de PA.}$$

**Gabarito: B**

---

26. (EEAr) Ao se efetuar a soma de 50 primeiras parcelas da P.A.  $202 + 206 + 210 + \dots$ , por distração, não foi somada a 35ª parcela. A soma encontrada foi

- a) 11050
- b) 14550
- c) 14662
- d) 24450

**Comentário:**



$$a_1 = 202$$

$$a_2 = 206$$

$$r = 202 - 206$$

$$r = 4$$

$$a_{35} = 202 + (35 - 1) \cdot 4$$

$$a_{35} = 202 + 34 \cdot 4$$

$$a_{35} = 202 + 136$$

$$a_{35} = 338$$

*Assim*

$$a_{50} = 202 + 49 \cdot 4$$

$$a_{50} = 398$$

$$S = \frac{(202 + 398) \cdot 50}{2}$$

$$S = \frac{600 \cdot 50}{2} \Rightarrow S = 15000$$

$$\text{Logo: } 15000 - 238 = 14662$$

Resumindo a conta: encontrei o termo de posição 35, após, fiz a subtração da soma que deveria ser feita dos 50 termos pelo termo esquecido! Ressalto que foi utilizada a fórmula do Termo Geral e a de Soma de PA.

**Gabarito: C**

---

27. (EEAr) A solução da equação  $1 + x + x^2 + x^3 + x^4 = \dots = 2$  é

a)  $\frac{3}{2}$

b)  $\frac{1}{2}$

c) -1

d) indeterminada



**Comentário:**

Trata-se de uma soma de PG INFINITA.

$$1 + x + x^2 + x^3 + \dots = 2$$
$$S = \frac{a_1}{1-q} \Rightarrow S = \frac{1}{1-x} = 2$$

$$1 = 2 - 2x$$

$$2x = 1$$

$$x = \frac{1}{2}$$

**Gabarito: B**

---

28. (EEAr) O termo geral de uma PA é  $a_n = 3n - 16$ . A soma de seus 10 primeiros termos é

- a) 18
- b) 14
- c) 5
- d) -6

**Comentário:**

$$a_n = 3n - 16$$

$$a_1 = 3 \cdot 1 - 16$$

$$a_1 = -13$$

$$a_{10} = 3 \cdot 10 - 16$$

$$a_{10} = 14$$

$$a_2 = 3 \cdot 2 - 16$$

$$a_2 = -10$$

*Logo*

$$r = 3$$

$$S = \frac{(-13 + 14) \cdot 10}{2} = 5$$

**Gabarito: C**

---



29. (EEAr) Uma P.G. de razão  $\sqrt{3}$ , tem cinco termos. Se o último termo é  $9\sqrt{3}$ , então o primeiro é
- a)  $\sqrt{3}$
  - b)  $5\sqrt{3}$
  - c) 3
  - d)  $\frac{1}{3}$

**Comentário:**

$$\begin{aligned}q &= 3 \\ a_1 \quad a_2 \quad a_3 \quad a_4 \quad a_5 \\ a_5 &= a_1 \cdot q^4 = 9\sqrt{3} \rightarrow a_1 \cdot (\sqrt{3})^4 = 9\sqrt{3} \rightarrow a_1 \cdot 3^2 = 3^2 \cdot \sqrt{3} \Rightarrow \\ &\Rightarrow a_1 = \sqrt{3}\end{aligned}$$

**Gabarito: A**

---

30 (EEAr) Na PG  $(y, 2y + 2, 3y + 3, \dots)$ , o 4º termo, que é diferente de zero, vale:

- a) 2
- b)  $\frac{3}{2}$
- c) -4
- d)  $\frac{-27}{2}$

**Comentário:**

$(y; 2y + 2; 3y + 3; \dots) \rightarrow$  temos os 3 primeiros termos.

$(2y + 2)^2 = y \cdot (3y + 3) \rightarrow$  usando termo médio.

$$4y^2 + 8y + 4 = 3y^2 + 3y$$

$y^2 + 5y + 4 = 0 \rightarrow$  equação 2º grau.

$$y = -4; y = -1 \Rightarrow \text{realizando soma e produto.}$$

Logo

$$\left(-4; -6; -9; \frac{-27}{2}\right)$$



**Gabarito: D**

---

31. (EEAr) Numa P.A., o 10º termo e a soma dos 30 primeiros termos valem, respectivamente, 26 e 1440. A razão dessa progressão é

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 6

**Comentário:**

$$a_{10} = 26$$

$$S_{30} = 1440$$

$$a_{10} = a_1 + 9r = 26$$

$$a_{30} = a_1 + 29r$$

$$\frac{(a_1 + a_1 + 29r) \cdot 30}{2} = 1440$$

$$2a_1 + 29r = 96$$

$$a_1 + 9r = 26(-2)$$

$$11r = 44$$

$$r = 4$$

**Gabarito: C**

---

32. (EEAr) A soma dos infinitos termos da P.G.  $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \dots\right)$  é

- a)  $\frac{3}{2}$
- b)  $\frac{2}{3}$
- c)  $\frac{2\sqrt{3}}{3}$



d)  $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

**Comentário:**

$$S = \frac{a_1}{1-q} \Rightarrow \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{1-\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{3}{1} \Rightarrow \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

**Gabarito: D**

---

33. (EEAr) Inscrevendo-se nove meios aritméticos entre 15 e 45, obtém-se uma PA cujo sexto termo é

- a) 25
- b) 30
- c) 33
- d) 42

**Comentário:**

15;.....;45  $\rightarrow$  11 termos

$$a_{11} = a_1 + (n-1).r$$

$$45 = 15 + 10r$$

$$30 = 10r$$

$$r = 3$$

$$a_6 = a_1 + 5.r$$

$$a_6 = 15 + 15$$

$$a_6 = 30$$

**Gabarito: B**

---

34. (EEAr) Se a sequência  $(x; 3x + 2; 10x + 12)$  é uma PG de termos não nulos, então  $x^2$  é

- a) 1
- b) 4



- c) 9
- d) 16

**Comentário:**

$$\begin{aligned}(x; 3x + 2; 10x + 12) \\ (3x + 2)^2 &= x \cdot (10x + 12) \\ 9x^2 + 12x + 4 &= 10x^2 + 12x \\ x^2 &= 4\end{aligned}$$

**Gabarito: B**

---

35. (EEAr) Na PA decrescente (18; 15; 12; 9; ...), o termo igual a -51 ocupa a posição
- a) 30
  - b) 26
  - c) 24
  - d) 18

**Comentário:**

$$\begin{aligned}(18; 15; 12; 9; \dots) \\ r &= -3 \\ \\ a_n &= 18 + (n - 1) \cdot r \\ -51 &= 18 + (n - 1) \cdot (-3) \\ -69 &= (n - 1) \cdot (-3) \\ 23 &= n - 1 \\ n &= 24\end{aligned}$$

**Gabarito: C**

---

36. (EEAr) Em uma PA cuja razão é igual ao seu primeiro termo, tem-se  $a_3 + a_7 = 5$ . Assim, a razão dessa PA é
- a) 0,5
  - b) 2,5
  - c) 2



d) 1

**Comentário:**

$$r = a_1$$

$$a_3 = a_1 + 2r \rightarrow 3r$$

$$a_7 = a_1 + 6r \rightarrow 7r$$

$$10r = 5$$

$$r = \frac{1}{2}$$

**Gabarito: A**

---

37 (EEAr) Considere esses quatro valores  $x, y, 3x, 2y$  em PA crescente. Se a soma dos extremos é 20, então o terceiro termo é

a) 9

b) 12

c) 15

d) 18

**Comentário:**

$$x \quad y \quad 3x \quad 2y$$

$$2y = x + 3x$$

$$y = 2x \rightarrow \text{relação entre } x \text{ e } y.$$

$$x + 2y = x + 4x = 20 \rightarrow 5x = 20 \Rightarrow x = 4$$

$$x = 4$$

$$y = 2x = 2 \cdot 4 = 8$$

$$\text{Assim, } 3x = 3 \cdot 4 = 12$$

**Gabarito: B**

---

38 (ESA) O valor de  $x$  tal que  $3^4 \cdot 3^5 \cdot 3^6 \cdot \dots \cdot 3^x = 3^{30}$  é:

a) 6



- b) 7
- c) 8
- d) 12
- e) 13

**Comentário:**

$$3^4 \cdot 3^5 \cdot 3^6 \cdot \dots \cdot 3^x = 3^{30}$$
$$(4 + 5 + 6 + \dots + x) = 30$$
$$\frac{(x+4) \cdot (x-3)}{2} = 30$$

$$x^2 + x - 12 = 60$$
$$x^2 + x - 72 = 0$$
$$x = -9$$
$$x = 8$$

**Gabarito: C**

---

39 (ESA). Numa progressão aritmética (PA) de nove termos, a soma dos dois primeiros termos é igual a 20 e a soma do sétimo e oitavo termos é 140. A soma de todos os termos desta PA é:

- a)  $S_n = 320$
- b)  $S_n = 405$
- c)  $S_n = 395$
- d)  $S_n = 435$
- e)  $S_n = 370$

**Comentário:**



$$a_1 + a_2 = 20$$
$$a_7 + a_8 = 140$$

$$a_1 + a_1 + r = 20$$
$$\begin{cases} 2a_1 + r = 20 \\ 2a_1 + 13r = 140 \end{cases}$$
$$\underline{12r = 120 \rightarrow r = 10}$$

$$2a_1 + 10 = 20$$
$$2a_1 = 10$$
$$a_1 = 5$$

$$a_9 = 5 + 8 \cdot 10$$
$$a_9 = 85$$

$$\frac{(a_1 + a_9) \cdot 9}{2} \Rightarrow \frac{90 \cdot 9}{2} = \frac{810}{2} = 405$$

**Gabarito: B**

---

40 (ESA). Em uma progressão aritmética, o primeiro termo é 5 e o décimo primeiro termo é 45. Pode-se afirmar que o sexto termo é igual a

- a) 15
- b) 21
- c) 25
- d) 29
- e) 35

**Comentário:**

$$a_1 = 5$$
$$a_{11} = 45$$
$$a_6 = ?$$

$$a_{11} = a_1 + 10r$$
$$45 - 5 = 10r$$
$$r = 4$$

$$a_6 = 5 + 5 \cdot 4$$
$$a_6 = 25$$

**Gabarito: C**

---



41 (ESA). Encontre o valor numérico da expressão  $E = 11^7 + 11^7 + 11^7 + 11^7 + 11^7 + 11^7 + 11^7 + 11^7 + 11^7 + 11^7$ .

- a)  $11^8$
- b)  $11^{14}$
- c)  $11^{77}$
- d)  $121^7$
- e)  $121^{77}$

**Comentário:**

$$\frac{(11^7 + 11^7) \cdot 11}{2} \Rightarrow \frac{2 \cdot 11^7 \cdot 11}{2} = 11^8$$

**Gabarito: A**

---

42 (ESA). Em um treinamento de condicionamento físico, um soldado inicia seu primeiro dia correndo 800m. No dia seguinte corre 850m. No terceiro 900m e assim sucessivamente até atingir a meta diária de 2200m. Ao final de quantos dias, ele terá alcançado a meta?

- a) 31
- b) 29
- c) 27
- d) 25
- e) 23

**Comentário:**

$$\begin{aligned} a_1 &= 800 \\ a_2 &= 850 \\ a_n &= 2200 \end{aligned}$$



$$2200 = 800 + (n-1).50$$

$$\frac{1400}{50} = n - 1$$

$$28 + 1 = n = 29$$

### Gabarito: B

---

43 (ESA). Em uma Progressão Aritmética com 6 termos, temos que a soma de seus termos é igual a 102 e seu último termo é 27. Com base nessas informações, a razão dessa progressão é:

- a) 3
- b) 5
- c) 11
- d) 4
- e) 7

### Comentário:

$$a_6 = 27$$

$$S_6 = 102$$

$$\frac{(a_1 + 27).6}{2} = 102$$

$$a_1 = 34 - 27$$

$$a_1 = 7$$

$$a_6 = a_1 + 5r$$

$$27 - 7 = 5r$$

$$r = 4$$

### Gabarito: D

---

44 (ESA). Em uma progressão aritmética cujo primeiro termo é 1, 87 e a razão é 0, 004, temos que a soma dos seus dez primeiros é igual a:



- a) 18,88
- b) 9,5644
- c) 9,5674
- d) 18,9
- e) 18,99

**Comentário:**

$$a_1 = 1,87$$
$$r = 0,004$$

$$a_{10} = a_1 + 9r$$
$$a_{10} = 1,87 + 9 \cdot (0,004)$$
$$a_{10} = 1,870 + 0,036$$
$$a_{10} = 1,906$$

$$\frac{(1,906 + 1,870) \cdot 10}{2}$$

$$S = 18,88$$

**Gabarito: A**

---

45 (ESA). Em uma Progressão Aritmética, o décimo termo vale 16 e o nono termo é 6 unidades maior do que o quinto termo. Logo, o décimo segundo termo vale:

- a) 16, 5
- b) 17, 0
- c) 19, 0
- d) 19, 5
- e) 17, 5

**Comentário:**



$$a_{10} = 16$$

$$a_9 = a_5 + a_6$$

$$a_5 + 4r = a_5 + a_6$$

$$r = \frac{3}{2}$$

$$a_{12} = a_{10} + 2r$$

$$a_{12} = 16 + 2 \cdot \frac{3}{2}$$

$$a_{12} = 19$$

**Gabarito: C**

## 5 - LISTA DE QUESTÕES



1. Escreva os 4 primeiros termos das sequências infinitas dadas por:

a)  $a_n = \frac{n}{n+1}$

b)  $a_n = (-1)^n$

02. Escreva os 5 primeiros termos das sequências infinitas por:

a)

$$\begin{cases} a_1 = 4 \\ a_n = a_{n-1} + 2n \quad (n \geq 2) \end{cases}$$



b)

$$\begin{cases} a_1 = -3 \\ a_n = 2a_{n-1} + 4 \quad (n \geq 2) \end{cases}$$

---

03. Seja a sequência infinita cujo termo geral é

$$a_n = 3n - 4$$

Determine:

a)  $a_6$

b)  $a_{k+1}$

---

04. Dê os termos gerais das seguintes sequências:

a) (2; 4; 6; 8; 10; 12; ...)

b) (2; 4; 8; 16; 32; 64; ...)

---

05. Determine o oitavo termo de uma PA onde  $a_5 = 6$  e  $a_{17} = 30$ .

---

06. Seja a PA de domínio  $E = \{1; 2; 3; 4\}$  cujo termo geral é  $a_n = 2n - 1$

a) qual é a razão dessa PA?

b) quais são os termos dessa PA?

---

07. Numa PA de termos  $a_3 = 11$  e  $a_7 = 27$ . Determine  $a_1$  e  $r$ .



---

08. Numa PA de razão  $r = -3$ , o 17º termo é igual a 20% do 1º termo. Escreva os 4 primeiros termos da PA

---

09. Interpole 4 meios aritméticos entre -3 e 22

---

10. Um capital de R\$ 200,00 foi colocado a juros simples de 3% ao mês. Qual o montante após 47 meses?

---

11. Sabendo que os números 12, 32 e 40 são termos de uma PA crescente, determine os possíveis valores de razão  $r$ .

---

12. Quantos múltiplos de 7 há entre 12 e 864?

---

13. Os três termos de uma sequência são proporcionais aos números 3, 5 e 9. Somando 4 ao termo do meio, a nova sequência é uma PA. Determine a sequência inicial.

---

14. Determine uma PA de três termos cuja soma é 9 e cujo produto é igual a 15.

---

15. (EEAr) As sequências  $(x; 3; y)$ , e  $(y; \sqrt{5}; x)$ , são, respectivamente, progressões aritmética e geométrica. Se a progressão aritmética é crescente, a razão da progressão geométrica é:



a)  $\frac{\sqrt{5}}{5}$

b)  $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

c)  $\sqrt{5}$

d)  $2\sqrt{5}$

---

16. (EEAr) Sejam  $a$ ;  $b$  e  $c$  termos consecutivos de uma PG, todos positivos. Se  $a < b < c$  e  $a = m-1$ ,  $b = m+5$  e  $c = 11m-1$ , então o valor de  $a + b + c$  é:

a) 40

b) 42

c) 44

d) 46

---

17. (EEAr) O valor de mercado de um automóvel é alterado a cada mês com um acréscimo de 1% em relação ao mês anterior. A sequência de valores do automóvel, a cada mês, forma uma progressão:

a) aritmética de razão 0,1.

b) aritmética de razão 0,01.

c) geométrica de razão 1,1.

d) geométrica de razão 1,01.

---

18. (EEAr) Na sequência  $(1; 1; 2; 3; \dots)$ , onde  $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$ , o nono termo é:

a) 34

b) 21



- c) 43
  - d) 28
- 

19. (EEAr) Numa progressão geométrica de 6 termos positivos, a soma de  $a_2$  e  $a_4$  é 6, e a soma de  $a_4$  e  $a_6$  é 12. A razão dessa P.G. é

- a) 2
  - b)  $\sqrt{2}$
  - c)  $-\sqrt{2}$
  - d) - 2
- 

20. (EEAr) Numa progressão aritmética, o primeiro termo é  $10x - 9y$ , o último termo é  $y$ , e a razão é  $y-x$ . Sendo  $x \neq y$ , o número de termos dessa P.A. é

- a) 8
  - b) 9
  - c) 10
  - d) 11
- 

21. (EEAr) Tanto numa P.A. quanto numa P.G., os números 3 e 243 são, respectivamente, a razão e o 6º termo. O produto do 1º termo da P.G. pelo 3º termo da P.A. é

- a) 702
  - b) 693
  - c) 234
  - d) 231
- 



22. (EEAr) Sabe-se que a sequência  $(x; y; 10)$  é uma P.A. e a sequência  $\left(\frac{1}{y}, 2, 3x+4\right)$  é uma P.G.

Nessas condições, é correto afirmar que:

- a) a razão da P.A. é 2.
- b) a razão da P.G. é 26.
- c)  $x + y = 0$ .
- d)  $x \cdot y = -16$ .

---

23. (EEAr) Se em uma P.G. de três termos reais o produto e a soma dos termos são, respectivamente, 216 e 26, então a soma dos dois primeiros termos dessa P.G., quando decrescente, é

- a) 24
- b) 20
- c) 18
- d) 8

---

24. (EEAr) Se  $(x+3; 2x-1; x+5)$  é uma P.A., então a soma dos três termos dessa P.A. é

- a) -13
- b) 15
- c) 19
- d) 27

---

25. (EEAr) A soma dos vinte primeiros termos da PA cujo termo geral tem para expressão  $a_n = 3n + 5$  é

- a) 657



- b) 730
  - c) 803
  - d) 1460
- 

26. (EEAr) Ao se efetuar a soma de 50 primeiras parcelas da P.A.  $202 + 206 + 210 + \dots$ , por distração, não foi somada a 35ª parcela. A soma encontrada foi

- a) 11050
  - b) 14550
  - c) 14662
  - d) 24450
- 

27. (EEAr) A solução da equação  $1 + x + x^2 + x^3 + x^4 = \dots = 2$  é

- a)  $\frac{3}{2}$
  - b)  $\frac{1}{2}$
  - c) -1
  - d) indeterminada
- 

28. (EEAr) O termo geral de uma PA é  $a_n = 3n - 16$ . A soma de seus 10 primeiros termos é

- a) 18
  - b) 14
  - c) 5
  - d) -6
- 

29. (EEAr) Uma P.G. de razão  $\sqrt{3}$ , tem cinco termos. Se o último termo é  $9\sqrt{3}$ , então o primeiro é



- a)  $\sqrt{3}$
  - b)  $5\sqrt{3}$
  - c) 3
  - d)  $\frac{1}{3}$
- 

30 (EEAr) Na PG  $(y, 2y + 2, 3y + 3, \dots)$ , o 4º termo, que é diferente de zero, vale:

- a) 2
  - b)  $\frac{3}{2}$
  - c) -4
  - d)  $\frac{-27}{2}$
- 

31. (EEAr) Numa P.A., o 10º termo e a soma dos 30 primeiros termos valem, respectivamente, 26 e 1440. A razão dessa progressão é

- a) 2
  - b) 3
  - c) 4
  - d) 6
- 

32. (EEAr) A soma dos infinitos termos da P.G.  $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \dots\right)$  é

- a)  $\frac{3}{2}$



b)  $\frac{2}{3}$

c)  $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

d)  $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

---

33. (EEAr) Inscrevendo-se nove meios aritméticos entre 15 e 45, obtém-se uma PA cujo sexto termo é

a) 25

b) 30

c) 33

d) 42

---

34. (EEAr) Se a sequência  $(x; 3x + 2; 10x + 12)$  é uma PG de termos não nulos, então  $x^2$  é

a) 1

b) 4

c) 9

d) 16

---

35. (EEAr) Na PA decrescente  $(18; 15; 12; 9; \dots)$ , o termo igual a -51 ocupa a posição

a) 30

b) 26

c) 24

d) 18

---

36. (EEAr) Em uma PA cuja razão é igual ao seu primeiro termo, tem-se  $a_3 + a_7 = 5$ . Assim, a razão dessa PA é



- a) 0,5
  - b) 2,5
  - c) 2
  - d) 1
- 

37 (EEAr) Considere esses quatro valores  $x$ ,  $y$ ,  $3x$ ,  $2y$  em PA crescente. Se a soma dos extremos é 20, então o terceiro termo é

- a) 9
  - b) 12
  - c) 15
  - d) 18
- 

38 (ESA) O valor de  $x$  tal que  $3^4 \cdot 3^5 \cdot 3^6 \cdot \dots \cdot 3^x = 3^{30}$  é:

- a) 6
  - b) 7
  - c) 8
  - d) 12
  - e) 13
- 

39 (ESA). Numa progressão aritmética (PA) de nove termos, a soma dos dois primeiros termos é igual a 20 e a soma do sétimo e oitavo termos é 140. A soma de todos os termos desta PA é:

- a)  $S_n = 320$
  - b)  $S_n = 405$
  - c)  $S_n = 395$
  - d)  $S_n = 435$
  - e)  $S_n = 370$
- 



40 (ESA). Em uma progressão aritmética, o primeiro termo é 5 e o décimo primeiro termo é 45. Pode-se afirmar que o sexto termo é igual a

- a) 15
  - b) 21
  - c) 25
  - d) 29
  - e) 35
- 

41 (ESA). Encontre o valor numérico da expressão  $E = 11^7 + 11^7 + 11^7 + 11^7 + 11^7 + 11^7 + 11^7 + 11^7 + 11^7 + 11^7 + 11^7$ .

- a)  $11^8$
  - b)  $11^{14}$
  - c)  $11^{77}$
  - d)  $121^7$
  - e)  $121^{77}$
- 

42 (ESA). Em um treinamento de condicionamento físico, um soldado inicia seu primeiro dia correndo 800m. No dia seguinte corre 850m. No terceiro 900m e assim sucessivamente até atingir a meta diária de 2200m. Ao final de quantos dias, ele terá alcançado a meta?

- a) 31
  - b) 29
  - c) 27
  - d) 25
  - e) 23
- 



43 (ESA). Em uma Progressão Aritmética com 6 termos, temos que a soma de seus termos é igual a 102 e seu último termo é 27. Com base nessas informações, a razão dessa progressão é:

- a) 3
- b) 5
- c) 11
- d) 4
- e) 7

---

44 (ESA). Em uma progressão aritmética cujo primeiro termo é 1, 87 e a razão é 0, 004, temos que a soma dos seus dez primeiros é igual a:

- a) 18,88
- b) 9,5644
- c) 9,5674
- d) 18,9
- e) 18,99

---

45 (ESA). Em uma Progressão Aritmética, o décimo termo vale 16 e o nono termo é 6 unidades maior do que o quinto termo. Logo, o décimo segundo termo vale:

- a) 16, 5
- b) 17, 0
- c) 19, 0
- d) 19, 5
- e) 17, 5



## 6 - GABARITO

- |  |       |
|--|-------|
| 1) a) $\left(\frac{1}{2}; \frac{2}{3}; \frac{3}{4}; \frac{4}{5}; \dots\right)$ | 20) D |
| b) $(-1; 1; -1; 1 \dots)$  | 21) C |
| 2) a) $(4, 8, 14, 22, 32 \dots)$   | 22) B |
| b) $(-3, -2, 0, 4, 12 \dots)$  | 23) A |
| 3) a) 14   | 24) D |
| b) $3k-1$  | 25) B |
| 4) a) $a_n = 2n$   | 26) C |
| b) $a_n = 2^n$   | 27) B |
| 5) 12  | 28) C |
| 6) a) 2  | 29) A |
| b) $(1, 3, 5, 7 \dots)$  | 30) D |
| 7) $a_1 = 3; r = 4$  | 31) C |
| 8) $(60; 57; 54; 51; \dots)$   | 32) D |
| 9) $(-3, 2, 7, 12, 17, 22)$  | 33) B |
| 10) 482,00   | 34) B |
| 11) $r = \frac{4}{k}$  | 35) C |
| 12) $n=122$  | 36) A |
| 13) $(12; 20; 36)$   | 37) B |
| 14) $(1; 3; 5)$ e $(5; 3; 1)$  | 38) C |
| 15) A  | 39) B |
| 16) B  | 40) C |
| 17) D  | 41) A |
| 18) A  | 42) B |
| 19) B  | 43) D |
|  | 44) A |
|  | 45) C |



Por hoje é só! Espero que tenham gostado! Até a próxima!



**@professor\_ismaelsantos**



Prof. Ismael Santos



WhatsApp

**(21) 98199 2383**



# ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



**1** Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



**2** Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



**3** Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



**4** Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



**5** Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



**6** Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



**7** Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



**8** O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.