

**Aula 00 (Somente em  
PDF)**

*SESAU-AL (Fisioterapeuta)  
Conhecimentos Específicos 2021 -  
(Pós-Edital)*

Autor:  
**Gislaine dos Santos Holler, Mara  
Claudia Ribeiro**

15 de Junho de 2021

## Sumário

1 – Introdução à Fisiopatologia Musculoesquelética .....	5
1.1– Processo de Reparo Tecidual.....	5
1.2– Lesões Musculares.....	11
1.3– Lesões Tendíneas e Ligamentares .....	12
1.4– Lesões na Cartilagem Articular .....	14
Questões Comentadas .....	17



## APRESENTAÇÃO DO CURSO

Prezado (a) concursando(a), parabéns pela iniciativa de adquirir o curso, trata-se de um passo importante para a sua aprovação !!!

É com imensa satisfação que iniciaremos os estudos do **Curso Preparatório para o concurso da Secretaria de Saúde de Alagoas (SESAU-AL)**. Este material será desenvolvido com muita dedicação e responsabilidade. Esforçando-nos ao máximo para oferecer o melhor e mais completo conteúdo possível para concursos que pode ser encontrado no mercado. Com ênfase na banca CEBRASPE/CESPE.

Em todas as aulas serão apresentadas diversas questões de diferentes bancas que desenvolvem provas para concurso em todo o Brasil.

A fim de discutirmos e ampliar os nossos conhecimentos as questões serão **TODAS COMENTADAS**. E para que você possa praticar bastante, teremos, no final do material questões sem comentários, com gabarito.

Em todos os cursos temos a aula 00, trata-se de uma aula gratuita e que apresenta o curso, delimita os assuntos que serão abordados. Nesta aula 00 também pode ser apresentado assuntos iniciais do curso.

## APRESENTAÇÃO PESSOAL

Por fim, resta uma breve apresentação das professoras responsáveis pelo conteúdo. As professoras Mara Ribeiro e Gislaine Holler, irão ministrar as aulas desse módulo. A Prof<sup>a</sup> Mara responsável pelas videoaulas/PDFs e a Prof<sup>a</sup> Gislaine pelos PDFs. Falaremos brevemente sobre cada:

- ✚ Prof<sup>a</sup> Gislaine Holler, graduada em Fisioterapia (2013) e pós-graduada em Fisioterapia Traumatológica e Desportiva e Dermatofuncional. Iniciei minha vida de concursadeira em 2014, com êxitos nos concursos voltados à fisioterapia, sendo aprovada na Secretaria de Saúde do Distrito Federal (2014), Prefeitura Municipal de Bela Vista do Toldo – SC (2015) e Prefeitura Municipal de Canoinhas – SC (2015). Há mais de 5 anos especialista em concursos públicos na área da Fisioterapia.
- ✚ Prof<sup>a</sup> Mara Ribeiro formada em fisioterapia e pós-graduada em Fisioterapia Neurofuncional pela Universidade Estadual de Londrina, Mestre em Gerontologia pela Universidade Católica de Brasília e Doutora em Ciências Médicas pela Universidade de Brasília. Leciona no ensino superior há 15 anos, em cursos de graduação e pós-graduação, em diversas disciplinas ligadas ao Sistema Locomotor. Foi fisioterapeuta do Hospital das Forças Armadas - Brasília. Há mais de 5 anos especialista em concursos públicos na área da Fisioterapia.

Deixaremos abaixo os nossos contatos para quaisquer dúvidas ou sugestões. Teremos o prazer em orientá-los da melhor forma possível nesta caminhada

**Instagram:** [https://www.instagram.com/fisio\\_estrategiaconcursos](https://www.instagram.com/fisio_estrategiaconcursos)  
<https://www.instagram.com/prof.gislaineholler>  
<https://www.instagram.com/profa.mara>

**Facebook:** @fisioestrategiaconcursos



## SESAU - AL

- **Inscrições:** 18 de junho a 23 de julho
- **Iseção da taxa:** 18 de junho a 02 de julho
- **Último dia para pagamento:** 26 de julho
- **Prova:** 12/09/2021
- **Banca CEBRASPE**
- **15 vagas para Fisioterapeuta**
- **Remuneração** - R\$ 2.873,46 para 30 horas semanais

As provas objetivas terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas no turno da manhã, para os cargos de nível superior, e no turno da tarde, para os cargos de nível médio.

Cada prova objetiva do concurso SESAU AL será constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o comando a que se refere o item.

- Conhecimentos gerais – 50 questões
- Conhecimentos específicos – 70 questões

A sede da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (SESAU – AL) está localizada na capital Maceió. Além dos novos hospitais, a Secretaria é responsável por gerenciar os seguintes hospitais:

- Hospital Geral do Estado – HGE;
- Unidade de Emergência do Agreste;
- Hospital Ib Gatto Falcão;
- Unidade Mista Arnon de Melo;
- Unidade Mista Dra. Quitéria Bezerra de Melo;
- Unidade Mista Dr. Antenor Serpa.

### **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE FISIOTERAPIA:**

1 Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia.

2 Provas de função muscular.

3 Cinesiologia e biomecânica.

4 Análise da marcha.

5 Exercícios terapêuticos e treinamento funcional.

6 Indicação, contra-indicação, Diário Oficial Estado de Alagoas Maceió - sexta-feira 11 de junho de 2021 27 Edição Eletrônica Certificada Digitalmente conforme LEI N° 7.397/2012 técnicas e efeitos fisiológicos da hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, crioterapia, eletroterapia, termoterapia superficial e profunda.

7 Prescrição e treinamento de órteses e próteses.

8 Anatomia, fisiologia, fisiologia do exercício e fisiopatologia, semiologia e procedimentos fisioterápicos nas áreas: neurológicas e neuropediátricas; ortopedia e traumatologia; cardiologia; pneumologia; ginecologia e obstetrícia. Geriatria: fisioterapia preventiva, curativa e reabilitadora.

9 Ética profissional



## CRONOGRAMA DE AULAS

	CONTEÚDO	DATA
00	Apresentação do Curso – Prof. Gislaine Holler	15/06/2021
1.	Anatomia Humana – Prof. Gislaine Holler	20/06/2021
2.	Fisiologia Humana – Prof. Gislaine Holler	30/06/2021
3.	Cinesiologia e Biomecânica Humana – Prof. Mara Ribeiro	30/06/2021
4.	Análise e treino de marcha – Prof. Mara Ribeiro	01/07/2021
5.	Amputação – Prof. Mara Ribeiro	07/07/2021
6.	Prescrição e treinamento de Órteses e Próteses– Prof. Mara Ribeiro	09/07/2021
7.	Cinesioterapia motora e respiratória – Prof. Mara Ribeiro	11/07/2021
8.	Recursos e técnicas fisioterapêuticas – Prof. Gislaine Holler	12/07/2021
9.	Avaliação musculoesquelética e neurológica – Prof. Gislaine Holler	13/07/2021
10.	Avaliação cardiorrespiratória – Prof. Mara Ribeiro	13/07/2021
11.	Assistência fisioterapêutica em neurologia – Prof. Mara Ribeiro	15/07/2021
12.	Conhecimentos fisiopatológicos das alterações Respiratórias – Prof. Mara Ribeiro	16/07/2021
13.	Fisioterapia em UTI Adulto e Pediátrica I – Prof. Mara Ribeiro	17/07/2021
14.	Fisioterapia em UTI Adulto e Pediátrica II – Prof. Mara Ribeiro	18/07/2021
15.	Conhecimentos fisiopatológicos das alterações cardiológicas e angiológicas - Prof. Gislaine Holler	15/07/2021
16.	Avaliação em Pediatria – Prof. Gislaine Holler	16/07/2021
17.	Conhecimentos fisiopatológicos das alterações pediátricas – Prof. Gislaine Holler	17/07/2021
18.	Assistência fisioterapêutica em traumatologia-ortopedia – Prof. Gislaine Holler	18/07/2021
19.	Hidroterapia – Prof. Mara Ribeiro	20/08/2021
20.	Ginecologia e Obstetrícia – Prof. Mara Ribeiro	25/08/2021
21.	Geriatrics: fisioterapia preventiva, curativa e reabilitadora – Prof. Mara Ribeiro	28/08/2021
22.	Ética Profissional– Prof. Gislaine Holler	01/09/2021




## 1 – Introdução à Fisiopatologia Musculoesquelética

### 1.1– Processo de Reparo Tecidual

Iremos falar primeiramente do processo de cicatrização dos tecidos moles do corpo humano. O processo de cicatrização dos tecidos ósseos é diferente, iremos estudar adiante.

Para que o processo de cicatrização seja ativado, é necessário ocorrer uma lesão ou doença. Essas lesões podem ser classificadas como primárias ou secundárias:




As lesões secundárias ainda podem ser classificadas em agudas, crônicas e agudas sobre crônicas. Veremos melhor essa classificação ao longo dos estágios de cicatrização.

No processo de reparo tecidual podemos identificar três fases: inflamatória (agudo), migratório e proliferativa (subagudo) e remodelação (crônico).



Estas fases são separadas didaticamente, mas na realidade há uma superposição e transição contínua e gradual de uma fase para outra. Geralmente, separamos por tempo de cicatrização, além dos sinais e sintomas. Atenção! Cada bibliografia cita o tempo de forma diferente, mas em geral, é mais ou menos o que está descrito abaixo, podendo durar mais tempo. Vejamos:



A tabela a seguir é o resumo dos estágios de cicatrização, o que ocorre em cada fase e as características gerais. Atendem que com o passar do tempo da lesão, os sinais e sintomas vão alterando, geralmente diminuindo.

ESTÁGIO	REAÇÕES	CARACTERÍSTICAS GERAIS
<b>Coagulação e inflamação (agudo)</b>	-Vasorregulação e coagulação sanguínea; -Migração e ação celular (macrófagos e fibroblastos; neutrófilos e monócitos); -Fatores químicos (fator de crescimento).	Edema; Hiperemia; Calor; Dor presente sem qualquer movimento na área envolvida; Impedimento ou perda da função.
<b>Migratório e proliferativo (subagudo)</b>	-Crescimento capilar e formação de tecido granulado; -Proliferação de fibroblastos com síntese de colágeno; -Aumento nas atividades dos macrófagos e dos matócitos.	Calor e edema regridem; Dor percebida com a atividade ou movimentos na área envolvida.



	-Contração da ferida.	
<b>Remodelação (crônico)</b>	-Conversão do tecido de reparo inicial em tecido cicatricial. -Ganho de força tensil; formação das ligações cruzadas.	A dor geralmente ocorre após alguma atividade.

A partir do exposto, quais recursos terapêuticos podemos utilizar em cada fase?

Para pensar nisso, temos que nos lembrar das características gerais de cada fase. Na tabela abaixo, citamos os objetivos do tratamento fisioterapêutico em cada estágio e possibilidades terapêuticas. Falo em possibilidades terapêuticas, pois sempre irá depender dos sinais e sintomas do paciente. Nas provas, geralmente, a banca define quais os sinais e sintomas, em cima disso que saberemos as respostas. Se a banca pedir a fase da lesão, lembrem-se das características gerais dos sinais e sintomas da fase.

ESTÁGIO	PRAZO APROXIMADO	TRATAMENTO	OBJETIVOS
<b>INICIAL AGUDA</b>	<b>Lesão ao Dia 03</b>  Edema Dor ao movimento e palpação	Proteção (órteses); Repouso; Crioterapia; Compressão intermitente; Elevação; Laser de baixa potência; Estimulação Elétrica; Terapia Manual.	Reduzir a dor; Controlar inflamações e edemas; Proteger as estruturas danificadas;
<b>Resposta inflamatória</b>	<b>Dias 01 a 06</b>  Edema diminui, Quente ao toque. Descoloração, Dor ao movimento e à palpação.	Crioterapia; Estimulação Elétrica; Amplitude de movimento; Compressão intermitente; Terapia Manual.	Manter a força e mobilidade das articulações adjacentes a lesão.
<b>Reparo fibroblástico</b>	<b>Dias 4 a 10</b>  Dor à palpação e ao movimento; Edema diminui.	Termoterapia; Estimulação elétrica; Laser de baixa potência; Amplitude de movimento; Fortalecimento muscular (leve).	Diminuir a dor, Aumentar a circulação, Diminuir o edema, Melhorar a FM gradativamente
<b>Maturação – remodelação</b>	<b>Dia 7 até recuperação</b>	Ultrassom; Estimulação elétrica;	Aumentar ADM;



	Sem edema; Palpação sem dor; Diminuição da dor ao movimento.	Laser de baixa potência; Progressão dos exercícios de Amplitude de movimento e fortalecimento muscular; Exercícios Funcionais; Exercícios pliométricos; Exercícios de Propriocepção.	Aumentar força muscular; Diminui dor; Aumentar a circulação sanguínea; Retorno funcional.
--	--	--	--

Lembrando que as fases se superpõem, ou seja, os sinais e sintomas podem ser os mesmos entre as fases!



#### QUADRIX – SEDF – 2017

Os agentes térmicos transferem energia para dentro ou para fora do tecido. Essa transferência de energia pode basear-se em um gradiente de temperatura, como no caso do gelo e do calor, ou na conversão de energia eletromagnética, como ocorre nas diatermias. Considerando essas informações, julgue o item subsequente.

Deve-se colocar uma bolsa de água quente em um trauma recente para promover analgesia e diminuir edemas.

**Gabarito:** Errado.

**Comentários:** Coloquei essa questão para entenderem como geralmente é cobrado. Esses recursos terapêuticos iremos aprofundar no Módulo de Fisioterapia Geral. Como sabemos, o calor não é utilizado em

um trauma recente (agudo) para promover analgesia e diminuir edemas. É utilizada a crioterapia. Item errado.

ESCLARECENDO!



### Definições de alguns termos:

- **Entorse:** são lesões dos ligamentos das articulações, onde há um estiramento além de sua amplitude normal, rompendo-se. Não há deslocamento completo dos ossos. Pode ocorrer por rotações, torções bruscas, etc.
- **Luxação:** lesões em que a extremidade de um dos ossos é deslocada de seu lugar, podendo afetar vasos sanguíneos, nervos e cápsula articulares. Ocorre devido traumatismo por golpes indiretos ou movimentos articulares violentos.
- **Distensão:** rompimento parcial ou completo de fibras ou feixes musculares. Iremos falar especificamente a seguir.



### OBJETIVA CONCURSOS - Pref. Caxias do Sul/RS

Em relação às lesões dos tecidos moles, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Luxação.
- (2) Entorse.



(3) Distensão.

( ) Sobrecarga grave, estiramento ou laceração de tecidos moles como cápsula articular, ligamento, tendão ou músculo.

( ) Deslocamento, geralmente envolvendo as partes ósseas dentro de uma articulação, levando à lesão do tecido mole, inflamação, dor e espasmo muscular.

( ) Alongamento excessivo, excesso de exercício, excesso de uso do tecido mole.

(A) 1 - 2 - 3.

(B) 3 - 2 - 1.

(C) 2 - 1 - 3.

(D) 2 - 3 - 1.

▪

**Gabarito:** C

**Comentários:** Vejamos as assertivas:

(2) Sobrecarga grave, estiramento ou laceração de tecidos moles como cápsula articular, ligamento, tendão ou músculo. **Entorse.**

(1) Deslocamento, geralmente envolvendo as partes ósseas dentro de uma articulação, levando à lesão do tecido mole, inflamação, dor e espasmo muscular. **Luxação. Quando há deslocamento ósseo, é luxação.**

(3) Alongamento excessivo, excesso de exercício, excesso de uso do tecido mole. **Distensão.**



## 1.2– Lesões Musculares

Podemos considerar como lesões musculares as contusões e as distensões.

Qual a diferença entre os dois? A contusão ocorre como resultado de um golpe. Não se observa nenhuma alteração na continuidade da pele, porém os vasos sanguíneos debaixo dela podem ser lesados, produzindo uma equimose na área. Não gera nenhum prejuízo funcional. Já a distensão muscular há uma lesão aguda do músculo, em geral da junção musculotendinosa, em virtude de uma contração muscular brusca ou excessiva. Pode ser crônica, em virtude dos movimentos repetitivos que sobrecarregam o músculo.

As distensões musculares podem ser classificadas, de acordo com a sua gravidade, em 3 graus:

<b>DISTENSÃO LEVE</b> Grau I	<b>Ruptura de algumas fibras musculares com edema e desconforto menores.</b> <b>Perda mínima ou nenhuma de força e restrição de movimento.</b> <b>Sensibilidade palpatória pode estar presente.</b> <b>Sem incapacidade funcional.</b>
---------------------------------	---



<b>DISTENSÃO MODERADA</b> Grau II	<b>Certo grau de ruptura musculotendinosa com quadro de dor à contração ou alongamento.</b> <b>Edema mais significativo.</b> <b>Diminuição da força e limitação de movimentos funcionais.</b> <b>Dor moderada a grave.</b> <b>Exame clínico mostra não haver ruptura completa.</b> <b>Reabilitação de 3 a 28 dias.</b>
--------------------------------------	---



**DISTENSÃO  
GRAVE**

Grau III

**Ruptura completa de um ou mais componentes a unidade.**

**Dor grave.**

**Perda da função.**

**Possibilidade de intervenção cirú**

**Reabilitação pode requerer de 3 semanas a 3 meses, dependendo da gravidade.**



### 1.3– Lesões Tendíneas e Ligamentares

Do ponto de vista histológico, os ligamentos e os tendões tem a mesma composição, ou seja, são estruturas de tecido conjuntivo densamente compactadas, compostos por colágeno de alta resistência à tensão e com orientação direcional. Vamos falar um pouco dessas lesões.

Os tendões se deformam menos que os ligamentos sob uma carga aplicada, sendo sujeitos a maiores estresses de tensão devido ao maior número de fibras de colágeno paralelas. Embora os tendões resistam bem a altas tensões, resistem bem menos à força de cisalhamento e compressão. Os ligamentos também possuem sustentação para cargas de tensão, fornecendo estabilidade articular e limitação do movimento.

As lesões de tendão estão entre as lesões mais comuns por esforço repetitivo, causando microtraumas no tecido do tendão. Podemos considerar 3 tipos mais comuns:

- Tendinite – inflamação do tendão;
- Tendinose – alteração degenerativa e crônica do tendão acompanhada de dor e espessamento do tendão em geral;
- Paratendinite – distúrbio inflamatório dos tecidos que circundam o tendão. Termos utilizados: peritendinite, tenossinovite e tenovaginite.



As lesões ligamentares podem ser classificadas de acordo com a sua gravidade, muito parecidas com as fases das lesões musculares:



- **Grau I – leve:** perda mínima de integridade estrutural; movimento normal; pouco ou nenhum edema; sensibilidade localizada (dor branda); contusão mínima. Pode haver pouca perda funcional. Retorno precoce ao treinamento.
- **Grau II – moderada:** certa ruptura ligamentar com instabilidade moderada; dor forte a moderada, edema significativo. Pode ocorrer hemartrose associada e efusão. Essa lesão tem tendência à recidivas e também pode alongar mais com o tempo. Também pode precisar de imobilização modificada.
- **Grau III – completo:** perda de integridade estrutural; movimento anormal; contusão significativa; hemartrose; ampla instabilidade funcional. Forte dor inicialmente com pequena ou nenhuma dor subsequente, devido a ruptura total de fibras nervosas. Possibilidade cirúrgica.

## 1.4– Lesões na Cartilagem Articular

Revisando... A cartilagem articular é uma forma especializada de tecido conjuntivo de consistência rígida, com as seguintes funções:

- Suporte de tecidos moles
- Reveste superfícies articulares, absorve choques e facilita os deslizamentos.
- Núcleos de ossificação, essencial para formação e crescimento dos ossos longos.

A cartilagem é composta por:

- Células: condroblastos, condrócitos, condroclastos; função destas células é de sintetizar a matriz e mantê-la em estado normal.
- Matriz extracelular: colágeno ou colágeno + elastina, proteoglicanas, capa de solvatação, “lacunas” (deixado pelo condroblasto) ocupadas por condrócitos, proteínas de ligação (condronectina).
- Tecido conjuntivo de revestimento pericôndrio.
- O tecido cartilaginoso não possui vasos sanguíneos; sendo então nutrido pelos capilares do conjuntivo envolvente (pericôndrio) ou pelo líquido sinovial das cavidades articulares.
- Desprovidos de vasos linfáticos e de nervos. Por essa razão, tem potencial limitado de cicatrização.

Além dessas propriedades, existem três tipos de cartilagem:

**a) Cartilagem hialina**: constituída de fibrilas de colágeno tipo II, sendo a cartilagem mais comum, sendo substituída por um esqueleto ósseo.

Em crianças essa cartilagem é encontrada entre a diáfise e a epífise (ossos longos). Observa-se o “disco epifisário” – responsável pelo crescimento do osso em extensão – os condrócitos encontram-se em fileiras ou colunas paralelas (cartilagem seriada). Já em adultos é encontrado: parede das fossas nasais,



traquéia e brônquios, na extremidade ventral das costelas e recobrimdo as superfícies articulares dos ossos longos.

CURIOSIDADE



### **CRESCIMENTO DAS CARTILAGENS:**

\* *crescimento intersticial*: devido a divisão mitótica dos condrócitos.

\*\* *crescimento aposicional* (adicional): devido às células do pericôndrio.

O crescimento das cartilagens intersticiais ocorre nas primeiras fases do crescimento, após a cartilagem irá crescer por aposição.

**Pericôndrio**: camada de tecido conjuntivo denso (em sua maior parte), integridade essencial para a vida da cartilagem, fonte de novos condrócitos para o crescimento, nutrição da cartilagem, oxigenação, eliminação dos refugos metabólicos, localização dos vasos sanguíneos e linfáticos, formados por colágeno tipo I, fibroblastos e mais profundamente condroblastos. A camada de solvatação é uma via de transporte de nutrientes; os condrócitos presentes são responsáveis pela síntese de proteoglicanas: hormônio de crescimento.

**b) Cartilagem elástica**: presente no pavilhão auditivo externo, na tuba auditiva, epiglote (cartilagem cuneiforme da laringe).

*Composição*: semelhante à hialina, fibrilas de colágeno tipo II e fibras elásticas (cor amarelada), o crescimento é por aposição, sendo menos sujeito a processos degenerativos.



**c) Cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem:** presentes nos discos intervertebrais, local onde tendões e ligamentos se inserem nos ossos, sínfise púbica.

Características: associada ao tecido conjuntivo denso, os condrócitos formam fileiras, as fibras colágenas tipo I > não existe pericôndrio.

Discos intervertebrais: formado por anel fibroso (tecido conjuntivo denso, fibrocartilagem, feixes colágenos formam camadas concêntricas, o núcleo das células toma aspecto arredondadas dispostas no interior de um líquido viscoso rico em ácido hialurônico).

CURIOSIDADE



A patela tem a cartilagem articular mais espessa do corpo.

Assim como nas outras lesões, a cartilagem articular pode ser classificada em três tipos distintos:

- Lesões do Tipo 1 (superficiais): envolvem dano microscópico aos condrócitos e à matriz extracelular. LESÃO CELULAR.
- Lesões do Tipo 2 (espessura parcial): ruptura microscópica da superfície da cartilagem articular (fraturas ou fissuras condrais). Não tem penetração no osso subcondral.
- Lesões do Tipo 3 (espessura total): ruptura da cartilagem articular com penetração no osso subcondral, conseqüentemente há processo inflamatório.



SE LIGA!

Os condrócitos são células especializadas responsáveis pelo desenvolvimento de cartilagem e pela manutenção da matriz extracelular.



## QUESTÕES COMENTADAS



### 1. IBFC – EBSERH - 2017

Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre estrutura e ação do músculo estriado.

- ( ) O axônio com suas diversas ramificações, as fibras musculares inervadas por ele e o neurônio são conhecidos como unidade motora.
- ( ) Quando um músculo se contrai concentricamente é antagonista nas ações articulares resultantes.
- ( ) O músculo, mesmo relaxado, possui um turgor ou sensação de firmeza denominada tensão residual.
- ( ) Contração estática ou isométrica é quando um músculo desenvolve uma tensão que é insuficiente para mover uma parte do corpo para uma dada resistência.

A sequência correta é:

- A) F-F-F-V
- B) V-F-V-F
- C) V-F-F-V
- D) F-F-V-V
- E) V-V-F-F

**Comentários:** Vejamos as assertivas:

(V) O axônio com suas diversas ramificações, as fibras musculares inervadas por ele e o neurônio são conhecidos como unidade motora. **Item verdadeiro.** Em outras palavras a unidade motora é o conjunto de um neurônio motor e das fibras musculares por ele inervadas.



(F) Quando um músculo se contrai concentricamente é antagonista nas ações articulares resultantes. **Item falso. Quando um músculo sofre uma contração com encurtamento muscular (contração concêntrica), diz-se que ele é agonista (executam o movimento) para as ações articulares resultantes.**

(F) O músculo, mesmo relaxado, possui um turgor ou sensação de firmeza denominada tensão residual. **Item falso. Vimos que o músculo (normal) mantém um certo nível de tensão mesmo no repouso, chamado de tônus muscular.**

(V) Contração estática ou isométrica é quando um músculo desenvolve uma tensão que é insuficiente para mover uma parte do corpo para uma dada resistência. **Item verdadeiro. Essa também pode ser uma forma de definir a contração isométrica, em que a resistência é igual à tensão, não gerando movimento.**

**Gabarito: C.**

## 2. AOCP - EBSERH/HU-UFS/SE - 2014

**Assinale a alternativa que apresenta a definição correta da junção neuromuscular.**

- A) Descreve uma contração muscular na qual há desenvolvimento de tensão, mas o músculo não encurta.
- B) Membrana celular que circunda uma fibra muscular.
- C) Tensão máxima desenvolvida por um músculo em resposta a uma alta frequência de estimulação.
- D) Sinapse entre o axônio e a placa de uma membrana plasmática do músculo.
- E) Tecido conjuntivo que envolve o fascículo.

**Comentários:** Como vimos, a junção neuromuscular é a sinapse entre o axônio e a placa da membrana plasmática do músculo. Também pode ser chamada de placa motora. Resposta: letra D.

**Gabarito: D**

## 3. AOCP - EBSERH/HU-UFGD - 2014

**Assinale a alternativa que corresponde à sequência temporal correta dos eventos na junção neuromuscular.**

- A) Captação de  $Ca^{2+}$  na terminação pré-sináptica; liberação de acetilcolina (Ach); despolarização da placa motora do músculo.



- B) Potencial de ação no nervo motor; despolarização da placa motora do músculo; captação de  $\text{Ca}^{2+}$  na terminação nervosa pré-sináptica.
- C) Liberação de  $\text{Ca}^{2+}$ ; potencial de ação no nervo motor; potencial de ação no músculo.
- D) Captação de  $\text{Ca}^{2+}$ , potencial de ação na placa motora; potencial de ação no músculo.
- E) Liberação de Ach; potencial de ação na placa motora do músculo; potencial de ação no músculo.

**Comentários:** Vejamos as assertivas:

(A) Captação de  $\text{Ca}^{2+}$  na terminação pré-sináptica; liberação de acetilcolina (Ach); despolarização da placa motora do músculo. **Item correto.** É isso que ocorre na terminação pré-sináptica quando há a captação de  $\text{Ca}^{2+}$  = liberação de acetilcolina. E após despolarização da junção neuromuscular ou placa motora.

(B) Potencial de ação no nervo motor; despolarização da placa motora do músculo; captação de  $\text{Ca}^{2+}$  na terminação nervosa pré-sináptica. **Item errado.** Potencial de ação no neurônio, captação de  $\text{Ca}^{2+}$  na terminação nervosa pré-sináptica, despolarização da placa motora (junção neuromuscular).

(C) Liberação de  $\text{Ca}^{2+}$ ; potencial de ação no nervo motor; potencial de ação no músculo. **Item errado.** Liberação de  $\text{Ca}^{2+}$  onde? Sempre é necessário especificar de onde vem ou para onde vai.

(D) Captação de  $\text{Ca}^{2+}$ , potencial de ação na placa motora; potencial de ação no músculo. **Item errado.** Como vimos nas alternativas anteriores.

(E) Liberação de Ach; potencial de ação na placa motora do músculo; potencial de ação no músculo. **Item errado.** O potencial de ação na placa motora após alguns eventos libera acetilcolina.

**Gabarito: A**

#### 4. AOCP - EBSERH/HE-UFSCAR - 2015

**Sobre o mecanismo molecular da contração muscular, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) A contração muscular ocorre por um mecanismo de deslizamento dos filamentos de miosina e actina.
- B) Uma característica importante da cabeça de miosina é que ela funciona como uma enzima ATP-ásica.
- C) O filamento de actina é formado apenas por actina, tropomiosina e troponina.
- D) O filamento de miosina é formado apenas por tropomiosina e troponina.



E) O filamento de actina é inibido pelo complexo troponina-tropomiosina. A ativação é estimulada pelos íons de cálcio.

**Comentários:** Vejamos as assertivas:

(A) A contração muscular ocorre por um mecanismo de deslizamento dos filamentos de miosina e actina. **Item correto! Foi o que vimos durante a aula.**

(B) Uma característica importante da cabeça de miosina é que ela funciona como uma enzima ATP-ásica. **Item correto. Decorem isso. As cabeças da miosina têm como função quebrar ATP.**

(C) O filamento de actina é formado apenas por actina, tropomiosina e troponina. **Item correto. Alguns autores chamam de filamento de actina ao invés de filamentos finos.**

(D) O filamento de miosina é formado apenas por tropomiosina e troponina. **Item errado. O filamento grosso ou filamento de miosina é formado por miosina.**

(E) O filamento de actina é inibido pelo complexo troponina-tropomiosina. A ativação é estimulada pelos íons de cálcio. **Item correto. É o que vimos na aula.**

**Gabarito: D**

## 5. PR-4 – URFJ – 2014

**Durante a realização de exercícios aeróbicos são utilizadas algumas fontes de energia. A seguir estão algumas destas supostas fontes. Analise as afirmativas e assinale a alternativa que contém somente a(s) correta(s).**

I. Os carboidratos são transformados em glicose e são a fonte de energia preferida pelo corpo.

II. A gordura também pode ser utilizada como fonte de energia, porém há pouca reserva corporal.

III. A proteína é utilizada como fonte de energia nos casos de queda energética extrema e inanição.

A) A afirmativa I está correta.

B) A afirmativa II está correta.

C) Somente a afirmativa III está correta.

D) As afirmativas I e III estão corretas.

E) Todas as afirmativas estão corretas.



**Comentários:** Vejamos as assertivas:

I. Os carboidratos são transformados em glicose e são a fonte de energia preferida pelo corpo. **Item correto.** É isso que ocorre. Como vimos a glicose é a primeira fonte de energia preferida pelo corpo, após lipídeos e por último proteínas.

II. A gordura também pode ser utilizada como fonte de energia, porém há pouca reserva corporal. **Item errado.** Sabemos que temos muita reserva corporal de lipídeos.

III. A proteína é utilizada como fonte de energia nos casos de queda energética extrema e inanição. **Item correto.** A proteína só utilizada nesses casos mais extremos. Primeiro os carboidratos e lipídeos são utilizados. Resposta da questão: letra D.

**Gabarito: D.**

#### 6. UNIUV –PREF. JAGUARIAÍVA/PR - 2015

A contração muscular \_\_\_\_\_ ocorre quando o músculo se contrai, produzindo força, sem mudar seu comprimento. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna:

- A) Isométrica;
- B) Isotônica excêntrica;
- C) Isocinética;
- D) Isotérmica;
- E) Isotônica concêntrica.

**Comentários:** Essa foi tranquila! A contração que não muda o comprimento do músculo é a isométrica.

**Gabarito: A**

#### 7. CONPASS - PREF. BONITO DE SANTA FÉ/PB - 2015

Tipo de contração que aumenta a capacidade de força muscular ao mesmo tempo em que suas fibras são alongadas:

- A) Concêntrica
- B) Isométrica



- C) Isocinética
- D) Intrínseca
- E) Excêntrica

**Comentários:** Quando as fibras musculares se alongam, a inserção e a origem se afastam. Isso ocorre na contração excêntrica.

**Gabarito: E**

## 8. LEGALLE CONCURSOS - PREF. NOVA ESPERANÇA DO SUL/ RS - 2015

**Em relação aos Órgãos Tendinosos de Golgi (OTGs) podemos afirmar que:**

- A) Os OTGs residem fora dos tendões musculares.
- B) O OTG é estimulado pela tensão produzida nas fibras musculares.
- C) Os impulsos nervosos descarregados pelo OTG são transmitidos por grandes axônios eferentes de condução rápida à medula espinhal e cerebelo.
- D) Os OTGs são compostos por fibras extrafusais e intrafusais.
- E) Os OTGs existem em paralelo enquanto os fusos musculares existem em série.

**Comentários:** Vejamos as assertivas:

- (A) Os OTGs residem fora dos tendões musculares. **Item errado. Eles estão na junção miotendínea.**
- (B) O OTG é estimulado pela tensão produzida nas fibras musculares. **Item correto. É isso mesmo. Resposta da questão.**
- (C) Os impulsos nervosos descarregados pelo OTG são transmitidos por grandes axônios eferentes de condução rápida à medula espinhal e cerebelo. **Item errado. Sem pé, nem cabeça. São transmitidos por neurônios aferentes à medula espinhal.**
- (D) Os OTGs são compostos por fibras extrafusais e intrafusais. **Item errado. As fibras intra e extrafusais são dos músculos.**
- (E) Os OTGs existem em paralelo enquanto os fusos musculares existem em série. **Item errado. O correto seria o contrário: OTGs em série e fusos musculares em paralelo.**

**Gabarito: B**



## 9. FGV - PREF. CUIABÁ/MT - 2015

**Assinale a opção que indica o receptor considerado sensível ao estímulo de estiramento muscular.**

- A) Orgão tendinoso de Golgi
- B) Corpúsculos de Meissner
- C) Fuso neuromuscular
- D) Corpúsculos de Merkel
- E) Corpúsculos de Pacini

**Comentários:** Estiramento muscular = fusos musculares (letra C). Vejamos as outras assertivas:

- (A) Orgão tendinoso de Golgi: sensível à tensão muscular e estiramento do tendão.
- (B) Corpúsculos de Meissner: tato e pressão vibratória.
- (D) Corpúsculos de Merkel: tato e pressão.
- (E) Corpúsculos de Pacini: captam especialmente estímulos vibráteis e pressão.

**Gabarito: C**

## 10. CAIPIMES - PREF. RIO GRANDE DA SERRA/SP - 2015

**Para que ocorra cinestesia existem muitos tipos de receptores que contribuem nessa tarefa do corpo humano. Essas percepções cinestésicas se relacionam com os centros corticais. No entanto, os 2 principais receptores que atuam em nível periférico, formando um sistema de regulação básico são:**

- A) corpúsculos de Meissner e terminações nervosas livres.
- B) órgãos tendinosos de Golgi e fusos musculares.
- C) corpúsculos de Pacini e terminações nervosas livres.
- D) receptores labirínticos e fusos musculares.

**Comentários:** Para haver cinestesia os OTGs e os fusos musculares formam um sistema básico. O que seria dos músculos sem o tônus muscular normal e o sistema de coativação alfa-gama?



**Gabarito: B**

### 11. AOCP - EBSERH/HC-UFG - 2015

**Sobre a energética da contração muscular, assinale a alternativa correta.**

- A) A concentração de ATP na fibra muscular é suficiente para manter a contração máxima por 10 a 20 segundos.
- B) As contrações isométricas encurtam o músculo.
- C) As contrações isotônicas não encurtam o músculo.
- D) As fibras lentas são fibras musculares menores, inervadas por fibras nervosas menos calibrosas, têm baixa capilaridade e pequena quantidade de mitocôndrias.
- E) A atrofia muscular começa, quase imediatamente, quando o músculo perde sua inervação, pois ele deixa de receber os sinais contráteis que são necessários para manter o tamanho normal do músculo.

**Comentários:** Vejamos as assertivas:

- (A) A concentração de ATP na fibra muscular é suficiente para manter a contração máxima por 10 a 20 segundos. **Item errado. Depende do tipo de fibra muscular.**
- (B) As contrações isométricas encurtam o músculo. **Item errado. Esse tipo de contração não há mudança do comprimento muscular.**
- (C) As contrações isotônicas não encurtam o músculo. **Item errado. As contrações isotônicas (concêntrica e excêntrica) mudam o comprimento muscular. A aula detalhada sobre essas contrações estão na parte de Biomecânica.**
- (D) As fibras lentas são fibras musculares menores, inervadas por fibras nervosas menos calibrosas, têm baixa capilaridade e pequena quantidade de mitocôndrias. **Item errado. As fibras lentas tem grande quantidade de mitocôndrias.**
- (E) A atrofia muscular começa, quase imediatamente, quando o músculo perde sua inervação, pois ele deixa de receber os sinais contráteis que são necessários para manter o tamanho normal do músculo. **Item correto!** É isso que ocorre quando o músculo perde a sua inervação. Essa é a resposta da questão.

**Gabarito: E**

### 12. AOCP - EBSERH/HU-UFMS - 2014

**Assinale a alternativa INCORRETA sobre o músculo estriado.**



- A) O ATP pode ser produzido por glicólise e por oxidação fosforilativa apenas nas células musculares rápidas.
- B) A utilização de ATP é muito mais intensa nos músculos esqueléticos rápidos, menor nos músculos esqueléticos lentos e no coração, e menor nos músculos lisos.
- C) A actina e miosina, dispostas respectivamente nos filamentos finos e grossos, são as principais proteínas contráteis do músculo.
- D) As contrações são produzidas como resultado do aumento do cálcio em resposta a potenciais de ação.
- E) Os potenciais de ação do músculo esquelético são decorrentes de aumentos súbitos de permeabilidade ao sódio no sarcolema.

**Comentários:** Vejamos as assertivas:

(A) O ATP pode ser produzido por glicólise e por oxidação fosforilativa apenas nas células musculares rápidas. **Item errado. Por esses dois mecanismos seria as células musculares rápidas tipo IIa. No tipo I é produzido por oxidação e no tipo IIb por glicólise.**

(B) A utilização de ATP é muito mais intensa nos músculos esqueléticos rápidos, menor nos músculos esqueléticos lentos e no coração, e menor nos músculos lisos. **Item correto. Quanto mais rápido, mais ATP utilizado. Os músculos lisos são os mais lentos. Essa economia na utilização de energia pelo músculo liso é extremamente importante para a economia global de energia do corpo, dado que órgãos como os intestinos, a bexiga urinária e outras vísceras devem manter sua contração muscular tônica durante todo o dia.**

(C) A actina e miosina, dispostas respectivamente nos filamentos finos e grossos, são as principais proteínas contráteis do músculo. **Item correto. Filamentos finos = actina, tropomiosina e troponina. Filamentos grossos = miosina.**

(D) As contrações são produzidas como resultado do aumento do cálcio em resposta a potenciais de ação. **Item correto. É uma das condições para ocorrer a contração muscular.**

(E) Os potenciais de ação do músculo esquelético são decorrentes de aumentos súbitos de permeabilidade ao sódio no sarcolema. **Item correto. Como vimos anteriormente no processo de contração muscular.**

**Gabarito: A**

### 13. AOCF - EBSERH/HU-UFMS - 2014

**Assinale a alternativa INCORRETA sobre a estrutura do tecido muscular esquelético.**


- A) Os filamentos de miosina são constituídos de um número determinado de moléculas de tripsina.



- B) O músculo está arranjado em fibras paralelas entre si e ao longo eixo do músculo que facilita o encurtamento.
- C) Incluídas dentro de cada sarcômero, estão duas proteínas contráteis, actina e miosina.
- D) O filamento de actina é globular, e encontrado duas proteínas reguladoras, troponina e tropomiosina.
- E) No repouso, a troponina e tropomiosina bloqueiam os sítios ativos sobre o filamento de actina e assim inibem a interação de actina e miosina.

**Comentários:** Vejamos as assertivas:

(A) Os filamentos de miosina são constituídos de um número determinado de moléculas de tripsina. Não vimos durante a aula sobre isso, mas a tripsina é uma enzima hidrolítica que pode quebrar a miosina, não é um componente da miosina. A miosina pode ser quebrada (clivagem) pela ação proteolítica da tripsina originando dois fragmentos chamados meromiosina leve (MML) e meromiosina pesada (MMP). A meromiosina pesada contém a cabeça da miosina. A papaína também é uma enzima hidrolítica que também quebra a miosina, mas a cabeça da miosina. **Item errado.**



- (B) O músculo está arranjado em fibras paralelas entre si e ao longo eixo do músculo que facilita o encurtamento. **Item correto.**
- (C) Incluídas dentro de cada sarcômero, estão duas proteínas contráteis, actina e miosina. **Item correto.**
- (D) O filamento de actina é globular, e encontrado duas proteínas reguladoras, troponina e tropomiosina. **Item correto. A actina é globular, como vimos nas figuras anteriormente.**
- (E) No repouso, a troponina e tropomiosina bloqueiam os sítios ativos sobre o filamento de actina e assim inibem a interação de actina e miosina. **Item correto.**

**Gabarito: A**



#### 14. COTEC/ UNIMONTES - PREF. CAPITÃO ENÉAS/MG - 2015

Sobre a estrutura e filamentos dos músculos estriados esqueléticos, marque a afirmativa CORRETA.

- A) Cada miofibrila contém filamentos espessos e delgados interdigitados, dispostos longitudinalmente nos sarcômeros.
- B) Os filamentos delgados de miosina contém tropomiosina, uma proteína reguladora que permite a formação de pontes cruzadas, quando se liga ao cálcio.
- C) Os filamentos espessos de actina são encontrados na banda A, no centro dos sarcômeros.
- D) Os túbulos T formam uma extensa rede tubular interna e são responsáveis pelo armazenamento e liberação de cálcio para o acoplamento excitação-contração.

**Comentários:** Vejamos as assertivas:

- (A) Cada miofibrila contém filamentos espessos e delgados interdigitados, dispostos longitudinalmente nos sarcômeros. **Item correto.**
- (B) Os filamentos delgados de miosina contém tropomiosina, uma proteína reguladora que permite a formação de pontes cruzadas, quando se liga ao cálcio. **Os filamentos delgados (finos) contém troponina, tropomiosina e actina. A tropomiosina é uma proteína filamentar que cobre o sítio de ligação da actina. As troponinas ligam-se ao cálcio e modificam a conformação da tropomiosina. Item errado.**
- (C) Os filamentos espessos de actina são encontrados na banda A, no centro dos sarcômeros. **A actina faz parte dos filamentos finos (delgados) e são encontrados na banda I. Item errado.**
- (D) Os túbulos T formam uma extensa rede tubular interna e são responsáveis pelo armazenamento e liberação de cálcio para o acoplamento excitação-contração. **Os túbulos T não armazenam cálcio. A função principal desses túbulos é transmitir o impulso nervoso até as membranas dos retículos sarcoplasmáticos, promovendo a liberação de  $Ca^{2+}$  e posteriormente a contração muscular.**

**Gabarito: A**

#### 15. EDUCA - PREFEITURA DE MATURÉIA – PB - 2016

As fibras musculares tipo II<sub>B</sub> caracterizam-se por velocidade de contração:

- A) Rápida, conteúdo mitocondrial baixo e conteúdo de mioglobina baixo.
- B) Lenta, conteúdo mitocondrial alto e conteúdo de mioglobina baixo.
- C) Rápida, conteúdo mitocondrial baixo e conteúdo de mioglobina alto.



D) Lenta, conteúdo mitocondrial alto e conteúdo de mioglobina alto.

E) Lenta, conteúdo mitocondrial baixo e conteúdo de mioglobina baixo.

**Comentários:** Vimos que as fibras musculares tipo IIb caracterizam-se por velocidade de contração rápida, ou seja, eliminamos as alternativas B, D e E. Também vimos que o número de mitocôndrias e mioglobina é baixo. Letra A. Abaixo um quadro com o resumo dos tipos de fibras musculares.

**Gabarito: A.**

	<b>FIBRAS OXIDATIVAS (I)</b>	<b>FIBRAS OXIDATIVAS-GLICOLÍTICAS (IIa)</b>	<b>FIBRAS GLICOLÍTICAS RÁPIDAS (IIb)</b>
<b>Diâmetro</b>	Menor	Intermediário	Maior
<b>Mioglobina</b>	Muita	Moderado	Pouca
<b>Cor</b>	Vermelha	Rosada	Branca
<b>Geração de ATP</b>	Aeróbico Metabolismo Oxidativo	Aeróbico e anaeróbico	Anaeróbico Metabolismo Glicolítico
<b>Contração</b>	Lenta	Rápida	Rápida

## 16. FCM – IF FARROUPILHA - 2016

**Enumere as etapas da contração muscular:**

- ( ) Chegada do impulso nervoso à junção neuromuscular.
- ( ) Potencial de ação propagado sobre as fibras, liberação de cálcio, seguida por sua ligação com troponina.
- ( ) Movimento entre actina e miosina, desligamento entre o cálcio e troponina e, conseqüente, relaxamento muscular.
- ( ) Mudança de tropomiosina em actina, seguida de exposição ao sítio de ligação da miosina.
- ( ) Liberação da acetilcolina na junção neuromuscular.
- ( ) Interação entre actina e miosina.
- ( ) Energia potencial da liberação da miosina.

A seqüência correta é



- A) 3-1-4-7-2-6-5
- B) 1-3-7-2-6-5-4
- C) 1-4-2-5-7-3-6
- D) 3-1-7-4-2-5-6
- E) 1-3-7-4-2-5-6

**Comentários:** Tente fazer essa sem olhar o gabarito. Essa questão é um resumo simples de como ocorre a contração muscular. Vejamos as assertivas:

- (1) Chegada do impulso nervoso à junção neuromuscular.
- (3) Potencial de ação propagado sobre as fibras, liberação de cálcio, seguida por sua ligação com troponina.
- (7) Movimento entre actina e miosina, desligamento entre o cálcio e troponina e, conseqüente, relaxamento muscular.
- (4) Mudança de tropomiosina em actina, seguida de exposição ao sítio de ligação da miosina.
- (2) Liberação da acetilcolina na junção neuromuscular.
- (5) Interação entre actina e miosina.
- (6) Energia potencial da liberação da miosina.

**Gabarito: E.**

### 17. FCC - TRT - 23ª REGIÃO (MT) - 2016

**Luiza, 55 anos, com diagnóstico de artrite reumatoide, encontra-se em fase aguda da doença. Nessa fase, é essencial repouso, posicionamento de modo a prevenir deformidades e ainda prevenir atrofia muscular. O tipo de contração indicado nessa fase, visando prevenir a atrofia muscular, é**

- A) Concêntrica.
- B) Excêntrica.
- C) Isométrica.
- D) Qualquer tipo de contração.



E) Isocinética.

**Comentários:** Pessoal, decorem isso! Apenas para prevenir deformidades e atrofia muscular em uma fase que é necessário repouso, o tipo de contração é a isométrica (sem movimento).

**Gabarito: C**

### 18. FCC - TRT 3º REGIAO - 2016

Após exercício vigoroso, o corpo precisa de tempo para se restaurar até voltar ao estado que estava antes do exercício. A recuperação do exercício agudo, em que a capacidade de produção de força do músculo retorna para 90 a 95% da capacidade pré-exercício, geralmente, leva

A) 30 a 60 segundos.

B) 60 a 90 segundos.

C) 90 a 120 segundos.

D) 180 a 240 segundos.

E) 120 a 180 segundos.

**Comentários:** Autores falam que para 90% são necessários 3 minutos (180 segundos) pelo menos. Alguns autores falam de 3 a 4 minutos (240 segundos), ou seja, menos de 3 minutos não há a recuperação de 90 a 95% da capacidade pré-exercício. Resposta da questão: 3 a 4 minutos – 180 a 240 segundos.

**Gabarito: D.**

### 19. AOCP - EBSERH/HU-UFS/SE - 2014

Os atletas de endurance apresentam um melhor enchimento ventricular devido

A) à diminuição da frequência cardíaca.

B) ao aumento do retorno venoso. Item correto.

C) à diminuição do retorno venoso.

D) à diminuição do volume de ejeção.

E) à diminuição da pressão arterial.



**Comentários:** Vejamos as assertivas:

- (A) à diminuição da frequência cardíaca. **Item errado.** A frequência cardíaca no atleta de endurance diminui pela ↓ do tônus simpático cardíaco.
- (B) ao aumento do retorno venoso. **Item correto.** Quanto maior o aumento do retorno venoso, mais sangue entra pelo átrio e vai para o ventrículo. Cronicamente (atleta endurance), melhora o enchimento ventricular.
- (C) à diminuição do retorno venoso. **Item errado.** Não melhora o enchimento ventricular.
- (D) à diminuição do volume de ejeção. **Item errado.** Há aumento no volume de ejeção quando há melhora do enchimento ventricular.
- (E) à diminuição da pressão arterial. **Item errado.** Não tem relação.

**Gabarito: B**

## 20. AOCF - EBSERH/HU-UFJF - 2015

A fisiologia do exercício é o estudo das respostas e adaptações fisiológicas que ocorrem como resultado do exercício praticado de forma aguda ou cronicamente, sendo de extrema importância seu conhecimento pelo profissional fisioterapeuta, principalmente para sua aplicação na reabilitação cardíaca. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta.

- A) O teste ergométrico ou teste de esforço é uma ferramenta invasiva para avaliar a resposta do sistema cardiovascular ao exercício.
- B) Fosfatos armazenados, glicólise oxigênio independente e metabolismo oxidativo são fontes de energia fornecidas para que ocorra a contração muscular.
- C) O corpo humano possui 2 (dois) tipos de fibras musculares, as do tipo I (brancas) são de contração rápida, já as do Tipo II (vermelhas) são de contração lenta.
- D) Os limites do sistema cardiopulmonar são classicamente definidos pelo VO<sub>2</sub> máximo, expresso pela equação de Fick:  $VO_{2máx} = FC \text{ (frequência cardíaca) } / FiO_2 \text{ (fração inspirada de oxigênio)}$ .
- E) As fibras musculares do tipo I chegam à exaustão mais rapidamente que as fibras musculares do tipo II.

**Comentários:** Vejamos as assertivas:

- (A) O teste ergométrico ou teste de esforço é uma ferramenta **invasiva** para avaliar a resposta do sistema cardiovascular ao exercício. **Item errado.** Não é uma ferramenta invasiva.



(B) Fosfatos armazenados, glicólise oxigênio independente e metabolismo oxidativo são fontes de energia fornecidas para que ocorra a contração muscular. **Item correto. São as três vias de obter energia.**

(C) O corpo humano possui 2 (dois) tipos de fibras musculares, as do tipo I (brancas) são de contração rápida, já as do Tipo II (vermelhas) são de contração lenta. **Item errado. Tipo I- contração lenta; tipo II – contração rápida.**

(D) Os limites do sistema cardiopulmonar são classicamente definidos pelo VO<sub>2</sub> máximo, expresso pela equação de Fick: VO<sub>2</sub>máx = FC (frequência cardíaca) / FiO<sub>2</sub> (fração inspirada de oxigênio). **Item errado.**

$$CO = \frac{VO_2}{C_A - C_V}$$

$$VO_2 = (CO \times C_A) - (CO \times C_V)$$

Onde:

CO = Débito Cardíaco (Cardiac Output);

VO<sub>2</sub> = Consumo de Oxigênio;

CA = Concentração de Oxigênio no sangue arterial (retirado de uma artéria periférica);

CV = Concentração de Oxigênio no sangue venoso (retirado da artéria pulmonar).

(E) As fibras musculares do tipo I chegam à exaustão mais rapidamente que as fibras musculares do tipo II. **Item errado. O correto seria: as fibras musculares do tipo II chegam à exaustão mais rapidamente que as fibras musculares do tipo I.**

**Gabarito: B**

## 21. AOCB - EBSEH/MEAC e HUWC-UFC - 2015

Se as células musculares podem obter energia por meio da respiração aeróbica ou de fermentação, quando um atleta desmaia após corrida de 1000 m, por falta de oxigenação adequada de seu cérebro, o gás oxigênio que chega aos músculos também não é suficiente para suprir as necessidades respiratórias das fibras musculares, que passam a acumular:

A) ácido láctico.

B) ácido acético.



- C) glicose.
- D) gás carbônico.
- E) oxigênio.

**Comentários:** Como vimos, temos três vias de obtenção de energia, quando não tem oxigênio - via anaeróbica. Quando no exercício há falta de oxigênio, transforma em ácido pirúvico e após em ácido lático. Letra correta = ácido lático (letra A)

**Gabarito: A**

## 22. AOCP - EBSERH/ HUSM-UFSM/RS - 2014

Se as células musculares podem obter energia por meio da respiração aeróbica ou de fermentação, quando um atleta desmaia após corrida de 1000 m, por falta de oxigenação adequada de seu cérebro, o gás oxigênio que chega aos músculos também não é suficiente para suprir as necessidades respiratórias das fibras musculares, que passam a acumular:

- A) ácido lático.
- B) ácido acético.
- C) glicose.
- D) gás carbônico.
- E) oxigênio.

**Comentários:** Deixei essa questão para observarem que a banca repete questões às vezes em outras provas.

**Gabarito: A.**

## 23. FAFIPA – FEAES DE CURITIBA/PR – 2015

Os músculos são metabolicamente ativos e têm de gerar energia para se movimentar. A energia necessária ao exercício fica armazenada no composto:

- A) Creatinina fosfato.
- B) Adenosina trifosfato (ATP).



C) Tropomiosina.

D) Proteoglicanas.

**Comentários:** ATP!!!

**Gabarito:** B.

#### 24. IDECAN - PREF. SIMONÉSIA/MG - 2016

**As fibras musculares, que compõem os fusos neuromusculares (fibras intrafusais), possuem uma inervação motora fornecida pelo motoneurônio gama ( $\gamma$ ) que age:**

A) promovendo um encurtamento das fibras Ia.

B) como modulador da sensibilidade dos fusos neuromusculares.

C) como receptor sensorial do movimento e é localizado no corno posterior da medula espinal.

D) com sua ativação levando à contração das fibras extrafusais, produz um estiramento da região externa ao fuso neuromuscular.

**Comentários:** O fuso muscular é sensível à mudança do comprimento do músculo (receptor sensitivo), protegendo a fibra muscular contra a ruptura quando há excesso de estiramento. Relembrando o motoneurônio gama transmite impulsos para as fibras intrafusais e o motoneurônio alfa transmite impulsos para as fibras extrafusais. Vejamos as assertivas:

(A) promovendo um encurtamento das fibras Ia. **Item errado. O motoneurônio gama ativa as extremidades da fibra intrafusil.**

(B) como modulador da sensibilidade dos fusos neuromusculares. **Item correto. Ele modula a sensibilidade dos fusos neuromusculares. Por exemplo, quando há um estiramento, o motoneurônio gama é ativado. Resposta da questão.**

(C) como receptor sensorial do movimento e é localizado no corno posterior da medula espinal. **Item errado. Ele é um neurônio motor que é ativado quando recebe informações dos neurônios sensoriais das fibras intrafusais de que há mudança do comprimento do músculo.**

(D) com sua ativação levando à contração das fibras extrafusais, produz um estiramento da região externa ao fuso neuromuscular. **Item errado. A ativação do motoneurônio gama leva à contração das fibras intrafusais. O motoneurônio alfa que leva à contração das fibras extrafusais.**

**Gabarito:** B.



## 25. LEGALLE CONCURSOS - Pref. Nova Esperança do Sul/ RS - 2015

Em relação aos Órgãos Tendinosos de Golgi (OTGs) podemos afirmar que:

- A) Os OTGs residem fora dos tendões musculares.
- B) O OTG é estimulado pela tensão produzida nas fibras musculares.
- C) Os impulsos nervosos descarregados pelo OTG são transmitidos por grandes axônios eferentes de condução rápida à medula espinhal e cerebelo.
- D) Os OTGs são compostos por fibras extrafusais e intrafusais.
- E) Os OTGs existem em paralelo enquanto os fusos musculares existem em série.

**Comentários:** Vejamos as assertivas:

- (A) Os OTGs residem fora dos tendões musculares. **Item errado. Eles estão na junção miotendínea.**
- (B) O OTG é estimulado pela tensão produzida nas fibras musculares. **Item correto. É isso mesmo. Resposta da questão.**
- (C) Os impulsos nervosos descarregados pelo OTG são transmitidos por grandes axônios eferentes de condução rápida à medula espinhal e cerebelo. **Item errado. Sem pé, nem cabeça. São transmitidos por neurônios aferentes à medula espinhal.**
- (D) Os OTGs são compostos por fibras extrafusais e intrafusais. **Item errado. As fibras intra e extrafusais são dos músculos.**
- (E) Os OTGs existem em paralelo enquanto os fusos musculares existem em série. **Item errado. O correto seria o contrário: OTGs em série e fusos musculares em paralelo.**

**Gabarito: B**

## 26. CAIPIMES - PREF. RIO GRANDE DA SERRA/SP - 2015

Para que ocorra cinestesia existem muitos tipos de receptores que contribuem nessa tarefa do corpo humano. Essas percepções cinestésicas se relacionam com os centros corticais. No entanto, os 2 principais receptores que atuam em nível periférico, formando um sistema de regulação básico são:

- A) corpúsculos de Meissner e terminações nervosas livres.



- B) órgãos tendinosos de Golgi e fusos musculares.
- C) corpúsculos de Pacini e terminações nervosas livres.
- D) receptores labirínticos e fusos musculares.

**Comentários:** Para haver cinestesia os OTGs e os fusos musculares formam um sistema básico. O que seria dos músculos sem o tônus muscular normal e o sistema de coativação alfa-gama?

**Gabarito: B**

## 27. AOCP - EBSERH/HU-UFMS - 2014

Sobre a fase de resposta inflamatória, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A resposta inflamatória começa já no primeiro dia e pode durar até o sexto dia após a lesão.
- (B) A área lesada pode aparecer quente ao toque, e alguma descoloração geralmente é aparente.
- (C) A lesão é dolorosa ao toque.
- (D) As modalidades terapêuticas devem controlar a dor e reduzir o inchaço.
- (E) Nessa fase o processo de aquecimento profundo é benéfico para o processo de cicatrização.

**Comentários:** O enunciado pede a assertiva incorreta em relação a fase inflamatória. Vejamos as assertivas:

- (A) A resposta inflamatória começa já no primeiro dia e pode durar até o sexto dia após a lesão. **Item correto.**
- (B) A área lesada pode aparecer quente ao toque, e alguma descoloração geralmente é aparente. **Item correto. Como vimos.**
- (C) A lesão é dolorosa ao toque. **Item correto.**
- (D) As modalidades terapêuticas devem controlar a dor e reduzir o inchaço. **Item correto.**



(E) Nessa fase o processo de aquecimento profundo é benéfico para o processo de cicatrização. **Item errado.**  
**Aquecimento profundo só na fase crônica.**

**Gabarito:** E

## 28. COTEC/UNIMONTES - Pref. Pintópolis/MG - 2015

São consideradas orientações gerais e metas para o treinamento do estágio agudo de lesões no tecido mole, EXCETO

- (A) Controle do edema e do espasmo muscular, utilizando oscilações articulares leves, grau I.
- (B) Redução do derrame articular com o uso de tala ou gesso, se os sintomas estiverem presentes.
- (C) Manutenção da força muscular e amplitude de movimento com exercícios isotônicos livres e ativos resistidos.
- (D) Controle da dor com crioterapia, compressão, elevação, repouso e imobilização.

**Comentários:** O enunciado da questão se refere a fase aguda da lesão, ou seja, onde há edema, hiperemia, calor, dor presente sem qualquer movimento na área envolvida e impedimento ou perda da função. Veremos que essa questão deveria ter sido anulada. De acordo com os sinais e sintomas, vejamos as alternativas:

- (A) Controle do edema e do espasmo muscular, utilizando oscilações articulares leves, grau I. **Nesse caso, as oscilações podem ser realizadas, mas isso irá depender da extensão da lesão. Item correto.**
- (B) Redução do derrame articular com o uso de tala ou gesso, se os sintomas estiverem presentes. **O objetivo da tala ou gesso não é redução do derrame articular. No caso de fraturas e luxações, o gesso/tala tem a função de estabilização dos ossos em sua correta posição anatômica até que ocorra a cicatrização. Em outras**



situações, pode ser utilizado para manter o membro em repouso para que ocorra a cicatrização e evitar novas lesões, assim como promover analgesia. Essa é a resposta da questão.

(C) Manutenção da força muscular e amplitude de movimento com exercícios isotônicos livres e ativos resistidos. Essa assertiva também considero errada. A questão pede fase aguda. Nessa fase, o paciente necessita de recursos terapêuticos que promovem analgesia e redução do edema, principalmente. Os exercícios com resistência devem ser empregados gradualmente de acordo com a fase e a evolução do paciente. Muitos autores defendem que o desenvolvimento muscular não pode ocorrer na presença de dor, pois a dor tem grande potencial para gerar um alto grau de inibição muscular, o que, por sua vez, modifica os padrões de disparo muscular.

(D) Controle da dor com crioterapia, compressão, elevação, repouso e imobilização. Correta! É o que vimos na aula. Cuidado ao falarem da imobilização. Quando está na fase aguda inicial é necessário repouso, mas se for mais tardio a ênfase é a mobilização precoce. A imobilização acarreta efeitos nocivos, como perda muscular e ligamentar, perda de resistência óssea, formação de aderências e perda de propriocepção.

**Gabarito: B**

## 29. COTEC/ UNIMONTES - Prof. Capitão Enéas/MG - 2015

São consideradas orientações gerais e metas para o treinamento do estágio agudo de lesões no tecido mole, EXCETO

- (A) Controle do edema e do espasmo muscular, utilizando oscilações articulares leves, grau I.
- (B) Redução do derrame articular com o uso de tala ou gesso, se os sintomas estiverem presentes.
- (C) Manutenção da força muscular e amplitude de movimento com exercícios isotônicos livres e ativos resistidos.
- (D) Controle da dor com crioterapia, compressão, elevação, repouso e imobilização.



**Comentários:** Notem que essa questão é igual a anterior. Fiz isso de propósito. Mesma banca, mas foi aplicado em concursos diferentes, mas a resposta considerada foi a letra C.

**Gabarito:** C

### 30. FUNDATEC –PREF. SÃO BORJA/RS - 2015

**Analise as assertivas abaixo sobre as fases do processo de cicatrização:**

I. A fase inflamatória é essencial para iniciar o processo de cicatrização tecidual. Essa fase é iniciada imediatamente e dura de 3 a 5 dias. Os procedimentos terapêuticos nessa fase devem ter como foco a redução da dor e do edema, sendo a crioterapia bastante efetiva.

II. A segunda fase é a proliferativa. À medida que essa fase progride, ocorre uma redução gradativa de macrófagos. Nessa fase, os procedimentos terapêuticos se concentram em aplicação de cargas demasiadamente pesadas para ganho de força e trofismo.

III. A fase de remodelação e maturação é onde ocorre maior organização da matriz extracelular. Essa remodelação pode durar até 4 meses.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.



**Comentários:** Vejamos as assertivas:

I. A fase inflamatória é essencial para iniciar o processo de cicatrização tecidual. Essa fase é iniciada imediatamente e dura de 3 a 5 dias. Os procedimentos terapêuticos nessa fase devem ter como foco a redução da dor e do edema, sendo a crioterapia bastante efetiva. **Item correto, como vimos anteriormente.**

II. A segunda fase é a proliferativa. À medida que essa fase progride, ocorre uma redução gradativa de macrófagos. Nessa fase, os procedimentos terapêuticos se concentram em aplicação de cargas demasiadamente pesadas para ganho de força e trofismo. **Item errado. Como vimos anteriormente, há um aumento de macrófagos e matócitos. Além disso, nessa fase não podemos aplicar cargas excessivas, pois pode causar mais lesões, a lesão não está totalmente cicatrizada.**

III. A fase de remodelação e maturação é onde ocorre maior organização da matriz extra celular. Essa remodelação pode durar até 4 meses. **Item correto. Atendem que essa remodelação pode durar mais que 4 meses, dependendo da extensão da lesão, dos cuidados do paciente, etc. Esse tempo depende do autor de cada livro, é muito variável.**

**Gabarito:** C

### 31. AOCP - EBSEH/HUCAM-UFES - 2014

São exemplos de tecidos eletricamente excitáveis, EXCETO

- (A) fibras musculares cardíacas.
- (B) fibras motoras voluntárias.
- (C) cartilagem.
- (D) células de órgãos abdominais.
- (E) fibras motoras autonômicas.



**Comentários:** A cartilagem por ser destituída de nervos não é eletricamente excitável.

**Gabarito:** C

### 32. AOCP - EBSEH/HU-UFMS - 2014

Sobre a cartilagem, assinale a alternativa correta.

- (A) Os tipos de cartilagem incluem as cartilagens trabeculares e esponjosas.
- (B) A cartilagem é um tecido conjuntivo feito de células (condroblastos e condrócitos) que produz uma matriz extracelular de proteoglicanos e de fibras colágenas com um alto teor hídrico.
- (C) Com o passar da idade, a cartilagem tende a crescer no seu conteúdo hídrico e a diminuir as ligações cruzadas entre as moléculas de colágeno.
- (D) Ela funciona apenas para absorver choques.
- (E) A cartilagem, por ter um conteúdo de elastina, é resistente, mas não capaz de retornar ao seu formato anterior após uma deformação.

**Comentários:**

- (A) Os tipos de cartilagem incluem as cartilagens trabeculares e esponjosas. **Item errado. Cartilagem hialina, elástica e fibrocartilagem.**
- (B) A cartilagem é um tecido conjuntivo feito de células (condroblastos e condrócitos) que produz uma matriz extracelular de proteoglicanos e de fibras colágenas com um alto teor hídrico. **Item correto, como vimos anteriormente. Lembrem-se das células envolvidas!**



(C) Com o passar da idade, a cartilagem tende a crescer no seu conteúdo hídrico e a diminuir as ligações cruzadas entre as moléculas de colágeno. **Item errado. Com a idade, a cartilagem tende a diminuir o seu conteúdo hídrico.**

(D) Ela funciona **apenas** para absorver choques. **Item errado. Como vimos a cartilagem tem muitas funções, não apenas absorver choques.**

(E) A cartilagem, por ter um conteúdo de elastina, é resistente, mas não capaz de retornar ao seu formato anterior após uma deformação. **Item errado. Ela tem essa capacidade.**

**Gabarito: B**

### 33. OBJETIVA CONCURSOS - PREF. CAXIAS DO SUL/RS - 2015

Em relação à gravidade da lesão tissular, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após assinalar a alternativa que apresenta a sequência

CORRETA:

(---) Na lesão de grau 1 (primeiro grau), ocorre dor leve no momento da lesão ou nas primeiras 24 horas.

(---) A lesão de grau 2 (segundo grau) apresenta-se com dor moderada, que exige interrupção da atividade. A sobrecarga e palpação geralmente não provoca dor. Quando a lesão é nos ligamentos, a palpação pode mostrar a falha.

(---) Na lesão de grau 3 (terceiro grau), a sobrecarga do tecido geralmente não provoca dor. Um ligamento rompido leva à instabilidade da articulação.

(A) C - C - E.

(B) E - E - C.

(C) C - E - C.



(D) E - C - C.

**Comentários:** Vejamos as assertivas:

(C) Na lesão de grau 1 (primeiro grau), ocorre dor leve no momento da lesão ou nas primeiras 24 horas. **Item correto! É o que vimos na aula. Quanto maior o grau, mais dor, maior a gravidade da lesão.**

(E) A lesão de grau 2 (segundo grau) apresenta-se com dor moderada, que exige interrupção da atividade. A sobrecarga e palpação geralmente não provoca dor. Quando a lesão é nos ligamentos, a palpação pode mostrar a falha. **Item errado. Qualquer movimento irá acarretar dor moderada, ainda mais com a sobrecarga e palpação. Outro ponto é sobre a palpação do ligamento, dependendo do ligamento é possível palpar a falha no ligamento.**

(C) Na lesão de grau 3 (terceiro grau), a sobrecarga do tecido geralmente não provoca dor. Um ligamento rompido leva à instabilidade da articulação. **Item correto. Se a dor aumentar quando a sobrecarga é aplicada à estrutura, há comprometimento da integridade resultante do tecido.**

**Gabarito:** C

#### 34. ASSCON-PP – PREFEITURA DE NOVA TRENTO/SC - 2015

Correlacione às lacunas.

1- Lesão de Grau I

2- Lesão de Grau II

3- Lesão de Grau III

( ) Maior número de fibras lesionada e maior gravidade das lesões dor moderada hemorragia, processo inflamatório local mais exuberante e diminuição maior da função. O tratamento do problema é mais lento.



( ) Uma ruptura completa do músculo ou de grande parte dele, resultando em uma grave perda da função com a presença de um defeito palpável. A dor pode variar de moderada a muito intensa, provocada pela contração muscular passiva. Dependendo da localização do músculo lesionado em relação à pele adjacente, o edema, a equimose e o hematoma podem ser visíveis, localizando-se geralmente em uma posição distal à lesão devido à força da gravidade que desloca o volume de sangue produzido em decorrência da lesão.

( ) Estiramento de uma pequena quantidade de fibras musculares, dor é localizada em um ponto específico, surge durante a contração muscular contra resistência e pode desaparecer no repouso. O edema pode estar presente, mas, geralmente, não é notado no exame físico. Ocorrem danos mínimos, a hemorragia é pequena, a resolução é rápida e a limitação funcional é leve.

A sequência correta de cima para baixo é:

(A) 1-2-3

(B) 2-3-1

(C) 3-1-2

(D) Nenhuma alternativa correta

**COMENTÁRIOS:** Essa questão serve como revisão do que estudamos. Vejamos as assertivas:

(2) Maior número de fibras lesionada e maior gravidade das lesões, dor moderada hemorragia, processo inflamatório local mais exuberante e diminuição maior da função. O tratamento do problema é mais lento.

Como vimos na aula! Lesão Grau II.

(3) Uma ruptura completa do músculo ou de grande parte dele, resultando em uma grave perda da função com a presença de um defeito palpável. A dor pode variar de moderada a muito intensa, provocada pela contração muscular passiva. Dependendo da localização do músculo lesionado em relação à pele adjacente, o edema, a equimose e o hematoma podem ser visíveis, localizando-se geralmente em uma posição distal à lesão devido à força da gravidade que desloca o volume de sangue produzido em decorrência da lesão. Como



vimos na aula! Lesão Grau III. Apenas complementando: logo após a lesão não conseguimos visualizar a equimose na posição distal à lesão, mas após algumas horas o extravasamento de sangue vai se deslocando mais distalmente como descrito acima e podemos visualizar melhor.

(1) Estiramento de uma pequena quantidade de fibras musculares, dor é localizada em um ponto específico, surge durante a contração muscular contra resistência e pode desaparecer no repouso. O edema pode estar presente, mas, geralmente, não é notado no exame físico. Ocorrem danos mínimos, a hemorragia é pequena, a resolução é rápida e a limitação funcional é leve. **Lesão Grau I.**

**Gabarito: B**

### 35. OBJETIVA CONCURSOS – PREFEITURA DE CHAPADA/RS - 2015

Em relação ao reparo de lesões em tecidos moles, de acordo com KISNER e COLBY, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

(—) Os ligamentos geralmente se rompem na junção com o osso, ou próximo às junções musculotendíneas. As regiões mais afetadas são o ombro, o cotovelo e a junção musculotendínea próxima ao tendão de Aquiles.

(—) A ruptura completa do músculo não é comum, mas pode ocorrer quando um músculo que já está contraído recebe um golpe direto ou é forçosamente estirado.

(—) Um tendão geralmente se rompe devido a trauma grave em uma pessoa jovem ou um movimento repentino, não usual, em uma pessoa idosa com história de compressão crônica e deterioração progressiva do tendão.

(A) C - C - E.

(B) E - C - C.

(C) C - E - C.

(D) E - C - E.



**Comentários:** Vejamos as assertivas:

(E) Os ligamentos geralmente se rompem na junção com o osso, ou próximo às junções musculotendíneas. As regiões mais afetadas são o ombro, o cotovelo e a junção musculotendínea próxima ao tendão de Aquiles. Os tendões geralmente rompem na junção com o músculo, não com o osso, pois a junção miotendínea é muito vulnerável a falhas de tensão. Ou pensando nos ligamentos, **geralmente** onde ocorre a lesão é no próprio ligamento. Também pode ocorrer a avulsão óssea, mas não é a mais comum.

(C) A ruptura completa do músculo não é comum, mas pode ocorrer quando um músculo que já está contraído recebe um golpe direto ou é forçosamente estirado. **Item correto!**

(C) Um tendão geralmente se rompe devido a trauma grave em uma pessoa jovem ou um movimento repentino, não usual, em uma pessoa idosa com história de compressão crônica e deterioração progressiva do tendão. **Item correto. São alguns dos mecanismos de lesão.**

**Gabarito: B**

### 36. FAFIPA – FEAES de Curitiba/PR - 2015

Distensão indica que houve algum grau de ruptura nas fibras musculares, na junção músculo-tendão, no tendão ou na inserção óssea de uma unidade musculotendinosa. Assinale a alternativa que NÃO causa esse tipo de ruptura:

- (A) Trauma direto (contusão).
- (B) Co-contração muscular.
- (C) Alongamento excessivo (distensão aguda).
- (D) Repetitiva ação de cargas (distensão crônica).



**Comentários:** A única alternativa que não causa ruptura nas fibras musculares é a co-contracção muscular. A co-contracção é a contracção reflexa da musculatura antagonista do movimento que está sendo executado, a fim de estabilizar a articulação durante a execução do movimento do membro. Por exemplo, quando realizamos a extensão do cotovelo, o músculo bíceps braquial é estirado, quando isso ocorre o reflexo miotático é ativado, gerando uma contracção leve desse músculo.

**Gabarito:** B

### 37. ASSCON-PP – PREFEITURA DE MAREMA/SC - 2015

Estiramentos tem importância no diagnóstico, já que identifica e quantifica a área lesada do músculo, os fenômenos decorrentes desse problema, a gravidade da lesão, os critérios de tratamento, o tempo de afastamento do esporte e a previsão de sequelas. Podemos classificar os estiramentos de acordo com as dimensões da lesão. Correlacione às lacunas.

( ) Estiramento de uma pequena quantidade de fibras musculares, dor é localizada em um ponto específico, surge durante a contracção muscular contra-resistência e pode desaparecer no repouso. O edema pode estar presente, mas, geralmente, não é notado no exame físico. Ocorrem danos mínimos, a hemorragia é pequena, a resolução é rápida e a limitação funcional é leve.

( ) Maior número de fibras lesionada e maior gravidade das lesões dor moderada hemorragia, processo inflamatório local mais exuberante e diminuição maior da função. O tratamento do problema é mais lento.

( ) Uma ruptura completa do músculo ou de grande parte dele, resultando em uma grave perda da função com a presença de um defeito palpável. A dor pode variar de moderada a muito intensa, provocada pela contracção muscular passiva. Dependendo da localização do músculo lesionado em relação à pele adjacente, o edema, a equimose e o hematoma podem ser visíveis, localizando-se geralmente em uma posição distal à lesão devido à força da gravidade que desloca o volume de sangue produzido em decorrência da lesão.

1- Lesão de Grau I



2- Lesão de Grau II

3- Lesão de Grau III

A sequência correta de cima para baixo é:

(A) 2-3-1

(B) 3-1-2

(C) 1-2-3

(D) Nenhuma alternativa correta

**Comentários:** Essa questão é apenas uma revisão do que já vimos. Bem tranquila. Vejamos as assertivas:

**(1)** Estiramento de uma pequena quantidade de fibras musculares, dor é localizada em um ponto específico, surge durante a contração muscular contra resistência e pode desaparecer no repouso. O edema pode estar presente, mas, geralmente, não é notado no exame físico. Ocorrem danos mínimos, a hemorragia é pequena, a resolução é rápida e a limitação funcional é leve. **Lesão grau I.**

**(2)** Maior número de fibras lesionada e maior gravidade das lesões dor moderada hemorragia, processo inflamatório local mais exuberante e diminuição maior da função. O tratamento do problema é mais lento. **Lesão grau II.**

**(3)** Uma ruptura completa do músculo ou de grande parte dele, resultando em uma grave perda da função com a presença de um defeito palpável. A dor pode variar de moderada a muito intensa, provocada pela contração muscular passiva. Dependendo da localização do músculo lesionado em relação à pele adjacente, o edema, a equimose e o hematoma podem ser visíveis, localizando-se geralmente em uma posição distal à lesão devido à força da gravidade que desloca o volume de sangue produzido em decorrência da lesão. **Lesão grau III.**



**Gabarito:** C

### 38. COTEC/UNIMONTES - PREF. RUBELITA/MG - 2015

O uso apropriado do exercício terapêutico no tratamento de distúrbios musculoesqueléticos depende da identificação da estrutura envolvida e do reconhecimento de seu estágio de recuperação (agudo, subagudo e crônico). Analise as alternativas abaixo e marque a alternativa CORRETA.

- (A) No estágio subagudo de recuperação, a abordagem do tratamento fisioterápico visa prevenir ou minimizar a formação de contraturas e adesões.
- (B) No estágio agudo de recuperação, a abordagem do tratamento fisioterápico contraindica a mobilização.
- (C) No estágio crônico de recuperação, percebemos uma inflamação crônica com dor antes da resistência do tecido.
- (D) No estágio crônico de recuperação, percebemos tecido de granulação, formação de colágeno com atividade fibroblástica inicial.

**Comentários:** Vejamos assertivas:

- (A) No estágio subagudo de recuperação, a abordagem do tratamento fisioterápico visa prevenir ou minimizar a formação de contraturas e adesões. **Item correto! Como vimos na aula. Como o tecido cicatricial está sendo formado inicialmente, nesse estágio o tratamento visa prevenir ou minimizar a formação de contraturas e adesões.**
- (B) No estágio agudo de recuperação, a abordagem do tratamento fisioterápico contraindica a mobilização. **Item errado. Pelo contrário, a mobilização precoce é incentivada.**



(C) No estágio crônico de recuperação, percebemos uma inflamação crônica com dor antes da resistência do tecido. **Item errado. No processo normal de cicatrização não há inflamação crônica.**

(D) No estágio crônico de recuperação, percebemos tecido de granulação, formação de colágeno com atividade fibroblástica inicial. **Item errado. Não é no estágio crônico que ocorrem esses eventos, mas sim no estágio subagudo.**

**Gabarito: A**



# ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



**1** Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



**2** Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



**3** Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



**4** Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



**5** Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



**6** Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



**7** Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



**8** O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.